


Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
Ald.1.5.45









Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
Ald.1.5.45





Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
Ald.1.5.45





Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
Ald.1.5.45



Ala. 1/5.




*Ex Libris Joannis Nenaini*  
*1872*






BIBLIOTECA  
CENTRALE  
FIRENZE





















IN HOC VOLV MINE HAEC  
CONTINENTVR.

AVRELII CORNELII CELSI MEDICINAE  
LIBRI. VIII. QVAM MEMENDATISSIMI,  
GRAECIS ETIAM OMNIBVS  
DICTIONIBVS RESTI-  
TVTIS.

QVINTI SERENI LIBER DE MEDICINA  
ET IPSE CASTIGATISS.

ACCEDIT INDEX IN CELSV, ET SERE-  
NYM SANE QVAM COPIOSVS.



CVenetorum decreto, ne quis aliquo in loco Venetiae ditionis  
hos libros imprimat, impressos ne alibi  
uendat, cautum est.



AMPLISSIMO, ET MERITISSIMO HERCV-  
LI GONZAGAE .SS. ROMANAE SEDIS  
CARDINALI IOANNES BAPTI-  
STA EGNATIVS VENETVS.

c Vm multa, & ampla sunt ea, quae Principes viros, tuīq;  
 similes illustrare maxime solent: tum nihil maius aut  
 honestius, quā cum bonarum artium studiosos homines  
 exornant: & bonas literas omni studio, atq; opera in lu-  
 cem prodire contendunt siue q; is semper literarum Genius fuit, ut  
 augustissimus merito iudicetur: siue q; si doctorum hominum discipli-  
 nam negligas: ueluti solem de caelo sustuleris, omnis hominum uita  
 in tenebris sit futura. Fecit hoc ipsum patrum nostrorum memoria  
 summa sua cum laude senior Alphonsus, qui cum propria uirtute re-  
 gnum Neapolitanum armis sibi quessisset, ad pacis studia conuersus,  
 omnes eius aetatis viros, qui doctrinae aliquod specimen praesferret,  
 mirū in modum est complexus. Eandem propensionem literas foun-  
 di secutus nō multo post Nicolaus Quintus Pont. Max. est. ut incredi-  
 bile dictu sit quātum breui licet eius Pōtificatu profecerint bonae lite-  
 rae: ut si uerū fateri uelis, huic uni plus debeamus Pōtifici, q̄ omnibus  
 alijs, qui aut multis ante illū floruerint annis: aut qui ad hūc diē nixe-  
 re in Barionae sede Pontificibus. Ceterum obscurauit penē hanc cla-  
 rissimorum Principum beneficentiam Laurentius Medices perpetuus  
 Florentinae Reip. dictator. qui uitam, paternamq; laudem emula-  
 tus prouehendi ueteres disciplinas, & artes, magno studio, & im-  
 pensa primū bibliothecam copiosissimam comparandam iussit: quā-  
 do sine mutis hisce magistris, qd̄ aiūt, aut parū, aut certe nihil profici-  
 mus: tum doctissimos viros quotquot tera Italia id tēpestatis alebat,  
 ad sese euocandos curauit. quos et praemijs longe maximis inuitaret:  
 & ad ocium hoc literarium ita inflammaret, ut nihil omnino his  
 deesse pateretur. Et quoniam Principum, ac Regum exempla pluri-  
 mum in utraq; partem ualent: non defuit eadem tempestate Prin-  
 cepts bellicae gloria clarissimus Fridericus Vrbinas, qui Laurētij splē-  
 dore uicini, et amicissimi Principis cum exarsisset: eandem emulatus  
 laudem, nō paruum librorum copiam, & praecipue qui ad sacra rē  
 spectant, comparauit: & a sole, puluereq; martio saepe in spacia, atq;  
 ambulacra philosophorum diuerterit. Vt quicquid illi à bellicis arti-  
 bus erat ocij, id totum familiaribus doctorum hominum sermonibus  
 libenter impederet. Sed enim nec Gonzagae tui minus operae semper  
 huic uni dedere rei, quā bellicis rebus, quibus maxime florere. Nā



sub initia renascentium literarum, quæ sexcentissimum iacuerant  
annum in tera Italia, victorinum Feltrensem sibi adsciuere. cuius  
doctrinam regij adulescentes uestri iam tum à primis annis imbibe-  
rent. Tu uero ut uideo cum alijs artibus maiorum tuorum adæquas  
laudem: tum hac una literarū, & doctorū hominum exornādi cura  
superare contendis. qui summo studio iam ab annis adolenscentiæ do-  
ctissimum quenq; in familiam adsciuisti tuam: magnisq; semper  
præmijs ornaſti. Nam ut ornittam Furnium merito abs te semper ho-  
nestatum: Romulum certe sic complexus ab initio es, ut non prius  
desisteris, q̃ illum studiorum tibi perpetuum ascineris comitem. quæ  
laus cō maior est, q̃ & temporum hæc iniquitas etiam octosissimos  
homines ab literis auocat: & Romulus cum honestissime Bononiæ pro-  
fiteretur, maluit tamen te sequi: & tecum, ut cum optimo Principe,  
conquiescere. non dubitans quin ingrauescens eius ætas sub te Prin-  
cipe uiro efflorescere etiam possit. Sed quid ego dicam quanto studio  
Franciscum Aſulanum tibi addictissimum feceris? qui hæreditariam  
Aldi laudem secutus, nihil nō egit ut bonæ literæ cum græcæ, tum la-  
tinæ in dies maiorem recipiant cultum. Et ille quidem cum noctes  
ac dies hanc curam animo coqueret: accessit mox autoritas, ampli-  
tudoq; tua: quæ currentem, quod aiunt, equum fortius ad cursum ex-  
citaret. Nam cum alia in tui unius gratiam suscepit: tum Celsi Cor-  
nelij de medicina libros longe utilissimos, & elegantissimos inuulgā-  
dos recepit. quod eo libentius suscepit, q̃ abs te imprimis codicē sanē  
castigatū statim acceperit. id oneris ut scilicet Celsus q̃ emendatissimus  
publicum acceperet: non quod ego unius omnium doctissimus, sed q̃  
Francisco, & familie, & Aldi præsertim nomini maxime semper fā-  
ui: suscepi non inuitus: idq; , uti spero, non atris auibus præstisse me  
confido: ut docti etiam homines libenter hosce Celsi libros legant: in-  
docti non aspernentur. Quod opus tui unius auspicijs in lucem cum  
prodeat, tuum patrociniū merito exposcit. huic addidimus. Q. se-  
reni poemā non inutile: in quo uates ille non infeliciſſimus et morbos  
aliquot, & morborum remedia complexus est. hoc ipsum cum lege-  
rix posset, legent hodie ni fallor, docti hoies & perlibenter, & iucun-  
de. Ego uero quicquid opellæ in Celſo emendando impendi, id ipsum  
tibi nuncupo: qui uirtutis tuæ amplificator, oēm meam industriā uni  
tibi ppetuo antea dicarā. Testatū tamē apud te relinquens, q̃ si plus  
ocij datū mihi esset, i magnis occupationibus proficēdi uersanti, efficaſ-  
sem ut Cornelius nō dicā nitidior, certe amabilius oculus prodiret. quā  
dobreues notulas uocabulorū, sensuum etiam obscuriorū, græcarum  
etiā dictionum interpretamētā instituērā. Quin et ex Galeno, Hip-



postrateq; multa adtexere decreuerā: ut nostrates medici cum Hippo-  
cratem intelligerent penē à Cornelio in linguam latinam uersum, li-  
bentius multo illum legerent. Cornelij Celsi Fabius, quod sciam, ex  
ueteribus tantum meminit, laudās hominis industriam, q̃ cum Lenata  
rhetoricen multo q̃ ante illum alij accuratius explicarit. sed & idem  
Sceptios imitatus, non parum multa summo cum nitore, & cultu scri-  
psit. artē quoq; militare, & disciplinas ferē græcis omnes ample-  
xus, eas latine loqui docuit. & ex his medicinam omnium nostratum  
princeps ita absoluit: ut æmulari potius multi, q̃ assequi parem laudē  
possint. Bene, ac feliciter Vale.



QVAE TOTO OPERE CONTINENTVR.

|                                    |         |   |                                   |
|------------------------------------|---------|---|-----------------------------------|
| Prooemium.                         | pagina. | 1 | De notis, quas aliquis in singu-  |
| Quemadmodū sanos agere             |         |   | lus morborum generibus ha-        |
| conueniat.                         | 5       |   | bere possit.                      |
| Quæ stomacho imbecilli ser-        |         |   | Quæ notæ in quoq; morbi gene-     |
| uanda sint.                        | 6       |   | re, uel spem, uel pericula o-     |
| Observationes quædā prout res      |         |   | stendant.                         |
| nouæ accidunt: Et prout corpo-     |         |   | De morborum curationibus.         |
| rum genera, Et sexus, Et æta-      |         |   | De sanguinis detractione per      |
| tes, Et tempora anni sunt.         | 6       |   | uenas.                            |
| De his, qui aliqua parte corporis  |         |   | De sanguinis detractione per      |
| laborant: Et primum de his,        |         |   | cucurbitulas.                     |
| quibus caput infirmum est.         | 9       |   | De deiectione.                    |
| De his qui lippitudine, grauedi-   |         |   | De uomitu.                        |
| ne, destillatione, tonsillisq; la- |         |   | De frictione.                     |
| borant.                            | 9       |   | De gestatione.                    |
| Ad solutam aluum remedia.          | 9       |   | De abstinentia.                   |
| Remedia ad coli dolorem.           | 9       |   | De sudore.                        |
| Quæ agenda sint stomacho           |         |   | Qui cibi, potiones'ue, aut ualen- |
| laborantibus.                      | 10      |   | tis, aut mediæ, aut imbecillæ     |
| Quid obseruandum sit dolore        |         |   | materiæ sint.                     |
| neruorum laborantibus.             | 10      |   | Quæ natura, ac proprietas cu-     |
| Observatio in pestilentia.         | 10      |   | iusq; rei sit, qua nescimur.      |
|                                    |         |   | Quæ res boni succi sint.          |
|                                    |         |   | Quæ res mali succi sint.          |
|                                    |         |   | Quæ res lenes, quæ'ue acres       |
|                                    |         |   | sint.                             |
|                                    |         |   | Quæ res crassiores, quæ'ue te-    |
|                                    |         |   | nuiores pituitam faciunt.         |
|                                    |         |   | Quæ res stomacho idoneæ           |
|                                    |         |   | sunt.                             |
|                                    |         |   | Quæ res alienæ stomacho           |
|                                    |         |   | sunt.                             |
|                                    |         |   | Quæ instant, aut inflationem      |
|                                    |         |   | leuant.                           |
|                                    |         |   | Quæ res aut calefaciunt, aut      |
|                                    |         |   | refrigerant.                      |
|                                    |         |   | Quæ res intus facile uitiantur,   |
|                                    |         |   | uel minime corrumpuntur.          |



|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Quæ res aluum mouent.   | 27 | Curatio tertianæ febris.   | 37 |
| Quæ res aluum astringant.   | 27 | Curatio quartanæ febris.   | 37 |
| Quæ res urinam mouent.  | 28 | Curatio duarum quartanarum.  | 37 |
| Quæ res somnum mouet, aut<br>sensus excitant.   | 28 | Curatio cotidiane febris, quæ ex<br>quartana facta sit.  | 38 |
| Quæ res corpus aut erodât, aut<br>reprimant, aut refrigerent, aut<br>calefaciant, aut durent, aut<br>emolliant.                                       | 28 | De tribus insanie generibus: et<br>primo de eius curatione, quæ à<br>græcis phrenitis dicitur.   | 38 |
|   |    | Cardiaci morbi curatio.  | 40 |
|   |    | De lethargo, et eius curatio-<br>ne.   | 40 |
|   |    | De aqua inter cutem, hoc est hy-<br>dropico morbo.   | 41 |
|   |    | De tabe, et eius speciebus, et<br>curationibus.  | 42 |
|   |    | De comitialis morbi curatio-<br>nibus.   | 44 |
|   |    | De regii morbi curatione.  | 44 |
|   |    | De elephantie curatione.   | 45 |
|   |    | De attonitis, et eorum cura-<br>tione.   | 45 |
|   |    | De resolutione nervorum: quæ apo-<br>plexia, uel paralyxis dicitur.  | 45 |
|   |    |  |    |
|   |    | LIBER QVARTVS.   |    |
|   |    |  |    |
| De morborum generibus.  | 29 | De humani corporis interio-<br>ribus sedibus.  | 47 |
| Quomodo morbi cognoscantur:<br>et an incrementum, an consistant,<br>an minuantur: et qua ratione<br>ab initio qui languere incipit,<br>curari debeat. | 29 | De curationibus morborum, qui na-<br>suntur à capite: et primo de<br>eius dolore: deinde de morbo, qui<br>circa faciem nascitur: tum de lin-<br>guæ resolutione: postremo de de-<br>stillatione, ac grauedine. | 48 |
| De febrium generibus.   | 30 | De morbo, qui circa faciem nasci-<br>tur: quem græci cynicum spas-<br>mum uocant.  | 48 |
| De curationum diuersis ge-<br>neribus.  | 30 | De resolutione lingue.   | 49 |
| De febrium speciebus, et singu-<br>larum curationibus, et primo<br>quando abus febricitantibus<br>dandus sit.   | 32 | De destillatione, ac grauedine.  | 49 |
| Quando potiones febricitanti-<br>bus dari expediat.   | 33 | De cernicis morbis, curationi-   |    |
| Quando pestilentes febres cu-<br>rari debeant.  | 34 |  |    |
| Curatio semitertianæ febris, quæ<br>hemitritæos dicitur.  | 35 |  |    |
| Curatio lentarum febrium.   | 35 |  |    |
| Remedia in febribus ad capitis<br>dolorē, et præcordiorum infla-<br>mationem, et ariditatem, et<br>scabritiem lingue.                                 | 35 |  |    |
| Remedia contra frigus, quod<br>febrem præcedit.   | 36 |  |    |
| Curatio horroris in febribus.   | 36 |  |    |
| Curatio cotidiane febris.   | 37 |  |    |



busq. 50  
 De faucium morbis, ac curationi-  
 bus, et primum de angina, de-  
 inde de difficultate spirandi,  
 ultimo de tussi. 50  
 De difficultate spirandi. 51  
 De tussi. 51  
 De stomachi morbis, & cura-  
 tionibus. 52  
 De laterum doloribus. 53  
 De viscerum morbis: et primo de  
 pulmone, deinde de iocinere, tum  
 de liene, postremo de renibus. 54  
 De iocineris morbo, & cura-  
 tione. 55  
 De lienis morbo, et curatione. 55  
 De renum morbis, et curatio-  
 nibus. 55  
 De intestinorum morbis, &  
 primo de cholera. 56  
 De coeliaco uentriculi morbo. 56  
 De tenuioris intestini morbo. 57  
 De morbo intestini plenioris. 57  
 De torminibus. i. dysenteria. 57  
 De leuitate intestinorum. 58  
 De lumbricis aluum occupan-  
 tibus. 58  
 De tenasmo intestinorum morbo. 58  
 De uetris fluxu, et curatione. 59  
 De uulue morbo, & curatio-  
 nibus. 59  
 De nimia profusione seminis  
 ex naturalibus. 60  
 De coxarum morbis, & cura-  
 tionibus. 60  
 De genuum doloribus, et cura. 60  
 De articularum doloribus in  
 manibus, pedibusq. 61

# LIBER QVINTVS.

De simplicibus facultatibus qua-  
 runq; rerum, ex quibus me-  
 dicamenta fiunt: et primo de his,  
 quae sanguinem supprimunt. 62  
 Quae uulnus glutinant. 62  
 Quae coquunt, et mouent pus. 62  
 Quae aperiunt uulnera. 62  
 Quae purgant. 62  
 Quae rodunt. 62  
 Quae exedunt corpus. 63  
 Quae adurunt. 63  
 Quae crustas ulceribus inducunt.  
 Quae crustas ulceribus resoluunt.  
 Quae discutiant ea, quae in ali-  
 qua parte corporis coierunt. 63  
 Quae euocant, & educant. 63  
 Quae exasperata leuent. 63  
 Quae carnem nutriunt, &  
 ulcus implent. 63  
 Quae molliunt. 63  
 Quae autem purgant. 63  
 De mixturis simplicium rerum,  
 & de ratione ponderum, &  
 quid malagma, & emplastrum,  
 et pastillus inter se differat. 63  
 De malagmatis. 64  
 Malagma ad materiam extra-  
 hendam. 64  
 Malagma ad iecur dolens. 64  
 Malagma ad lienem. 64  
 Malagma ad laterum dolores. 64  
 Malagmata ad resoluenda quae  
 astricta sunt: et mollienda quae  
 dura sunt: et digerenda quae  
 coeunt. 65  
 Aliud malagma ad eadem. 65  
 Malagma moschi ad mollien-  
 dum. 65



|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| Malagma medi ad digerenda<br>quæ coeunt.                             | 65 | malagma ad strumam.  | 66 |
| Malagma Panthemî ad ea-<br>dem.                                      | 65 | Malagma ad articulos.  | 67 |
| Malagma ad strumas.  | 65 | Malagma Aristonis aduersus po-<br>dagras, et recentia phyma-                     | 67 |
| Aliud malagma ad id ua-<br>lens.                                     | 65 | ta, et omnis dolores.  | 67 |
| Malagma ad strumam, et<br>phymata.                                   | 65 | Theonî malagma ad pedum<br>dolores.  | 67 |
| Malagma ad strumam, et<br>tubera, et carcanodas.                     | 65 | Numenij malagma ad podagrâ<br>cæter. sçq; articulos indura-<br>tos.              | 67 |
| Malagma protarchi ad paroti-<br>das, et faum, et mala ul-<br>cera.   | 65 | Dexij malagma si quando callus<br>in articulis increuit.                         | 67 |
| Malagma aduersus panum,<br>et phymata.                               | 65 | De emplastris.   | 67 |
| Malagma aduersus phyma-<br>ta.                                       | 66 | Barbarum emplastrum nigrum,<br>quod cruentis protinus nul-<br>neribus iniicitur. | 67 |
| Malagma ad supprimendum<br>omne quod abscedit.                       | 66 | Coacon emplastrum nigrum<br>ad idem ualens.                                      | 67 |
| Malagma ad sanguinem sup-<br>primendû, et phymata.                   | 66 | Basilicon emplastrum nigrum<br>ad idem.  | 67 |
| Malagma ad carcanodas, et<br>phymata lenienda.                       | 66 | Smaragdinum emplastrum<br>ad idem.   | 67 |
| Malagma ad liuorem faciei<br>contuse.                                | 66 | Emplastrum ruffum ad idē.  | 67 |
| Malagmata stomachiat ad<br>aperiendum.                               | 66 | Paracollecticum emplastrum<br>ad idem.   | 67 |
| Niconis malagma ad resoluen-<br>dum, aperiendumq; ac pur-<br>gandum. | 66 | Cephalicum emplastrum phi-<br>lotæ capiti conueniens.                            | 68 |
| Malagma ad ossa, et nervos.  | 66 | Emplastrum uiride ad idem<br>ualens.   | 68 |
| Malagma Euhylei ad articu-<br>los, et ad omnem dolorē.               | 66 | τετραποδων emplastrum ad<br>pus mouendum.  | 68 |
| Malagma Sasogoræ ad dolo-<br>res articulorum.                        | 66 | Enneapharmacum emplastrum<br>ad pus mouendum, et ad<br>purgandum ualens.         | 68 |
| Chrysippi malagma ad idē<br>ualens.                                  | 66 | Attalum emplastrum ad nul-<br>nera.  | 68 |
| Clesipontis malagma ad idem<br>ualens, et ad parotidas, et phy-      |    | Iudæi emplastrum fracto ca-<br>piti acomodatum.                                  | 68 |
|  |    | Diadaphnidon emplastrum<br>ad extrahendum.                                       | 68 |

Aliud



Aliud dicitur ad extra-  
hendū, & pus mouendum. 68

Philocratis emplastrum ad ex-  
trahendum, & pus mouen-  
dum. 68

Ἰουάδης emplastrum ad ex-  
trahendum. 68

Emplastrum Hecatei ad ex-  
trahendum. 69

Alexandrinum emplastrum  
uiride ad extrahendum. 69

De emplastro exedentibus. 69

Emplastrum quod exest corpus,  
& ossa resoluit: & super cre-  
scentem carnem coercet. 69

Emplastra aduersus morsus, &  
alia recentiora uulnera. 69

Ἐμπίον emplastrum rubrum  
ad idem ualens. 69

Aliud emplastrum ad idem  
ualens. 69

Ἀντιόχου emplastra non grauibus  
uulneribus accommodata, et  
maxime senilibus. 69

Elephantinum emplastrū. 69

Lenia emplastra. 69

Emplastrum lene. 69

Archagathi emplastrū lene. 69

Emplastra eiusdē generis ad  
leniendum apta. 70

De pastillis, & primo de his, qui  
ad recentia uulnera glutinan-  
da, sanandaq; apti sunt. 70

Alius pastillus ad glutinanda  
uulnera. 70

De sphragide pastillo, quem Po-  
lybus confecit, ad glutinandū  
uulnus. 70

Pastillus ad ulcera sordida, & ni-  
gritiem in auribus, naribus, ob-

scenis partibus, inflammatio-  
nesq; eorum. 70

Pastillus andronis ad unam in-  
flammatam, ad naturalia sordi-  
da etiā cancro laborantia. 70

Pastillus ad fissā ani, uel ora ue-  
narum fundentia sanguinem,  
uel cancerum. 70

Pastillus ad expellendum calcu-  
lum cum urina. 70

De pessis. 70

Ad sanguinem euocandum. 70

Ad uulnam molliendam. 70

Alia pessi compositio ad idem  
ualens. 71

Ad inflammationes uulnū  
Numenij, Pessus. 71

Ad eiciendum ē uulna infan-  
tem mortuum. 71

Simul et uitio locorū concidit,  
qua curatione utendū sit. 71

De medicamentis quibus aridis u-  
timur, ad carnem supercre-  
scentem exedendam. 71

Ad putrē carnem continendam  
ne ultra serpat: eamq; leniter  
exedendam plures compo-  
sitiones. 71

Hierē compositio. 71

Iudaei compositio. 71

Iolē compositio. 71

Ad sanguinis profluvia, uel ex-  
membrana cerebri, uel alijs lo-  
cis & ad cancerum, & ad indu-  
cendam cicatricem, & ad coer-  
cendam carnem crescentem. 71

Timi compositio ad ignem sa-  
crum, uel cancerum. 72

Ad sternutamenta excitanda. 72

Gargariizationes quibus fieri de-



|                                 |    |                                   |    |
|---------------------------------|----|-----------------------------------|----|
| beant.                          | 72 | que maxime per tela infe-         |    |
| De antidotis, & quibus malis    |    | runtur.                           | 74 |
| opitulentur.                    | 72 | Que vulnera i sanabilia sint.     | 74 |
| Compositio antidoti.            | 72 | Que vulnera difficilem cu-        |    |
| Aliud antidotum Ambrosiano-     |    | rationem habeant.                 | 75 |
| minatum, quod Popyrus Pto-      |    | Que vulnera tutiorem cu-          |    |
| lemæo regi composuit.           | 72 | rationem habeant.                 | 75 |
| Antidotum Mithridatis.          | 72 | Observationes quedam & ætu-       |    |
| De acopis.                      | 72 | tis, & corporis, & uitæ, &        |    |
| Acopum ad odes nervis utile.    | 72 | temporis in vulneribus.           | 75 |
| Ex his ad ulcera purganda,      |    | Signa percussi cordis.            | 75 |
| & implenda.                     | 73 | Signa pulmonis icti.              | 75 |
| Ad sacrum ignem.                | 73 | Signa iocineris vulnerati.        | 75 |
| De catapotijs.                  | 73 | Signa percussorum renium.         | 75 |
| Catapotiū valentis ad somnū.    | 73 | Signa vulnerati lienis.           | 75 |
| Catapotiū ad plurimos dolores   |    | Signa percussæ uulnæ.             | 75 |
| per somnum leniendos.           | 73 | Signa percussi cerebri, uel mem-  |    |
| Catapotiū aliud ad multa        |    | bræ eius.                         | 76 |
| uolens.                         | 73 | Signa percussi stomachi.          | 76 |
| Catapotiū ad inducendū somnū:   |    | Signa ieiuni intestini, & uentri- |    |
| quæ uulna dolens prohibuit.     | 73 | culi vulnerati, & aliorum         |    |
| Ad iecur sanandum.              | 73 | intestinarum.                     | 76 |
| Ad finiendos dolores lateris.   | 73 | Signa percussæ medullæ, quæ       |    |
| Ad thoracis dolores finiendos.  | 73 | in spina est.                     | 76 |
| Catapotiū Athenionis ad         |    | Signa septi transuersi percussi.  | 76 |
| tussim.                         | 74 | Signa uesicæ uulneratæ.           | 76 |
| Catapotiū Heraclidis tarenti-   |    | De sanguine, & sanie, & pure, et  |    |
| ni ad tussim, & somnū.          | 74 | eorum speciebus quando ue me-     |    |
| Catapotiū ad purganda ulcera    |    | liora, deteriora uel sint.        | 76 |
| in faucibus tussientibus.       | 74 | Curatio aduersus profusionem      |    |
| Collice cassij modica.          | 74 | sanguinis in uulneribus.          | 76 |
| Ad infantem mortuum, aut se-    |    | Curationes aduersus uulnenum      |    |
| cundas expellendas.             | 74 | inflammationem.                   | 77 |
| Laborantibus ex partu quid      |    | De glutinatione uulnenum.         | 77 |
| dari debeat.                    | 74 | Quomodo uulnus ligari con-        |    |
| Ad adiunandam uocem.            | 74 | ueniat.                           | 78 |
| Aduersus difficultatē urinae.   | 74 | De ratione uictus, & notis uul-   |    |
| Arteriæ compositio quō fiat.    | 74 | nerū, curationibusq; eorū.        | 78 |
| De quinq; generibus noxarū cor- |    | Curatiōes propriæ articulorū.     | 78 |
| poris, & primo de uulneribus,   |    | Vulnus quomodo purgandū est.      | 79 |



|                                    |    |                                    |    |
|------------------------------------|----|------------------------------------|----|
| Quo vulnus implendum est.          | 79 | De carbunculo, et eius curatione.  | 83 |
| De vulneribus, curationibusq;      |    | De carcinomate, et eius cura.      | 84 |
| eorum.                             | 79 | De Theriomate, et eius cura.       | 84 |
| Curatio ulcers.                    | 79 | De sacro igne, et eius cura.       | 89 |
| Curatio erysipelarum.              | 80 | De Chironeo ulcere, et eius cu.    | 85 |
| Curatio Gangrenæ.                  | 80 | De ulceribus, quæ ex frigore in    |    |
| Quomodo cicatrix vulnere indu-     |    | pedibus, et manibus oriuntur,      |    |
| cenda, purgandaq; sit.             | 81 | et eorum curationibus.             | 85 |
| De vulneribus, quæ p morsus in-    |    | De struma, et eius curatione.      | 86 |
| feruntur, eorūq; curationibus.     | 81 | De furunculo, et eius curatione.   | 86 |
| Curatio aduersus rabiosi canis     |    | De phymate, et eius cura.          | 86 |
| morsum.                            | 81 | De phygeilo, et eius curatione.    | 86 |
| Curationes communes aduersus       |    | De fistulis, et earum generibus,   |    |
| omnes morsus serpentium.           | 81 | et curationibus.                   | 87 |
| Speciales curationes aduersus      |    | De melicera.                       | 88 |
| ictus serpentium, et primo aduer-  |    | De Acrochordone, et Thymio, et     |    |
| sus ictum Aspidis.                 | 82 | Myrmecio, et Clauo, curationi      |    |
| Aduersus ictum scorpionis.         | 82 | busq; eorum.                       | 88 |
| Aduersus aranei, et scorpio-       |    | De pustularum generibus, et        |    |
| nis ictum.                         | 82 | earum curationibus.                | 89 |
| Aduersus Cerastris, et Dipsæ, et   |    | De scabie, et eius curatione.      | 89 |
| Hæmorrhoidis ictum.                | 82 | De impetiginis speciebus, et       |    |
| Aduersus Chersydri ictum, et       |    | curationibus.                      | 90 |
| cerastris.                         | 82 | De papulis, et earū curatione.     | 90 |
| Aduersus Phalangii ictum.          | 82 | De vitiliginis speciebus, idest de |    |
| Aduersus ictus italorum anguinū, q |    | Alpho, et Mela, et leuce, et       |    |
| minus terribiles pegris sunt.      | 82 | earum curatione.                   | 90 |
| Remedium generale aduersus         |    |                                    |    |
| omnia uenena.                      | 83 |                                    |    |
| Specialia remedia aduersus quæ     |    |                                    |    |
| dam uenena, et primo ad-           |    |                                    |    |
| uersus cantharidas.                | 83 |                                    |    |
| Aduersus acutam.                   | 83 |                                    |    |
| Aduersus hyoscyamum.               | 83 |                                    |    |
| Aduersus cerussam.                 | 83 |                                    |    |
| Aduersus sanguisugam si epota      |    |                                    |    |
| est, et lac quod intus coijt.      | 83 |                                    |    |
| Aduersus fungos inutiles.          | 83 |                                    |    |
| De adultis corporis locis, et quo- |    |                                    |    |
| modo curari debeant.               | 83 |                                    |    |

# LIBER SEXTVS.

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| De capillis fluentibus.           | 91 |
| De porrigne, et eius curatione.   | 91 |
| De Syphi, et eius curatione.      | 91 |
| De Areis, et earū curationibus.   | 91 |
| De Varis, et Lenticulis, et Ephe- |    |
| lide, et eorū curationibus.       | 91 |
| De oculorum morbis, curationi-    |    |
| busq; eorum: et primo de his      |    |
| morbis, qui lenibus medicamen-    |    |
| tis curantur.                     | 92 |



|                                    |    |                                  |     |
|------------------------------------|----|----------------------------------|-----|
| De diuersis oculorū collirijs.     | 93 | curationibus.                    | 96  |
| Philonis collirium.                | 93 | Hermionis collirium.             | 96  |
| Dionysij collirium.                | 93 | De catarricibus oculorum, quæ ex |     |
| Cleonis collirium.                 | 93 | ulceribus factæ sunt: & quomo    |     |
| Theodoti collirium, Archari-       |    | do curari debeant: & de Ascle    |     |
| stum appellatum.                   | 93 | pia, & Canopite, & Pyxino        |     |
| Cythion, uel tephron colliriū.     | 93 | collirijs.                       | 96  |
| Euelpidis collirium, trygodes      |    | De alio genere inflammatio-      |     |
| nominatum.                         | 93 | nis oculorum,                    | 96  |
| Nilei collirium omnium opti-       |    | Cæsarianum collirium.            | 97  |
| mum.                               | 94 | Hieracis collirium.              | 97  |
| De carbunculis oculorum, &         |    | De Xerophthalmia.                | 97  |
| eorum curatione.                   | 94 | Rhinion collirium.               | 97  |
| De pustulis oculorum, & cu-        |    | Ad oculos scabros colliria.      | 97  |
| ratione earum.                     | 94 | Ad caligantem oculorum, quæ      |     |
| παραλινθῶς collirium ad pu-        |    | propter lippitudinem oritur      |     |
| stulas oculorum.                   | 95 | remedia, & colliria.             | 97  |
| De ulceribus oculorum, & eorū      |    | διὰ ὑπόρου collirium.            | 97  |
| curatione, & de διὰ βανδίου        |    | Ad caligantem oculorum, quæ      |     |
| collirio.                          | 95 | propter senectutem, aut alia     |     |
| Curatio oculorum aliquo ca-        |    | imbecillitate fit.               | 98  |
| su immutatorum.                    | 95 | De suffusione oculorum.          | 98  |
| De pediculis palpebrarū.           | 95 | De resolutione oculorum, quæ     |     |
| De oculorum grauioribus mor-       |    | paralysis dicitur.               | 98  |
| bis, qui ex inflammationibus oriū  |    | De mydriasi oculorum.            | 98  |
| tur: & ualidioribus medicamen-     |    | De imbecillitate oculorum.       | 98  |
| tis curantur, & de Andree col-     |    | Ad oculos qui extrinsecus offen- |     |
| lirio, & de διὰ νέφους.            | 95 | duntur: cum sanguine suffu-      |     |
| Memigmenon Euelpidis colli-        |    | si sunt.                         | 98  |
| rium.                              | 95 | De aurium morbis, & cura-        |     |
| De oculorum ulceribus supercre-    |    | tionibus.                        | 99  |
| scitibus, sordidis, canis, ueteri- |    | Aduersus aurium uermes.          | 100 |
| bis, & de curationibus singu-      |    | Ad compressa aurium fora-        |     |
| lorum.                             | 96 | mina.                            | 100 |
| σφαίριον collirium.                | 96 | Ad grauem auditum.               | 100 |
| Phynon collirium Euelpidis.        | 96 | Ad sonitum aurium intra se       |     |
| Sphaerion collirium Euelpi-        |    | ipsas.                           | 100 |
| dis.                               | 96 | Ad ea, quæ in aurem inciderunt   |     |
| Liquidum Euelpidis colliriū.       | 96 | extrahenda.                      | 100 |
| De canis oculorum ulceribus, &     |    | De narium morbis, & curatio-     |     |



|  |     |  |
|--|-----|--|
| nibus.   | 101 | LIBER SEPTIMVS.  |
| De dentium dolore, & cura-<br>tionibus.  | 101 | De chirurgica, & qui in ea cla-<br>ruerint: & qualis esse chirurgi-<br>cus debeat: & quid in hoc li-<br>bro describatur. |
| De tonsillis, & earũ cura.   | 102 | 108  |
| De oris ulceribus, & curationi-<br>bus, & quæ antheræ sint   | 102 | De luxatis.  |
| De gingivarum ulceribus.   | 103 | 108  |
| De unæ morbo, et curatione.  | 103 | De his, quæ per se intumescunt<br>quomodo exadenda, & curan-<br>da sunt.   |
| De cancro oris.  | 104 | 108  |
| De parotibus, quæ sub auribus<br>oriuntur.   | 104 | De bonis, malis'ue signis exulce-<br>ratorum.  |
| De umbilici prominentis cura-<br>tione.  | 104 | 109  |
| De obscenarum partium uicijs, et<br>curationibus.  | 104 | De fistulis.   |
| De colis morbis, & curatio-<br>nibus.  | 104 | 109  |
| De canceri, qui in colle nasci-<br>tur, curatione.   | 105 | De ani fistulis.   |
| De phagedænæ in cole nascenti-<br>tis curatione.   | 106 | 110  |
| De carbunculo, qui in cole na-<br>scitur.  | 106 | De telis è corpore extrahendis   |
| De testiculorũ morbis, & eo-<br>rum curatione.   | 106 | 110  |
| De rhagadijs, & Condylomate,<br>& hæmorrhoidibus, alijsq; ani<br>morbis, & curationibus eorũ,<br>& primo de rhagadijs. | 106 | De ganglijs, & meliceride, & a-<br>theromate, & steatomate capi-<br>tis tuberculis.                                      |
| De condylomate.  | 106 | 111  |
| De hæmorrhoidibus.   | 107 | De oculorum uicijs quæ scalpelo,<br>& manu curantur.   |
| Si anus, uel os uulnæ procidit,<br>qua curatione utendũ sit.   | 107 | 112  |
| De ulcere fungo simili i ano.  | 107 | De crithæ tuberculo palpebra-<br>rum.  |
| De digitorum ulceribus.  | 107 | 112  |
|  |     | De chalazia palpebrarũ.  |
|  |     | 112  |
|  |     | De ungue oculorum, quod mēp-<br>rior à græcis uocatur.   |
|  |     | 112  |
|  |     | De enchanti tuberculo.   |
|  |     | 113  |
|  |     | De ancyloblepharo oculorum<br>uicio.   |
|  |     | 113  |
|  |     | De ægylopa fistula oculorũ.  |
|  |     | 113  |
|  |     | De pilis palpebrarum oculum<br>irritantibus.   |
|  |     | 113  |
|  |     | De lagophthalmo oculorum.  |
|  |     | 114  |
|  |     | De ectropio.   |
|  |     | 114  |
|  |     | De staphylomate oculi.   |
|  |     | 114  |
|  |     | De clauis oculorum.  |
|  |     | 115  |
|  |     | De natura oculorum, & eorum<br>suffusione.   |
|  |     | 115  |
|  |     | De pituita oculorum.   |
|  |     | 116  |
|  |     | De aurium morbis, qui manu, et<br>scalpello curantur.  |
|  |     | 116  |



|                                     |                                    |     |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| Curta in auribus, labrisq; ac na-   | Et de calculo, curationibusq;      |     |
| ribus, quomodo faciri, Et cura      | eorum.                             | 125 |
| ri possint.                         | Que curatio calculosis adhi-       | 126 |
| De polypi curatione p ferru. 117    | beat.                              | 126 |
| De ozena.                           | Signa calculorum, uel harenoso-    | 127 |
| De ore uicijs, quæ manu, Et fer-    | rum, uel mollium.                  | 127 |
| ro curantur.                        | De calculis foeminarum.            | 127 |
| De dentibus.                        | Quæ curatio calculo emulso ha-     | 128 |
| De una.                             | benda sit.                         | 128 |
| De lingua.                          | De cancro qui excisa uescia nasci- | 128 |
| De abscessu sub lingua.             | tur, et qua cura uti deceat.       | 128 |
| De labris.                          | Si naturalia foeminarum concu-     | 129 |
| De ceruicis uicijs, et curatiõe.    | bitum non admittunt, quomo-        | 129 |
| De umbilici uicijs.                 | do curari conueniat.               | 129 |
| Quomodo aqua hydropicis             | Qua curatione partus emortuus      | 130 |
| emittatur.                          | ex utero excutitur.                | 130 |
| De intestinorum uulneratorum        | De ani uicijs, Et eorum cura-      | 130 |
| curationibus.                       | tione.                             | 130 |
| De interiore parte abdominis ru-    | De condylomatum curatiõe.          | 131 |
| ptæ, Et qua ratione curanda         | De uaricum curatione.              | 131 |
| sit.                                | Curatio digitoru coherentiũ.       | 131 |
| De uariabus uentris.                | De atngrenæ curatione.             | 131 |
| De testiculorum natura, Et mor-     |                                    |     |
| bis eorum.                          | LIBER OCTAVVS.                     |     |
| De testiculoru curatiõibus cõibus,  | De positu, Et figura totius huma-  |     |
| Et primo de incisione, Et cura      | ni corporis.                       | 132 |
| tione inguinis, uel scroti.         | Ossa uiciata, Et corrupta quibus   |     |
| De intestini curatione.             | signis cognoscantur: Et qua        | 134 |
| De omenti curatione.                | ratione curentur.                  | 134 |
| De ramcis curatione.                | Quomodo os excidatur, et de mo-    |     |
| De carne, quæ iter tunicas testicu- | diolo, Et terebra ferramentis      |     |
| lorum concreuit: Et de neruo        | ad id paratis.                     | 135 |
| indurato.                           | De caluarie curatione.             | 136 |
| De ramice inguinis.                 | De narium fracturarum curatio-     |     |
| Ad tegendam glâdem colis si nu-     | ne.                                | 138 |
| da est.                             | De auriu fractarũ curatiõe.        | 138 |
| Quomodo glans penis contracta       | De maxillæ fractæ curatione:       |     |
| aperiri possit.                     | deq; quibusdam ad omnia ossa       |     |
| Infibulandi ratio.                  | pertinentius.                      | 138 |
| De urinae reddendæ difficultate,    |                                    |     |



De iuguli fracti curatione. 139

De costarum fractarum curatione. 139

De spine curatione. 140

De humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fracturum, uel emulсорum, communibus curationibus. 140

De fracti humeri curatione. 141

De brachij fracti curatione. 141

De crurum, femorumq; fracturum curatione. 142

De fracti digiti curatione. 142

Comunes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitosq; confractos pertinentia. 142

De luxatis ossibus. 143

De maxillæ luxatæ curatione. 144

De capite luxato. 144

De spine luxata. 144

De humero luxato. 144

De cubiti luxati curatione. 145

De manu luxata. 145

De palma. 145

De digitis. 146

De femore. 146

De genu. 146

De talo. 146

De planta. 147

De digitis. 147

## INDEX QUINTI SERENI.

Capiti medendo. 149

Hemicraneo medendo. 149

Porrigini depellendæ. 149

Capillo tingendo. 149

Phthiriasi arcendæ. 149

Prurigni, papulis, & scabiei arcendis. 150

Freneſi, ac capiti purgando. 150

Fluori capillorum, & maculis capitis tollendis. 150

Frigori sedando. 150

Elephantiaſi propellendæ. 150

Cutis, & faciei uitij propellendis. 150

Aurium uitij succurrendis. 151

Oculorum dolori mitigando. 151

Dentium uitio, & oris fautori medendo. 151

Vulvæ faucibus, & quæ mollienda sunt medendis. 152

De rigore cervicis. 152

Tuſſi, & coleribus medēdis. 152

Digeſtioni, & ſtomacho. 153

Felli uomitu, uel phthiſi arcendis. 153

Mammis ſanandis, uel ſtringendis. 153

Reiectioni cibi, aut ſanguinis abſtinendæ. 153

Iecoris, & lateris uitij medendis. 154

Spleni curando. 154

Præcordijs ſanandis. 154

Lûbis, & renibus ſanandis. 154

Ventris dolori mitigando. 155

Hydropiſi depellendæ. 155

Ventri molliendo. 155



|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Solutioni uentris, & dysenteriae<br>compescendae.         | 156 | Comiciali morbo medendo.                         | 162 |
| Lumbricis, & tineis purgan-<br>dis.                       | 156 | Regio morbo expellendo.                          | 162 |
| Colo sedando.   | 156 | Dentibus, uel strigis inquietatis<br>infantibus. | 162 |
| Vesicae, & calculo purgando:<br>& urinae prouocandae.     | 156 | Combusturis igne, uel frigore<br>factis.         | 162 |
| De conceptione, & partu.                                  | 157 | Venenis prohibendis.                             | 162 |
| Profluvio cuiusq; sanguinis, &<br>matrici.                | 157 | Venenis datis.                                   | 162 |
| Pilis quibuscunq; interneandis,<br>quae oculos impediunt. | 157 | Vulneribus, & rei dubiae cu-<br>randis.          | 163 |
| Omnibus obscaenis medendis.                               | 157 | Verrucis tollendis.                              | 163 |
| Scies, & articulari morbo.                                | 158 | Hemorrhoidis medendis.                           | 163 |
| Furunculo medendo.  | 158 | Paralysi depellendae. primo die<br>ita agendum.  | 163 |
| Carboni medendo.  | 158 | Secunda ita medendum est.                        | 163 |
| Pani, uomicae, & strumae depel-<br>lendis.                | 158 | Tertia die ita curandum est.                     | 163 |
| Igni sacro medendo.                                       | 159 | Quid quarta die, & reliquis<br>peragendum sit.   | 164 |
| Podagrae depellendae.                                     | 159 |  |     |
| Vulneribus ferro, aut uerberi-<br>bus factis.             | 159 |  |     |
| Vulneribus quibuscunq; casibus<br>actis.                  | 159 |  |     |
| Ab homine, uel simia morsus                               | 159 |  |     |
| Serpentum morsibus, & uenenis<br>pellendis.               | 159 |  |     |
| Istibus scorpij, & morsibus mu-<br>ris caeci, uel aranei. | 160 |  |     |
| Subitaneo dolori, feбри, atq; ostho-<br>wpo.              | 160 |  |     |
| Ad Typum quartanae.                                       | 160 |  |     |
| Ad Typum tertianae.                                       | 161 |  |     |
| Ad Typum quotidianae.                                     | 161 |  |     |
| Hemitritaeo depellendo.                                   | 161 |  |     |
| Fracturis, & luxis sanandis.                              | 161 |  |     |
| Neruis incis, & dolentibus, atq;<br>contractis.           | 161 |  |     |
| Aegris somno asciscendo.                                  | 161 |  |     |
| Lethargiae expellendae.                                   | 162 |  |     |



I  
AVRELII CORNELII CELSI ARTIVM  
LIBER SEXTVS, IDEM MEDI-  
CINAE LIBER PRIMVS.

T alimenta sanis corporibus agricultura, sic sanitatem ægris medicina promittit. hæc quidem nusquam non est. siquidem etiam imperitissimæ gentes herbas, aliq; prompta in auxilium vulnèrum, morborumq; nouerunt. Veruntamen apud Græcos aliquanto magis, quàm in cæteris nationibus excolta est. ac ne apud hos quidem à prima origine, sed paucis ante nos sæculis: ut pote cū uetustissimus author Aesculapius celebretur. qui quoniam adhuc rudem, & uulgarem hanc scientiam paulo subtilius excoluit, in deorum numerum receptus est. huius deinde duo filij Podalirius, & Machaon bello troiano ducem Agamemnonem secuti, non mediocrè opè commilitonibus suis attulerunt. quos tamen Homerus non in pestilentia, neq; in uarijs generibus morborum aliquid attulisse auxilij: sed uulneribus tantummodo ferro, & medicamentis mederi solitos esse proposuit. ex quo apparet has partes medicinæ solas ab his esse tentatas: easq; esse uetustissimas. Eodemq; authore disci potest morbos tum ad iram deorum immortalium relatos esse: & ab iisdem opem posci solitam. ueriq; simile est inter nonnulla auxilia aduersæ ualitudinis, plerumq; tamen eam bonam contingisse ob bonos mores, quos neq; desidat, neq; luxuria tentant. si quidem hæc duo, corpora prius in Græcia, deinde apud nos affligerunt. Ideoq; multiplex ista medicina neq; olim apud Græcos, neq; apud alias gentes necessaria, uix aliquos ex bonis ad senectutis principia perducit. Ergo etiam post eos, de quibus retuli, nonnulli clari uiri medicinam exerceuerunt, donec maiore studio literarum disciplina agitari cœpit. quæ ut animo præcipue omnium necessaria, sic corpori inimica est. Primoq; medendi scientia sapientiæ pars habebatur. ut & morborū curatio, & rerum naturæ contemplatio sub iisdem authoribus nata sit. scilicet his hanc maxime requirerentibus, qui corporū suorū robor a quietâ cogitatione, nocturna q; uigilia minuerant. Ideoq; multos ex sapientiæ professoribus peritos, eius fuisse acceperimus. clarissimos uero ex his Pythagorā, et Empedoclem, & Democritum. huius autem, ut quidā crediderunt, discipulus Hipocrates Cus: primus quidē ex omnibus memoria dignus, ab studio sapientiæ disciplinam hanc separauit: uir & arte, & facundia insignis. Post quem Diocles Carystus, deinde Praxagoras, et Chrysippus, Aurelij Cor.



## LIBER

tum Herophilus, et Erasistratus sic artem hanc exercuerunt, ut etiā in diuersas curandi vias processerint. Iisdemq; temporibus in tres partes medicina diducta est, ut una esset quæ victu, altera quæ medicamentis, tertia quæ manu mederetur. Primā διατητικὴν, secundā παρμαστικὴν, tertiam χειρουργικὴν Græci nominauerunt. Eius autē quæ victu morbos curat longe clarissimū authores etiam altius quædam agitare conati, rerum quoq; naturæ sibi cognitionem uendicauerunt, tanquam sine ea trunca, et debilis mediana esset. Post quos Serapion primus omnium nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinā professus, in usu tantum, et experimentis eam posuit. quem Apollonius, et Glaucias, et aliquanto post Heraclides Tarentinus, et aliqui non mediocres uiri secuti, ex ipsa professione se ἐμπειροὺς appellauerunt. Sic in duas partes ea quoq; quæ victu curat, medicina diuisa est: alijs rationalem artem, alijs usum tantum sibi uendicantibus. nullo uero quicq; post eos, qui supra comprehēsi sunt, agitante, nisi quod acceperat: donec Asclepiades medendi rationē ex magna parte mutauit. Ex cuius successoribus Themison nuper ipse quoq; quædam in senectute deflexit. Et per hos quidem maxime uiros salutaris ista nobis professio increuit. Quoniam autem ex tribus medicinæ partibus ut difficillima, sic etiam clarissima est ea, quæ morbis medetur: ante omnia de hac dicendum est. Et quia prima in ea dissensio est, quod alijs sibi experimentorum tantummodo notitiā necessariam esse contendunt: alijs nisi corporum, rerumq; ratione comperta, non satis potentem usum esse proponunt: indicandum est quæ maxime ex utraq; parte dicantur: quo facilius nostra quoq; opinio interponi possit. Igitur hi qui rationalem medicinā proficiuntur, hæc necessaria esse proponunt. abditarum, et morbos continentium causarū notitiā, deinde euidentium: post hæc etiam naturalium actionum nouissime partiū interiorū. Abditas causas uocant in quibus requiritur ex quibus principijs nostra corpora sint: quid secundam, quid aduersam ualeitudinem faciat. Neq; enim credunt posse eum scire quomodo morbos curare conueniat, qui unde hi sint, ignoret. Neq; esse dubiū, quin alia curatione opus sit, si ex quatuor principijs uel superans aliquid, uel deficiens aduersam ualeitudinem creat: ut quidam ex sapientie professoribus dixerunt. Alia si in humidis omne uitium est, ut Herophilo uisum est. alia si in spiritibus, ut Hippocrati. alia si sanguis in eas uenas, quæ spiritui accommodatæ sunt, transfunditur: et inflammationem quam Græci φλεγμὴν nominant, excitat: eaq; inflammatio talem motum efficit, qualis in febre est: ut Erasistrato placuit. alia si manantia corpuscula per inuisibilia foramina subsisten-



do iter claudunt: ut Aesclepiades contēdit. Eum uero recte curaturū, quem prima origo causae non fefellerit. Neque uero insciantur experientia quoque esse necessaria. sed ne ad haec quidē adiūm fieri potuisse, nisi ab aliqua ratione contendunt. Non enim quidlibet et antiquiores uir os aegri inculcasse: sed cognasse quod maxime conueniret: et id usu explorasse, quod ante coniectura aliqua duxisset. neque interesse an initia per se explorata sint, si a consilio tamen coeperunt. et id quidē in multis ita se habere. Saepe uero ēt noua inuadere genera morborū, in quibus nihil adhuc usus ostenderit. et ideo necessariū sit animaduvertere unde ea coeperint, sine quo nemo mortalium reperire possit, cur hoc, quam illo potius utatur. et ob haec quidē in obscuro positas causas persequuntur. Euidentes uero has appellant, in quibus querunt initium morbi calor attulerit, an frigus. famēs, an satietas. et quae similia sunt. Occursurū enim uitio dicunt eum, qui originē non ignorarit. Naturales uero corporis actiones appellāt, per quas spiritum trahimus, et emittimus cibum: potionemque, et assumimus, et concoquimus. Itemque per quas eadē haec in omnes membrorum partes digeruntur: tum requirunt et quare uenae nostrae modo submittant sese: modo attollant. quae ratio somni, quae uigiliae sit. sine quorum notitia neminem putant uel currere, uel mederi morbis, inter haec nascentibus, posse. Ex quibus quia quā maxime pertinere ad rem concoctio uidetur. Huic potissimum insistenti: et duce alij Erasistrato atteri cibū inuenire contendunt. alij Plistonico Praxagorae discipulo putrescere. Alij credunt Hippocrati per calorem cibos concoqui. Acceduntque Aesclepiadis amuli, quod omnia ista uana, et superuacua esse proponunt. Nihil enim concoqui, sed crudam materiam, sicut assumpta est, in corpus omne diduci. Et haec quidē inter eos parū constant. Illud uero cōuenit, alium dandū cibum laborantibus, si hoc: alium si illud uerū est. Nam si teritur intus, eum querendū esse, qui facillime teri possit. Si putrescat, eū in quo hoc expeditissimū est. Si calor concoquit, eū qui maxime calorem moueat. At nihil ex his eē querendū, si nihil concoquitur. Ea uero sumenda, quae maxime manēt, qualia assumpta sunt. Eadēque ratione cū spiritus grauis est, cū somnus aut uigilia urget, eū mederi posse arbitrantur: quod prius illa ipsa, qualiter eueniant, peperit. Praeter haec cū in interioribus partibus et dolores, et morborū uaria genera nascantur, neminē putant his adhibere posse remedia, quae ipse ignoret. Necessariū ergo esse inuadere corpora mortuorum: eorumque uiscera, atque intestina scrutari. Longeque optime fecisse Hierophilū, et Erasistratū, quod nocētes homines a regibus ex carcere acceptos, uinos inuaderint: cōsiderarimque et spiritu manente, ea quae natura ante clausisset: eorumque positurā, colorem, figurā, magnitudinē, ordinem,



duritiem, mollitiem, leuorem, contactum: processus deinde singulorum, & recessus: & sine quid inseritur alteri: sine quid partē alterius in se recipit. Neq; enim cum dolor inuis incidit, scire quid doleat eum, qui qua parte quodq; uiscus intestinum ne sit, non cognouerit. Neq; curari id quod ægrū est, posse ab eo, qui quid sit, ignoret. Et cum p. uulnus alicuius uiscera patefacta sunt, eum, qui sanæ cuiusq; colorē partitis ignoret, nescire quid integrū, quid corruptum sit. Ita ne succurrere quidem posse corruptis. aptiusq; extrinsecus imponi remedia, cōpertis interiorum, & sedibus, & figuris. Cognitāq; eorū magnitudine, similesq; omnia, quæ posita sunt, rationes habere. Neq; esse crudele, sicut pleriq; proponunt, hominū nocentium: & horum quoq; paucorum supplicij remedia populus innocentibus seculorum omnium queri. Contra hi, qui se e. ueripiūds ab experientia nominant: euidentes quidē causas ut necessarias amplectuntur. Obscurarū uero causarum, & naturalium actionum quæstionem ideo supernam esse contendunt, quoniam incōprehensibilis natura sit. non posse uero cōprehēdi, patere ex eorum, qui de his disputarunt, discordia: cum de ista re, neq; inter sapiētiæ professores, neq; inter ipsos medicos conueniat. Cur enim potius aliquis Hippocrati credat, q̄ Herophilo? Cur huic potius, q̄ Asclepiadi? si rationes sequi uelit, omnium posse uideri non improbabiles. si curatiōes, ab omnibus his ægros perductos esse ad sanitatē. Ita neq; disputationi, neq; authoritati cuiusq; fidē derogari oportuisse. Etiam sapientiæ studiosos maximos medicos esse, si ratiocinatio hoc faceret. nunc illis uerba superesse, deesse medendi scientiam. Differre quoq; pro natura locorū genera medicine: & aliud opus esse Romæ: aliud in Aegypto: aliud in Gallia. Quod si morbos eadem causæ facerent ubiq; remedia quoq; ubiq; eadē esse debuissent. sæpe ēt causas apperere: ut puta lippitudinis, uulneris, neq; ex his patere medianam. Quod si scientiā hanc non subijciat euidentis causa, multo minus eam posse subijcere, quæ in dubio est. Cū igitur illa incerta incōprehēbilisq; sit, a certis potius, et exploratis petendū esse præsidij. i. his, quæ experientia in ipsis curationibus docuerit, sicut in cæteris omnibus artibus. Nam ne agricolam quidem, aut gubernatorem disputatione, sed usu fieri. ac nihil istas cogitationes ad medianam pertinere. Eo quoq; discit, quod qui diuersa de his scripserint, ad eandē tamen sanitatē homines perduxerint. id enim fecisse, q̄ a nō ab obscuris causis, neq; a naturalibus actionibus, quæ apud eos diuersæ erant: sed ab experimentis pro ut cuiq; responderant, medendi uias traxerint: ne inter initia quidem ab istis quæstionibus deductā esse medianam, sed ab experimentis. Aegrorum enim, qui sine medicis erāt, alios propter auiditatē



primis diebus protinus cibum assumpsisse: alios propter fastidiū absti-  
nuisse: leuatumq; magis eorū morbum esse, qui abstinerant. Itemq;  
alios in ipsa febre aliquid edisse: alios paulo ante ea: alios post remissio-  
nem eius. optime deinde his cessasse, qui post finē febris id fecerint. Ea  
dēq; ratione alios inter principia protinus usos esse cibo pleniore: alios  
exiguū: grauioreq; eos factos, qui se impleverant. Hæc similiaq; cū coti-  
die inciderent, diligentes homines notasse, quæ plerumq; melius respon-  
derent: deinde ægotatibus ea præcipere cœpisse. sic medicinam ortā,  
subinde aliorū salute, aliorū interitu: pernicioſa discernentē à salutaribus.  
Repertis deinde medicine remedijs, hoies de rationibus eorū disſe-  
rere cœpisse: nec post rationē medicinam esse inuentam, sed post inue-  
tam medicinā rationē esse quæſitam. Requiritur et si ratio idē doceat  
quod experientia, an aliud. Si idē, superuacua esse. si aliud, et con-  
trariam. Primo tamen remedia explorāda summa cura fuisse. nunc  
uero iam explorata esse: neq; ulla, aut noua genera morborū reperiri,  
aut nouam desiderari medicinā. Quod si iā incidat mali genus ali-  
quod ignotū: non ideo tamen fore medico de rebus cogitandū obscu-  
ris: sed eū protinus uisurū, cui morbo id proximū sit: tentaturūq; re-  
media similia illis, quæ uicino malo sæpe ſuauererint. Et per eius ſe-  
militudinē opem reperturū. Neq; n. se dicere conſilio medicū non ege-  
re: Et irrationale animal hanc artē poſſe præſtare. ſed has latentiu  
rerū coniecturas ad rē non pertinere: quia non inter ſit, quid morbi  
ficiat, ſed quid tollat. Neq; ad rē pertineat quomodo, ſed qd optima  
digeratur: ſiue hac de cauſa cōcoctio inadat, ſiue de illa. Et ſiue cō-  
coctio ſit illa, ſiue tantū digeſtio. Neq; quædū eſſe quomodo ſpiremus:  
ſed quid graue, tardumq; ſpiritū expediat. neq; quid uenas moueat:  
ſed quid quæq; motus genera ſignificent. Hæc aut cognosci experimē-  
tis, Et in omnibus eiꝰſmodi cogitationibus in utrāq; partē diſſeri poſ-  
ſe. Itaq; ingeniū Et ſacundiam uincere: morbos aut non eloquentia,  
ſed remedijs curari. Quæ ſi quis elinguis uſu diſcreta bene norit: hūc  
aliquanto maiore medicinam futurū: q̄ ſi ſine uſu linguæ ſuæ excolue-  
rit. Atq; ea quidē, de quibus eſt dictū, ſuperuacua eſſe tantummodo.  
Id uero quod reſtat et crudele: niuorū hominum aliuū, atq; præcor-  
dia incidit: Et ſalutis humanæ præſidē artē non ſolū peſtem alicui,  
ſed hanc et atrociffimam inferre: cū præſertim ex his, quæ tanta uio-  
lentia quærantur, alia non poſſint omnino cognosci: alia poſſint et  
ſine ſcelere. nā colorem, leuorē, mollitiem, duritiem, ſimiliaq; omnia  
nō eſſe talia incoſto corpore, qualia integro fuerint. q̄ cū corporibus in-  
uolatis, hæc tamen metu, dolore, inedia, cruditate, laſſitudine, mille alijs  
mediocribus affectibus ſæpe mutantur: multo magis uerifiſimile eſt inte-



## LIBER

riora, quibus maior mollities lux ipsa noua sit, sub grauissimis ulneribus et ipsa trucidatione mutari: neque quicquam esse stultius, quam quale quodque uiuo homine est, tale existimare esse moriente, immo iam mortuo. Nam utrum quidem, qui minus ad rem pertineat, spirante homine posse diduci? simulatque uero ferrum ad praecordia accessit: et discissum transversum septum est: quod membrana quadam superiores partes ab inferioribus diducit, (διὰ πρᾶξιν ἑλπίς ἡ γὰρ ἡμεῖς ὀνομάζομεν) hominem protinus animam amittere. Ita demum mortui praecordia, et uiscus omne in conspectum latrocinantis medici dari: quod necesse sit tale esse, quale mortui sit: non quale uiui fuit. Itaque consequi medicum ut hominem crudeliter iugulet: non ut sciat qualia uiui uiscera habeamus. Si quid tamen sit, quod adhuc spirante homine conspectui subiiciatur, id saepe casum offerre curantibus. Interdum enim gladiatorem in arena, uel militem in acie, uel uiatorem a latronibus exceptum, sic vulnerari: ut eius interior aliqua pars aperiatur: et in alio alia sita: sedē, positum, ordinem: figurā: similiaque alia cognoscere prudentem medicum non cedere, sed sanitatem molientem: idque per misericordiam discere, quod alij dira crudelitate cognouerint. Ob haec ne mortuorum quidem laceratione necessaria esse: quae et si non crudelis, in foeda sit: cum aliter pleraque in mortuis se habeant. Quatum uero in uiuis cognosci potest, ipsa curatio ostendat. Cum haec per multa uolumina, per quae magnae contentiones disputationes a medicis saepe tractatae sint, atque tractentur: subiiciendum est, quae proxima uero uideri possint: ea neque addicta alterutri opinioni sunt: neque ab utraque nimium abhorrentia, media quodammodo inter diuersas sententias. Quod in plurimis contentionibus deprehendere licet sine ambitione uerum scrutantibus: ut in hac ipsa re. Nam quae demum causae uel secundam ualitudinem praestent: uel morbos excitent: quomodo spiritus, aut cibis uel detrahatur, uel digeratur: ne sapientiae quidem professores scientia comprehendunt: sed coniectura persequuntur. cuius autem rei non est certa notitia, eius opinio certum reperire remedium non potest. Verumque est ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre, quam experientiam. Quamquam igitur multa sint ad ipsas artes proprie non pertinentia: tamen eas adiuvat excitando artificis ingenium. Itaque ista quoque naturae rerum contemplatio quam non faciat medicum aptiorem, tamen medicinae reddit perfectum. Verumque simile est et Hippocrati, et Erasistrato, et quicumque alij non contenti febres et ulcera agitare, rerum quoque naturam ex aliqua parte scrutati sint: non ideo quidem medicos fuisse: uerum ideo quoque maiores medicos extitisse. Ratione uero opus est ipsi medicinae, et si non inter obscuras causas, neque inter naturales actiones, in saepe. Est enim haec ars coniecturalis: neque respondet ei plerumque non solum coniectura,



sed etiam experientia. et interdum non febris, non cibus, non somnus subsequitur sicut assuevit. Rarius, sed aliquando tamen morbus quoque ipse nouus est, quem non incidere, manifeste falsum est: cum aetate nostra quaedam ex naturalibus partibus carne prolapsa, et arente, intra paucas horas expirauerit: sic ut nobilissimi medici neque genus mali, neque remedium inuenerint: quos ego nihil ideo tentasse iudico: quia nemo in splendida persona periclitari coniectura sua uoluerit: ne occidisse, nisi seruasset, uideretur. Veri tamen simile est, potuisse aliquid cogitare detracta tali uerecundia: Et fortasse responsurum fuisse id quod aliquis esset expertus. Ad quod medicinae genus neque semper similitudo aliquid confert: Et si quando confert: tamen id ipsum rationale est inter multa similia genera et morborum, et remedium cogitare, quo potissimum medicamento sit utendum. Cum igitur talis res incidit: medicus aliquid oportet inueniat: quod non utique fortasse, sed sepius tamen etiam respondeat. Petet autem nouum quoque consilium non ab rebus latentibus (istae enim dubiae, et incertae sunt) sed ab his quae explorari possunt: idest euidentibus causis. Interest enim fatigatio morbum: an sitis, an frigus, an calor, an uigilia, an fames fecerit: an cibi, uinique abundantia: an intemperantia libidinis: neque ignorare hunc oportet, quae sit aegri natura, humidum magis, an magis siccum corpus eius sit: ualidi nerui, an infirmi: frequens aduersa ualitudo, an rara, ea, quae cum est, uehemens esse soleat: an leuis, breuis, an longa. Quod is uitae genus sit secutus, laboriosum, an quietum, cum luxu, an cum frugalitate. ex his enim, similibusque sepe currendi noua ratio ducenda est. Quamuis ne haec quidem sic praeteriri debent, quasi nulla controuersia recipiant. Nam et Erasistratus non ex his fieri morbos dixit: quoniam et alij, et ipse alij is post ista non febri citarent: Et quidam medici saeculi nostri sub authore (ut ipsi uideri uolunt) Themisone, contendunt nullius causae notitiam quicquam ad curationes pertinere: satisque esse quaedam cōia morborum intueri. si quidem horum tria genera esse, unum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum. Nam modo parum excernere aegros, modo nimium: modo alia parte partem, alia nimium. Haec autem genera morborum modo acuta esse, modo longa: Et modo incrementum, modo consistere: modo minui consueverunt. Cognito igitur eo quod ex his est, si corpus adstrictum est, digerendum esse: si profusio laborat, continendum. si mixtum uitium habet, occurrendum subinde uehementiori malo. et aliter acutis morbis medendum, aliter uetustis. aliter incrementibus, aliter substituentibus. aliter iam ad sanitatem inclinantibus. Horum observationem medicinam esse: quam ita finiunt, ut quasi uiam quandam quam uicodorus graeci nominant: eorumque quae in



## LIBER

morbis cōia sunt, contemplatricē esse contendunt: ac neq; rationalibus  
 se, neq; experimenta tantum spectatibus annumerari uolunt: cū ab illis  
 eo nomine dissentiant, quod in cōiectura rerū latentū nolunt esse me-  
 dicinā: ab his eo quod parū artis esse in obseruatione experimentorū  
 credunt. Quod ad Erasistratū pertinet, primū ipsa euidentia eius  
 opinioni repugnat: q̄a raro nisi post horū aliquid morbus uenit. De-  
 inde non sequitur, ut quod aliū non afficit, aut eundē aliās: id ne al-  
 teri quidē, aut eidem tempore alio noceat. Possunt enim quædā subesse  
 corpori, uel ex infirmitate eius, uel ex aliquo affectu: quæ uel i alio nō  
 sunt: uel in hoc aliās nō fuerunt. eaq; p se non tanta uī concitant mor-  
 bum: tamen obnoxiiū magis alijs iniurijs corpus efficiunt. Quod si cō-  
 tēplationem rerū naturæ, quā temere medici sibi uendicant: satis cō-  
 prehēdissent: et illud scīsser: nihil omnino ob unā causam fieri, sed id pro  
 causa apprehendi: quod cōtulisse plurimū uidetur. Potest aut id dū sō-  
 lum est, nō mouere: quod iunctū alijs maxime mouet. A credit ad hæc,  
 quod ne ipse quidē Erasistratus, qui trāssuso in arterias sanguine, fe-  
 brem fieri dicit: idq; nimis repleto corpore incidere repperit: cur ex  
 duobus æque repletis, alter in morbiū incidere: alter omni periculo  
 uacuit: quod cotidie fieri apparet, nō discreuerit. Ex quo disci pōt, ut  
 uera sit illa trāssusio, tamen illā non p se, cum plenū corpus est, fieri:  
 sed cū horū aliquid accesserit. Themisonis uero æmuli, si pperca quæ  
 promittunt, habent: magis ē q̄ ulli rationales sunt. Neq; n si quis nō  
 omnia tenet, quæ rationalis alius probat: protinus alio nouo nomine  
 artis indiget. Si modo, quod primū est: non memoriæ soli, sed rationi  
 quoq; insit. Si quod uero propius est, uix ulla perpetua præcepta  
 medicinalis ars recipit: ijdē sunt, quod hi, quos experimenta sola susti-  
 nent. Eo magis qm si cōpresserit aliquē morbus, an fuderit: quilibet  
 ē imperitissimus uidet. Quid aut cōpressum corpus resoluat: quid sō-  
 lutū teneat: si à ratione tractū est, rationalis est medicus. Si ut ei, qui  
 se rationale negat, cōfiteri necesse est: ab experientia empiricus est. Ita  
 apud eū morbi cognitio extra artē, medicina intra usum ē. Neq; ad-  
 iectum quicq̄ empiricorū professioni, sed demptum est: qm illi multa  
 circūspiciunt: hi tantum facillima & non plusq̄ uulgaria. Nā & hi  
 qui pecoribus ac iumentis medentur, cū propria cuiusq; ex multis ani-  
 malibus nosse non possint: cōibus tantummodo insistant. Et exteræ gē-  
 tes, cum subtile medicinæ rationē non nouerint: cōia tantum uident.  
 Et qui ample ualitudinarios nutriunt, quia singulis summa cura cō-  
 sulere non subsistunt: ad cōia ista confugunt. Neq; Hercules istud, et  
 antiqui medici nescierunt: sed his contenti non fuerunt. Ergo ēt uetu-  
 stissimus author Hippocrates dixit mederi oportere & cōia, & pro-



pria inueniē. Ac ne isti quidē ipsi intra suam professionem consisterē ullo modo possunt. si quidē & cōpressorum, & fluentium morborum genera diuersa sunt: faciliusq; id in his quæ fluunt, inspicī pōt. Aliud est. n. sanguine, aliud bilem, aliud cibū uomere: aliud deiectionibus, aliud torminibus laborare: aliud sudore digeri: aliud tabe cōsumi. Atq; in partes quoq; humor erumpit, ut in oculos, auresq;. quo piculo nullum humanū membrum uacat: nihil aut horū sic, ut aliud curatur. Ita protinus in his à cōi fluentis morbi cōtēplatione ad propriam medicina descendit. Atq; in hac quoq; rursus alia proprietatis noticia sepe necessaria est: quia non eadē omnibus ē in similibus casibus opitulantiur. si quidē certæ quædā res sunt, quæ in pluribus uē trem aut astringunt, aut resolvunt: inueniuntur tñ in quibus aliter, atq; in cæteris idem eueniat. In his ergo cōmuniū inspectio contraria est: priorū tantū salutaris: et causæ quoq; æstimatio sepe morbum soluit. Ergo ē ingeniosissimus seculi nostri medicus, quem nuper uidimus, Cassius febricitanti quidam, & magna siti affecto, cum post ebrietatem eū premi cœpisse cognosceret: aquam frigidā ingressit: quæ ille epotæ, cum uini uim miscendo fregisset, protinus febrē iunio & sudore discussit. Quod auxilium medicus opportune prouidit, nō ex eo, quod aut strictum corpus erat, aut fluebat: sed ex causa, quæ ante præcesserat. Estq; etiam proprium aliquid & loci, & temporis istis quoq; authoribus: qui cum disputant quemadmodum sanis hominibus agendum sit, præcipiunt ut grauib; aut locis, aut temporibus magis uitetur frigus, æstus, facietas, labor, libido: magisq; ut conquiescat hisdem aut locis aut temporibus, si quis grauitatem corporis sentit: ac neq; uomitu stomachum, neq; purgatione aluum sollicitet. Quæ uera quidem sunt: à communibus tamen ad quædam propria descendunt. nisi persuadere nobis uolunt, sanus quidem considerandum esse: quod cælum, quod tempus anni sit, ægris uero non esse: quibus tanto magis omnis observatio necessaria est, quanto magis obnoxia offensis infirmitas est. Quin etiam morborum in hisdem hominibus aliæ, atq; aliæ proprietates sunt: & qui secundis aliquando frustra curatus est: contrarijs sepe restituitur. Plurimaq; in dando cibo discrimina reperiuntur: ex quibus contentus uno ero. nam famem facilius fert adulescens, quàm puer: facilius in denso cælo, quàm in tenui: facilius in hyeme, quàm in æstate: facilius uno cibo, quàm prandio quoq; assuetus: facilius in exercitatus, quàm exercitatus homo sustinet. Sæpe autem in eo magis necessaria cibi festinatio est, qui minus in ediam tolerat. Ob quæ competit eum qui propria non nouit, communia tantum intueri debere: cumq; qui nosse propria potest, illa quidem non oportere negli-



LIBER

gere, sed his quoque insistere. Ideoque cum par scientia sit, utiliore tamen medicum esse amicum, quam extraneum. Igitur ut ad propositum meum redeam, rationalem quidem puto medicinam esse debere: instrui uero ab evidentibus causis, obscuris omnibus non à cogitatione artificis, sed ab ipsa arte reiectis. Incidere autem uiuorum corpora, et crudele, et superuacuum est: mortuorum corpora discantibus necessarium. Nam positum, et ordinem nosse debent, quæ cadauera melius, quam uiuus et uulneratus homo representant: sed et cætera quæ modo in uiuis cognosci possunt, in ipsis curationibus uulneratorum paulo tardius, sed aliquando mitius usus ipse monstrauit. His propositis, primum dicam quemadmodum sanos agere conueniat: tum ad ea transibo, quæ ad morbos, curationesque eorum pertinebunt.

Caput primum quemadmodum sanos agere conueniat.

Annus homo qui et bene ualet, et suæ spontis est, nullis obligare se legibus debet: ac neque medico, neque iatrolipta egere. Huc oportet uariū habere uitæ genus: modo ruri esse, modo in urbe: sæpiusque in agro, nauigare, uenari, quiescere interdum: sed frequentius se exercere. Siquidem ignauia corpus hebetat: labor firmat: illa maturam se nequitiam: hic longam adolescentiam reddit. Prodest etiam interdum balneo, interdum aquis frigidis uti. modo ungi, modo id ipsum negligere. nullum tibi genus fugere, quo populus utatur. interdum in conuiuium esse: interdum ab eo se retrahere. modo plus iusto, modo non amplius assumere. bis die potius, quam semel cibum capere, et semper quam plurimum, dummodo hunc concoquat. Sed ut huius generis exercitationes, cibusque necessarij sunt, sic athletici superuacui: nam et intermissus propter ciuiles aliquas necessitates ordo exercitationis corpus affligit: et ea corpora, quæ more eorum repleta sunt, celerrime, et senescunt, et agrotant. Concubitus uero neque nimis concupiscendus, neque nimis pertimescendus est. Rarus corpus excitat: frequens soluit. Cum autem frequens non numero sit, sed natura: ratione ætatis et corporis: scire licet eum non inutilem esse, quem corporis neque languor, neque dolor sequitur. Idem interdum peior est, nocturnus. ita tamen se neque illum cibus, neque hunc cum uigilia labor statim sequitur. Hæc firmis seruanda sunt: cauendumque ne in secunda ualentudine aduersæ præsidia consumantur.



## Quæ stomacho imbecilli seruanda sint, Caput secundum.

T imbecillis stomacho, quo in numero magna pars urbanorum, omnesq; penè cupidi literarum sunt: obseruatio maior necessaria est. ut quod uel corporis, uel loci, uel studij ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur q; bene cōcoxit, mane tuto surget. qui parū, quiescere debet. Et si mane surgendi necessitas fuerit, redormire. Qui nō cōcoxit, ex toto conquiescere: ac neq; labori se, neq; exercitationi, neq; negotio credere. Qui crudū sine præcordiorum dolore ructat, is ex intervallo aquā frigidā bibere: Et se nihilominus continere. Habitare uero ædificio lucido per statum æstiuum hibernum solem habente. cauere meridianum solem: matutinum, Et uespertinum frigus: itemq; auras fluminum, atq; stagnorum: minimēq; nubilo cælo soli aperienti se committere: ne modo frigus, modo calor moueat. quæ res maxime grauedines, distillationesq; concitat. Magis uero grauib; locis ista seruanda sunt: in quibus et pestilentiam faciunt. Scire aut licet integrum corpus esse, cum cotidie mane urina alba, dein ruffa est. Illud cōcoquere, hoc cōcoxisse significat. Vbi experrectus est aliquis, paulum intermittere: deinde nisi hyems est, fouere os multa aqua frigida debet, longis diebus meridiari potius ante cibum, sin minus, post eum. per hyem potissimum totis noctibus conquiescere. Sin lucubrandum est, nō post cibum id facere, sed post concoctionem. Quem interdū uel doimestat, uel ciuilia officia tenuerunt: huic tempus aliquod seruandum curationi corporis sui est. Prima autem eius curatio exercitatio est: quæ semper antecedere cibum debet: in eo qui minus laborauit, Et bene cōcoxit, amplior. in eo qui fatigatus est, Et minus cōcoxit, remissior. Commodè uero exercent clara lectio, arma, pila, cursus, ambulatio: atq; hæc non utiq; plana commodior est. siquidem melius ascensus quoq; Et descensus cum quadam uarietate corpus moueat: nisi tamen id perquam imbecillum est. melior autem est sub diuo, quàm in porticu. melior si caput patitur, in sole, quàm in umbra. melior in umbra, quam parietes, aut uiridaria efficiunt, quàm quæ tecto subest. melior recta, quàm flexuosa. exercitationis autem plerunq; finis esse debet sudor: aut certe lassitudo, quæ citra fætigationem sit: idq; ipsum modo minus, modo magis faciendum est. Ac ne his quidem athletarum exemplo, uel certa esse lex, uel immodicus esse labor debet. Exercitationem recte sequitur modo unctio uel in sole, uel ad ignem: modo balneū, sed conclauī quammaxime, Et alto, Et lucido, et spaciōso. Ex his uero neutrum sæpe fieri oportet: sed sæpius alterutrum



LIBER

pro corporis natura. Post hæc paulum conuiescere opus est. ubi ad cibum uentum est: nunquam utilis est nimia sacietas. sæpe etiam inutilis nimia abstinentia. sæpe si qua intemperantia subest: tutior est in potione quam in esca. Cibus a salsamentis, oleribus, similibusq; rebus melius incipit. Tum caro assumenda est, quæ assa optima, aut elixa est. Conditæ omnia duabus de causis inutilia sunt. quoniam & plus propter dulcedinem assumitur: et quod modo par est, tamen ægrius concoquitur. Secunda mensa bono stomacho nihil nocet: in imbecillo coarcescit. si quis itaq; hoc parum ualet, palmulas, pomaq; et similia melius primo cibo assumit. Post multas potiones, quæ aliquantum sitim exasserunt, nihil edendū est. post sacietatem, nihil agendum. Vbi expletus est aliquis, facilius concoquit: si quicquid assumpsit, potione aquæ frigida includit: tum paulisper inuigilat: deinde bene dormit. Si quis interdum se implebit: post alium neq; frigori, neq; aestui, neq; labori se debet committere. neq; enim tam facile hæc inani corpore, quā repleto nocet. Si quibus de causis futura inedia est: labor omnis uitandus est.

Observationes quedam prout res nouæ accidunt: & prout corporū genera, & sexus, & ætates, & tempora anni sunt. Caput tertium.

Itq; hæc quidem penè perpetua sunt. Quasdam autem observationes desiderant & nouæ res, et corporū genera, & sexus, et ætates, & tempora anni. Nam neq; ex salubri loco in grauem, neq; ex graui in salubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in grauem prima hyeme, ex graui in eum, qui salubris est, prima æstate transire melius est. Neq; uero ex multa fame nimia sacietas: neq; ex nimia sacietate fames idonea est. Periclitaturq; & qui semel, & qui bis die cibum incontinententer contra consuetudinem assumit. Item neq; ex nimio labore subitum otium: neq; ex nimio otio subitus labor sine graui noxa est. Ergo cum quis mutare aliquid uolet, paulatim debet assuescere. Omnem etiam laborem facilius uel puer, uel senex, quam insuetus homo sustinet. Atq; ideo quoq; nimis ociosa uita utilis non est, quia potest incidere laboris necessitas. Si quando tamen insuetus aliquis laborauit, aut multo plus quam solet, etiam si qui assueuit, huic ieiunio dormiendum est: multo magis si etiam os amarum est: uel oculi caligant: aut uenter perturbatur. Tum enim non dormiendum tantummodo ieiunio est, sed etiam in posterum diem permanendum: nisi cito id quies sustulit. Quod si factum est: surgere oportet, & lente paululum ambulare. At si somni necessitas non fuit, quia modice magis



aliquis laborauit, tamen ingredi aliquid eodē modo debet. Cōmunia  
deinde omnibus sunt post fatigationem cibum sumpturus, ubi paulum  
ambulauerunt, si balneum nō est, calido loco uel in sole, uel ad ignem  
ungi: atq; sudare. si est, ante omnia intepidario residere. Deinde ubi  
paulum conquieuerunt, intrare, et descendere in solium. tum multo oleo  
ungi, leniterq; perfricari: iterum in solium descendere. Post hæc os  
aqua calida fouere, deinde frigida. Balneum his feruens idoneū nō  
est. Ergo si nimium alicui fatigatio penē febris est, huic abunde est loco  
tepidus demittere se inguinibus tenus in aquam calidam, cui paulū olei  
adiectum: deinde totum quidē corpus, maxime tamen eas partes, quæ  
in aqua fuerunt, leniter perfricare ex oleo, cui uinum, et paulum con  
triti salis sit adiectum. Post hæc omnibus fatigatis, aptum est cibum  
sumere, eoq; humido uti. aqua, uel certe diluta portione esse contentos, ma  
ximēq; ea, quæ moueat urinam. Illud quoq; nosse oportet, quod ex la  
bore sudanti frigida potio perniciosissima est. atq; etiam cum sudor se  
remisit, itinere fatigatis inutilis. A balneo quoq; uenientibus Aesclepi  
ades inutilem eam indicauit. quod in his uerum est, quibus aliis faci  
le nec tuto resoluitur: quiq; facile inhorrescunt. perpetuū in omnibus  
non est, cum potius naturale sit portione æstuantem stomachum refri  
gerari: frigentem calefieri. quod ita præcipio, ut tamen fatear ne ex  
hac quidem causa sudanti adhuc frigidum bibendum esse. Solet etiā  
prodesse post uariū cibum, frequentesq; dilutas portiones, uomitus, et  
postero die longa quies, deinde modica exercitatio. Si assidua fatigatio  
urget, inuicem modo aqua, modo uinum bibendum est: raroq; balneo  
utendum. Leuatq; lassitudinem etiam laboris mutatio: eumq; quem  
nouum genus eiusdem laboris pressit, id quod in consuetudine est, re  
ficit. Fatigatio cotidianum acibile tutissimū est: insolitum contra lassat.  
quod enim contra consuetudinem est, nocet, seu molle, seu durum est.  
proprie quædam ad eum pertinent, qui ambulando fatigatur. Hunc  
reficit in ipso quoq; itinere frequens frictio: post iter, primum sedile,  
deinde unctio: tum calida aqua in balneo magis superiores partes, q̃  
inferiores foueat. Si quis uero exustus in sole est, huic in balneum pro  
tinus eundem est: perfundendumq; oleo corpus, et caput. deinde in  
solium bene calidum descendendum est. tum multa aqua per caput in  
fundēda prius calida, deinde frigida. At ei qui perfruxit, opus est in  
balneo primum inuoluto sedere, donec insudet: tum ungi, deinde lau  
ari. cibum modicum, deinde portiones meras assumere. Is uero qui na  
uigauit, et nausea pressus est, si multam bilem euomuit, uel abstinere  
cibo debet: uel paulum aliquid assumere. Si pituitam acidam effu  
dit, utiq; sumere cibum: sed assueto leuiorem. Si sine uomitu nausea



## LIBER

fuit, uel abstinere, uel post cibū uomere. Qui uero toto die, uel in uehiculo, uel in spectaculo sedet, huic nihil currendū, sed lente ambulandum est. Lenta quoq; in balneo mora, dein cœna exigua prodisse consueuerunt. Si quis in balneo astat, reficit hunc ore exceptum, & in eo retentum acutum. si id non est, eodem modo frigida aqua assumpta. Ante omnia autem norit quisq; naturā sui corporis: quoniam alij graciles, alij obese sunt. alij calidi, alij frigidiores. alij humidi, alij siccī. alios astricta, alios resoluta aluus exercet. raro quisquam non aliquam partem corporis imbecillam habet. Tenuis uero homo implere se debet: plenus extenuare: calidus refrigerare: frigidus calefacere: madens siccare: siccus madefacere. itemq; aluum firmare is, cui fusa soluere is, cui astricta est. Suacurrendumq; semper parti maxime laboranti est. Implet autem corpus modica exercitatio, frequentior quies, unctio. & si post prandium est balneum, contracta aluus, modicum frigus hyeme, somnus & plenus, & non nimis longus. molle cubile, animi securitas, assumpta per cibos, & potionis maxime dulcia & pinguis cibus & frequentior, & quantus plenissimus potest concoqui. Extenuat corpus aqua calida, si quis in eam descendit, magisq; si salsa est. in ieiunio balneū, inurēs sol, et omnis calor, cura, uigilia, somnus nimium uel breuis, uel longus lectus per astatem terra, hyeme durum cubile. curfus, multa ambulatio, omnisq; uehemens exercitatio, uomitus, deiectio, acida res et austera, & semel die assumpta epula, & uini non perfrigidi, ieiunio potio in consuetudinem adducta. Cum uero inter extenuantia posuerim uomitum, & deiectionem, de his quoq; proprie quadam dicenda sunt. Eiectum esse ab Asclepiade uomitum in eo uolumine, quod de tuenda sanitate composuit, uideo. neq; reprehendo, si offensus eorum est consuetudine, qui cotidie eijcendo uorandi facultatem moluntur. paulo etiam longius processit, idem purgationes quoq; eodem uolumine expulit. & sunt hæc permiciose, si nimis ualentibus medicamentis fiunt. sed hæc tamen subuenienda esse, non est perpetuum. quia corporum, temporumq; ratio potest ea facere necessaria, dū & modo, & non nisi cum opus est, adhibeantur. Ergo ille quocq; se, si quid iam corruptum esset, expelli debere confisus est. Ita non ex toto res condemnanda est. sed esse eius etiam plures causæ possunt. estq; in ea quadam paulo subtilior obseruatio adhibenda. Vomitus utilior est hyeme, quam æstate. Nam tum & pituitæ plus, & capitis grauitas maior subest. inutilis est gracilibus, & imbecillum stomachum halentibus. utilis est plenis & biliosis emulus, si uel nimium se repleuerint: uel parum concoxerunt. nam siue plus est, quàm quod concoqui possit, periclitari ne corruptum



pater, non oportet. Si uero corruptum est, nihil commodius est, quam id, qua uia primum expelli potest, eijcere. Itaq; ubi amari ructus cū dolore, & grauitate præcordiorum sunt, ad hunc protinus confugiendum est. Itē prodest ei, cui pectus æstuat, & frequens salina uel nauſea est: aut cui sonant aures: aut madent oculi: aut os amarum est. Similiterq; ei, qui uel cælum, uel locum mutat: huiusq; quibus, si per plures dies non uomuerunt, dolor præcordia infestat. Neq; ignoro inter hæc præcipi quietem. quæ non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus: nec in omnibus idem facit. Itaq; istud luxuriæ causa fieri non oportere confiteor. interdum ualeitudinis causa recte fieri experimentis credo. Commoneo tamen ne quis, qui ualere et senescere uolet, hoc cotidianum habeat. Qui uomere post cibum uolet, si ex facili facit, aquam tantum tepidam ante debet assumere. si difficilius, aquæ, uel salis, uel mellis paulum adijcere. At qui mane uomiturus est, ante bibere mulsum, uel hyssopum, aut esse radicula debet. deinde aquam tepidam, ut supra scriptum est, bibere. Cætera quæ antiqui medici præceperunt, stomachum omnia infestant. Post uomitum, si stomachus infirmus est, paulum cibi sed huius idonei, gustandum: et aquæ frigidæ cyathi tres bibendi sunt. Si autem uomitus fauces exasperauit, q. uomuit, si mane id fecit, ambulare debet: tum ungi, deinde cœnare. si post cœnam, postero die lauare: & in balneo sudare: hinc proximus cibus, mediocris utilior est: isq; esse debet cum pane hesterno, uino austero meraco, & carne assa, cibisq; omnibus quam siccissimis. Qui uomere bis in mense uult, melius consulet, si biduo continuarit, quam si post quintum decimum diem uomuerit: nisi hæc mora grauitatem pectori faciat. deiectio autem medicamentis quoq; petenda est, ubi uenter suppressus parum reddit. ex eoq; inflammationes, caligines, capitis dolores, aliæq; superioris partis mala incrementum. Quid enim inter hæc adiuuare possunt quies, & inedia quæ per illas maxime eueniunt? Qui eijcere uolet, primum cibis, uinisq; utetur his, quæ hoc præstant. dehinc si parum illa proficiunt, aloem sumat. sed purgationes quoq; ut interdum necessariae sunt, sic ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit. n. non ali corpus: & ob hoc infirmum erit, cum omnibus morbis obnoxia maxime infirmitas sit. Caleſcant autem unctio, aqua salsa, magisq; si acida est. omnia salsa, amara, carnosæ. si post cibum est balneum, uinum austereum. Refrigerat in ieiunio & balneum, & somnus nisi nimis longus est: & omnia acida, aqua q. frigidissima, oleum si aquæ miscetur. Humidum autem corpus efficit labor maior q. ex consuetudine, frequens balneum, cibus plenior, multa potio, post hac ambulatio



Et uigilia. Per se quoque ambulatio multa, et uehemens, et matutina exercitatio, et non protinus cibus adiectus, ea genera escæ quæ ueniunt ex locis frigidis, et pluuijs, et irriguis. Contra siccit modica exercitatio, fames, unctio sine aqua, calor, sol modicus, frigida aqua, cibus exercitationi statim subiectus, et is ipse ex siccis, et æstuosis locis ueniens. Alium astringit labor, sedile, creta figularis corpori illita, cibus imminutus, et is ipse semel die assumptus ab eo, qui bis solet. exigua potio, neque adhibita nisi cum cibi quis quantum assumpturus est, ce pit. post cibum quies. Contra soluit aucta ambulatio, atque escæ post motus, qui post cibum est. subinde potiones cibo immixtæ. Illud quoque scire oportet, quod uentre uomitus solum comprimunt: compressum soluit. Itemque comprimunt is uomitus, qui statim post cibum est: soluit is qui tarde superuenit. Quod ad ætates uero pertinet, in mediam facillime sustinent mediæ ætates: minus iuuenes: minime pueri, et senectute confecti. quod minus fert facile quisque, eo sæpius debet cibum assumere: maximeque eo eget, qui increscit. Calida lauatio et pueris, et senibus apta est. Vinum dilutius pueris, senibus meracius. neutri ætati quæ inflationes mouent. Iuuenum minus quæ assumant, et quomodo currentur, interest. quibus iuuenibus fluxit aluus, plerumque in senectute contrahitur. Quibus in adolescentia fuit astricta, sæpe in senectute soluitur. Melior est autem in iuvene fusior: in sene astrictior. Tempus quoque anni considerare oportet. hyeme plus esse conuenit. minus, sed meracius bibere. multo pane uti. carne potius elixa. modice oleribus. semel die cibum capere: nisi si nimis uenter astrictus est. Si prandet aliquis, utilius est exiguum aliquid, et ipsum siccum sine carne, sine portione sumere. Eo tempore anni calidis omnibus potius utendum est, uel calorem mouentibus. Venus tum non æque perniciofa est. At uere paulum cibo demendum, adiungendumque potioni: sed dilutius tamen bibendum est. magis carne utendum. magis oleribus. transeundum paulatim ad assa ab elixis. Venus eo tempore anni tutissima est. Aestate uero et portione, et cibo corpus sæpius eget. ideo prandere quoque com modum est. Eo tempore aptissima sunt et caro, et olus. potio quamdiu lutissima, ut et sitim tollat: nec corpus incēdat. Frigida lauatio, caro assa, frigidi cibi, uel qui refrigerent. Ut sæpius autem cibo utendum, sic exiguo est. Per autumnum propter coeli uarietatem periculum maximum est. Itaque neque sine ueste, neque sine calciamentis prodire oportet, præcipueque diebus frigidioribus. neque sub diuo nocte dormire: aut certe bene operiri. Cibo uero iam paulo pleniore uti licet. minus, sed meracius bibere. Roma nocere quidam putant, quæ immodice toto die plerumque sic assumuntur, ne quid ex densiore cibo remittatur. Ita non hæc, sed



hæc, sed consumatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamē minus q̄ in his noxæ est. Sed his uti non sæpius quā alio cibo conuenit. Deniq; aliquid densiori cibo, cum id accedit, necessarium est demi. Neq; æstate uero, neq; autumnno utilis uenit: tolerabilior tamen per autumnum: æstate uero & toto (si fieri potest) abstinendum.

De his, qui aliqua parte corporis laborant: et primum de his, quibus caput infirmum est. Caput. iiii.

**P**roximū est ut de his dicā, qui partem aliquam corporis imbecillas habent, cui caput infirmum est: is si bene concoxerit, leniter perficere id mane manibus suis debet. nūquam id, si fieri potest, ueste uelare: aut ad cutem tonderi. Vtileq; lunam uitare, maximeq; ante ipsum lunæ, solūq; concursus. sed nusquam post cibum progredi. Si cui capilli sunt, eos cotidie pectere: multum ambulare sed si licet, neq; sub tecto, neq; in sole. Vbiq; autem uitare solis ardorem, maximeq; post cibum, & uinum. potius ungi, q̄ lauari. nunq̄ ad flammam ungi: interdum ad prunam. Si in balneum uenit: sub ueste primum paulum in tepidario insudare: ibi ungi: tum trāsire in calidarium: ubi sudabit, in solium non descendere: sed multa calida aqua per caput se totū perfundere: tum tepida uti, dein frigida: diutiusq; ea caput, quā cæteras partes perfundere: deinde id aliquādiu perficere: nonissime detergere, & ungere. Capiti nihil æque prodest atq; aqua frigida. Itaq; is, cui hoc infirmum est, per æstatem id bene largo canali cotidie debet aliquandiu subiicere. Semp̄r autem etiam si sine balneo unctus est, neq; totum corpus refrigerare sustinet: caput tamen aqua frigida perfundere. sed cum cæteras partes attingi nolit: demittere id ne ad cervices aqua descendat: eamq; ne quid oculis, alijs uē partibus noceat, defluentem subinde manibus ad os regere. huic modicus abusus necessariū est, quem facile concoquat. isq; si ieiunio caput læditur, assumendus etiam medio die est. si non læditur, semel potius. Bibere huic assidue uinum dilutum, leue, quā aquam magis expedit: ut cum caput ut grauius esse cæperit, sit quod confugiat: eiq; ex toto neq; uinum, neq; aqua semper utilia sunt. medicamentum utrumq; est, cum inuicem assumitur. Scribere, legere, uocē contendere, huic opus non est utiq; post cœnam: post quam ne cogitatio quidem ei satis tuta est: maxime tamen uomitus alienus est.

Aurelij Cor.

6



Eq̄ uero his solis, quos capitis imbecillitas torquet, usus  
 aquæ frigida prodest: sed his etiā, quos assidue lip-  
 pitudines, grauedines, desillationes, tonsillæq̄ male  
 habent. his autem non caput tantum cotidie persun-  
 dendum est: sed os quoq̄ multa frigida aqua foun-  
 dum est. præcipueq̄ omnibus, quibus hoc utile auxilium est: eo uten-  
 dum est, ubi grauius cœlum Austri reddiderunt. cumq̄ omnibus  
 inutilis sit post cibum aut contentio, aut cogitatio animi: tum his præci-  
 pue, qui uel capitis, uel arteriæ dolores habere consuerunt, uel quosli-  
 bet alios oris affectus. Vitari etiā grauedines, desillationesq̄ possunt:  
 si quamminime eum, qui his oportunus est, aerem, uel loca, aquasq̄  
 mutet. si caput in sole protegit, ne incendatur: ne'ue subitum ex repen-  
 tino nubilo frigus id moueat. Si post concoctionem ieiunus caput ra-  
 dit. Si post cibum neq̄ legit, neq̄ scribit.

## Ad solutam aluum remedia. Caput VI.

Vem uero frequenter citata aluus exercet, huic opus  
 est pila, similibusq̄ superiores partes exercere: dum  
 ieiunus est, ambulare: nitare solis nimium ardorem,  
 continua balnea, ungi citra sudorem: non uti cibis ua-  
 rijs, minimeq̄ iurulentis, aut leguminibus, oleribus'ue  
 his, quæ celeriter descendunt: omnia deniq̄ fugere, quæ tarde cōcoquun-  
 tur. Venatio, duriq̄ pisces, & ex domesticis animalibus assa caro ma-  
 xime inuuant. Nunquam uinum salsum bibere expedit: ne tenue qui-  
 dem, aut dulce, sed austerum, & plenius, neq̄ id ipsum peruetus. Si  
 mulso uti uolet, id ex decocto melle faciendum est. Si frigida potiones  
 uentrem eius non turbant, his utendum potissimum est. Si quid offen-  
 se in cœna sensit, uomere debet: idq̄ postero quoq̄ die facere. tertio  
 modici ponderis panem ex uino esse, adiecta uina, uel olea, uel ex  
 defruto, similibusq̄ alijs: deinde ad consuetudinem redire. Semper au-  
 tem post cibum conquiescere: ac neq̄ intendere animum: neq̄ ambu-  
 latione quamuis leui dimoueri.

## Remedia ad coli dolorem. Caput VII.

T si laxius intestinum dolere consuevit, quod nō hoc  
 nominant: cum id nihil nisi genus inflationis sit:  
 id agendū est, ut cōcoquat aliquis, ut lectione et alijs ge-  
 neribus exercetur: utatur balneo calido: cibis quoq̄,  
 & potionibus calidis: deniq̄ omnimodo frigus euitet.  
 item dulcia omnia, leguminaq̄, & quicquid inflare consuevit.



Quæ agenda sint stomacho laborantibus. Caput octauum.

I quis uero stomacho laborat, legere clare debet: post lectionem ambulare, tum pila, uel armis, alio uero quo genere, quo superior pars mouetur, exerceri. Non aquam, sed uinum calidum bibere ieiunus. Tum cibum bis die assumere: sic tamen ut facile concoquat. Vti uino tenui, et austero: et post cibum frigidis potionibus potius. Stomachum autem infirmum indicant pallor, macies, præcordiorum dolor, nausea, et nolentium uomitus. in ieiunio dolor capitis: quæ in quo non sunt, is firmi stomachi est. Neque credendum utique nostris est: qui cum in aduersa ualitudine uinum, aut frigidam aquam concupierunt, deliciarum patrocinium in accusationem non merentis stomachi habent. At qui tarde concoquunt, et quorum ideo præcordia inflantur, quia propter ardorem aliquem noctu sitire consueverunt, antequam conquiescant, duos tres uel cyathos per tenuem fistulam bibant. Prodest et aduersus tardam concoctionem clare legere: deinde ambulare: tum uel ungi, uel lauari assidue: uinum frigidum bibere: et post cibum magnam potionem, sed, ut supra dixi, per syphonem. deinde omnes potionem aqua frigida includere. Cui uero abusus accedit, is ante eum bibere aquam egelidam debet, et uomere. At his, cui ex hoc frequens deiectionis incidit, quotiens aluus ei constiterit, frigida potione potissimum utatur.

Quid obseruandum sit dolore neruorum laborantibus. Caput nonum.

I cui uero dolere nervi solent, quod in podagra, chiragra uel esse consuevit, huic quantum fieri potest, exercendum id est quod affectum est: obijciendumque labori, et frigori, nisi cum dolor increuit. Sub diuino quies optima est. Venus semper inimica est. Concoctio, sicuti in omnibus corporis affectibus, necessaria est. Cruditas enim id maxime lædit: et quotiens offensum corpus est, uiciosa pars maxime sentit. Vt concoctio autem omnibus uitiis occurrat: sic rursus alijs frigus, alijs calor. Quæ sequi quisque pro habitu corporis sui debet. Frigus inimicum est seni, tenui, uulneri, præcordijs, intestinis, uescicæ, auribus, coxis, scapulis, naturalibus, ossibus, dentibus, nervis, uulua, cerebro. Idem summam autem facit pallidam, aridam, duram, nigram. ex hoc horrores, tremoresque nascuntur. At prodest iuuenibus, et omnibus plenius. et etiorque mens est, et melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed attenuetur. Aqua uero frigida infusa præter quam capiti, etiam stomacho



## LIBER

prodest. Item articulis, doloribusq; qui sunt sine ulceribus. item rubi-  
cundis nimis hominibus, si dolore uacant. Calor aut adiuvat omnia,  
quæ frigus infestat. ite lippietes: si nec dolor, nec lachrymæ sunt. Ner-  
uos quoq; q contrahuntur, præcipueq; ea ulcera, quæ ex frigore sunt.  
Idem corporis colorem bonum facit: urinā mouet. si nimius est, corpus  
effoeminat: neruos emollit: stomachum soluit. Minime uero aut frigus,  
aut calor tuta sunt: ubi subita insuetis sunt. Nam frigus lateris dolo-  
res, aliæq; uitia, frigida aqua strumas excitat. Calor cōcoctionem pro-  
hibet: somnum aufert: sudorem digerit: obnoxium morbis pestilenti-  
bus corpus effiat.

## Observatio in pestilentia. caput. x.

St etiā observatio necessaria, quæ quis in pestilentia  
utatur adhuc integer: cum in securus esse non possit.  
Tum igitur oportet peregrinari: nauigare. Vbi id nō  
licet, gestari: ambulare sub diuo ante æstum leniter: eo  
demq; modo ung: Et ut supra cōprehensum est, ui-  
tare fationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem: multoq; ma-  
gis se continere, si qua grauitas in corpore est. Tū neq; mane surgen-  
dum, neq; pedibus nudis ambulandum est. minimeq; post cibum aut  
balneum: neq; ieiuno, neq; coenato uomendum est. neq; mouenda alius:  
atq; etiam si per se mota est, cōprimenda est. Abstnendum potius si  
plenus corpus est. Itemq; uitandum balneum. sudor, meridianus som-  
nus utiq; si cibis quoq; antecessit: qui tamen semel die tunc commodius  
assumitur: insuper etiā modicus, ne cruditatem moueat. Alternis die-  
bus inuicem modo aqua, modo uinum bibendum est. quibus serua-  
tis, ex reliqua uictus cōsuetudine quā minimum mutari debet. Cum  
uero hæc in omni pestilentia facienda sint: tum in ea maxime, quam  
Austri excitauit. Atq; etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt,  
ubi graui tempore anni discesserunt ex suis sedibus: uel ubi in graues  
regiones uenerunt. Ac si cætera res aliqua prohibebit: utiq; abstinere  
debebit. Atq; ita à uino ad aquam, ab hac ad uinum eo, qui supra  
positus est modo, transitus ei esse.



Nstantis autem aduersæ ualitudinis signa complura sunt: in quibus explicandis non dubitabo authoritate antiquorum uirorum uti, maximeq; Hippocratis: cum recentiores quoq; medici, quamuis quædam in curationibus mutarint: tamen hæc illum optime præfagisse fateantur.

Sed antequam dico quibus præcedentibus morborum timor subfit: non alienum uidetur exponere, quæ tempora anni, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora maxime tuta, uel periculis opportuna sint: quod genus aduersæ ualitudinis in quoq; timeri maxime possit. Non quo non omni tempore, in omni tempestatum genere, omnis ætatis, omnis habitus hominum per omnia genera morborum & ægrotent, & moriantur: sed quod frequentius, tamen quædam eueniant. Ideoq; utile est scire unumquemq; quid, & quando maxime timeat.

Quæ anni tempora, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora uel tuta, uel morbis oportuna sunt: & quod ualitudinis genus in quoq; timeri possit. Caput. I.

Citur saluberrimum uer est: proxima deinde ab hoc hyems: periculosior æstas. autumnus longe periculosissimus. Ex tempestatibus uero optimæ æquales sunt, siue frigide, siue calide: pessimæ, quæ uariant maxime. quo fit ut autumnus plurimos opprimat.

Nam ferè meridianis temporibus calor: nocturnis atq; matutinis, simulq; etiam uespertinis frigus est. Corpus ergo & æstate, & subinde meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur. Sed ut eo tempore id maxime fit: sic quandoq; euenit, noxium est. Vbi æqualitas aut est: tamen saluberrimi sunt sereni dies: meliores pluuji, quam tantum nebulosi, aut nubili: optimiq; hyeme, q omni uento uacant: æstate, quibus Fauonij perflant. Si genus aliud uentoru est, salubriores septentrionales, q subsolani, uel austri sunt. sic, tamē ut hæc interdum regionum forte mutantur. Nam ferè uentus ubiq; à mediterraneis regionibus ueniens salubris, à mari grauis est. Neq; solū in bono tempestatum habitu certior ualitudo est: sed priores morbi quoq; si qui inciderunt, leuiores sunt: & promptius finiuntur. Pessimum ergo cœlū est, q ægrum fecit: adeo ut in id quoq; genus, quod natura peius est in

Aurelij Cor.

b iij



## LIBER

hoc statu, salubris mutatio sit. At ætas media tutissima est: quæ neq; iuuentæ calore, neq; senectutis frigore infestatur. Longis morbis se-  
nectus, acutis adolescentia magis patet. Corpus autem habilissimum  
quadratum est, neq; gracile, neq; obesum. Nam longa statura ut in iu-  
uenta decora est: sic matura senectute conficiatur. gracile corpus,  
infirmum, obesum, hebes est. Vere tamen maxime quæcunq; humoris  
motu mutantur, in metu esse consuerunt. ergo tum lippitudines, pustu-  
le, profusio sanguinis, abscessus corporis, quæ ἀποσμήματα græci nomi-  
nant: bilis atra, quam μελαγχολίαν appellant: insania, morbus comi-  
tialis, angina, grauedines, desillationes oriri solent. hi quoq; morbi, q;  
in articulis, nervisq; modo urgent, modo quiescunt: tum maxime &  
inchoantur, & repetunt. At æstas non quidem uacat plerisq; ab his  
morbis: sed adiicit febres, uel continuas, uel ardentes, uel tertianas, uo-  
mitus, alui deiectiones, auricularum dolores, ulcera oris, cancri, et in  
cæteris quidem partibus, sed maxime obscenis: & quicquid sudore  
hominem resoluit. uix quicquam ex his in autumnum non incidit:  
sed oriuntur eo quoq; tempore febres incertæ: lienis dolor, aqua in-  
tercutem, tabes, quam græci φθίσις nominant: urinæ difficultas, quam  
σπασμὸς πρῶτος appellant: tenuioris intestini morbus, quem ἰλεὶον nomi-  
nant. Fit item lenitas intestinorum, quæ λεύκτερος uocatur: coxæ dolo-  
res: morbi comitiales. Idemq; tempus, & diutinis malis fatigatos, &  
ab æstate tantum proxima pressos interimit: & alijs nouis morbis  
conficit: & quosdam longissimis implicat, maximèq; quartanis: quæ  
per hyemem quoq; exerceant. Neq; aliud magis tempus pestilentie  
patet: cuiuscuq; ea generis est, quamuis uarijs rationibus noceat. Hyems  
autem capitis dolores, tussim, & quicquid in faucibus, in lateribus, in  
uisceribus mali contrahitur, irritat. Ex tempestatibus Aquilo tussim  
mouet: fauces exasperat: uentrem astringit: urinam suppressit: hor-  
rores excitat: item dolores lateris, & pectoris. Sanum tamen corpus  
spissat, & mobilius, atq; expeditius reddit. Auster aures hebetat: sen-  
sus tardat: capitis dolores mouet: aluum soluit: totum corpus effiat he-  
bes, humidum, languidum. Cæteri uenti quo uel huic, uel illi propio-  
res sunt: eo magis uicinos his, illis uel affectus faciunt. Deniq; omnis ca-  
lor, & iecur, & lienem inflammat: mentem hebetat: ut anima defi-  
ciat, ut sanguis prorumpat, efficit. Frigus, modo nervorum distentio-  
nem, modo rigorem infert. Illud σπασμὸς, hoc τέντωρ græce nomi-  
natur: nigrificem in ulceribus, horrorem in febris excitat. In sicca-  
tibus acutæ febres, lippitudines, tormina, urinæ difficultas, articulo-  
rum dolores oriuntur. Per imbres longæ febres, alui deiectiones,  
angina, cancri, morbi comitiales, resolutio nervorum, quam τρεπάλυ-



et græci nominant. Neq; solum interest quales dies sint: sed etiam  
 quales ante præcesserint. Si hyems siccæ septentrionales uentos ha-  
 buit, uer autem austros, et pluias exhibet: fere subeunt lippitudi-  
 nes, tormina, febres, maximeq; in mollioribus corporibus: ideoq;  
 præcipue in mulieribus. Si uero Austri, pluiæq; hyemem occupa-  
 runt: uer autem frigidum, et siccum est: grauidæ quidem fœmi-  
 næ, quibus tum adest partus, abortu periclitantur. hæ uero quæ  
 gignunt, imbecillos, uixq; uitaless edunt. cæteros lippitudo arida,  
 et si seniores sunt, grauedines, atq; destillationes male habent. At  
 si à prima hyeme Austri ad ultimum uer continuarunt: laterum do-  
 lores, et insania febricitantium, quam *ῥευμῆτιν* appellant, quam ce-  
 lerrime rapiunt. Vbi primo calor à primo uere orsus, æstatem quoq;  
 similem exhibet, necesse est multum sudorem in febribus subsequi. At  
 si siccæ æstas Aquilones habuit: autumnus uero imbres, Austriq; sunt:  
 tota hyeme, quæ proxima est, tussis, destillatio, raucitas, in quibus-  
 dam etiam tabes oriuntur. Sin autem autumnus quoq; æq; siccus  
 hisdem Aquilonibus perflatur: omnibus quidem mollioribus corpo-  
 ribus, inter quæ muliebria esse proposui: secunda ualetudo contin-  
 git. durioribus uero instare possunt et aridæ lippitudines, et fe-  
 bres partim acutæ, partim longæ, et hi morbi: qui ex atra bile na-  
 scuntur. Quod ad ætates uero pertinet: pueri, proximiq; his, uere op-  
 time ualent: et æstate prima tutissimi sunt. Senes æstate, et autumnus  
 prima parte: iuuenes hyeme: quicq; inter iuuetam, senectutemq; sunt.  
 inimicior senibus hyems: æstas adolescentibus est. Tum si qua imbe-  
 cillitas oritur, proximum est ut infantes, tenerosq; adhuc pueros ser-  
 pentia ulcera oris, quæ *ἀφθᾶς* græci nominant, uomitus, nocturnæ ui-  
 gliæ, aurium humor, circa umbilicum inflammationes exerceant.  
 Propria etiam dentientium, ginguarumq; exulcerationes, distintio-  
 nes neuorum, febriculæ interdum, alui deiectiones, maxillæq; caninis  
 dentibus orientibus male habent. quæ pericula plenissimi cuiq; sunt:  
 et cui maxime uenter astrictus est. At ubi ætas paulum prociessit:  
 glandulæ, et uertebrae, quæ in spina sunt: aliqua inclinationes,  
 strumæ, uerrucarum quædam genera dolentia, (*ἀποχρόδα* græci  
 appellant) et plura alia tubercula oriuntur. Incipiente uero iam  
 pube ex hisdem multæ, et longæ febres: sanguinis ex naribus cur-  
 sus. maximeq; omnis pueritia primum circa quadragesimum diem,  
 deinde septimo mense, tum septimo anno, postea circa pubertatem  
 periclitatur. Si qua etiam genera morborum in infantem incide-  
 runt: ac neq; pubertate, neque primis coitibus, neq; in fœmina pri-



mis menstruis finita sunt: ferè longa sunt. Sæpius tamen morbi pueriles, q̃ diutius manserunt: terminantur. Adolescentia morbis acutis, itē comitialibus, tabiq̃ maxime obiecta est: ferèq̃ iuuenes sunt, qui sanguinem expuunt. Post hanc ætatem laterum, & pulmonis dolores, lethargus, cholera, insania, sanguinis per quædam etiam uelut ora uenarum (αἱμορροΐδας græci appellant) profusio. In senectute spiritus, & urinae difficultas: grauedo articularum, & renum dolores: nervorum resolutiones: malus corporis habitus (καχεξία græci appellant): nocturnæ uigiliae: uitia longiora aurium, oculorum, etiam narum, præcipueq̃ soluta aluius: et quæ sequuntur hæc tormina: uel leuitas intestinorum, ceteraq̃ fusi uentris mala. Præter hæc gradales: tabes, deiectiones, destillationes, item uiscerū, & laterum dolores fatigant. Obesi plerumq̃ acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur: subitoq̃ sæpe moriuntur. quod in corpore tenuiore uix euenit.

## De notis aduersæ ualeitudinis futuræ. Caput. II.

Nte aduersam autem ualeitudinē, ut supra dixi, quædam notæ oriuntur, quarū omnium commune est, aliter se corpus habere, atq̃ consuevit: neq̃ in peius tantum, sed etiam in melius. Ergo si plenior aliquis, & speciosior, & coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet. quæ quia neq̃ in eodem habitu subsistere, neq̃ ultra progredi possunt: ferè retro quasi ruina quadam reuoluntur. Peius tamen signum est ubi aliquis contra consuetudinem emacruit, & colorem, decoremq̃ amisit. quoniam in his quæ superant, est quod morbus demat: in his quæ desunt, non est quod ipsum morbum ferat. Præter hæc protinus timeri debet, si grauiora membra sunt: si crebra ulcera oriuntur: si corpus supra consuetudinem incaluit: si grauior somnus pressit: si tumultuosa somnia fuerunt: si sæpius expergitur aliquis q̃ assuevit: deinde iterū soporatur. si corpus dormientis circa partem aliquam contra consuetudinē insudat: maximeq̃ circa pectus, aut ceruicem, aut crura, uel genua, uel coxas. Itē si marcet animus: si loqui, & moueri piget. si corpus torpet: si dolor præcordiorū est, aut totius pectoris: aut qui in plurimis euenit capitis: si salinae plenum est os: si oculi cum dolore uertuntur: si tempora astricta sunt: si membra inhorrescunt: si spiritus grauior est: si circa frontem intentæ uenæ moventur: si frequentes oscitationes: si genua quasi fatigata sunt: totum uel corpus lassitudinē sentit. Ex quibus sæpe plura, nunq̃ non aliqua fe-



brem antecedunt. In primis tamen illud considerandū est, nunquid  
sepius horum aliquid eueniat: ac ideo neq; corporis ulla difficultas  
subsequatur. Sunt enim quædam proprietates hominum, sine quarū  
notitia non facile quicquam in futurum præagiri potest: Facile itaq;  
securus est in his aliquis, quæ sepe sine piculo euasit. Ille solitari de  
bet, cui hæc noua sunt: aut q̄ ista nunq̄ sine custodia sui, tuta habuit.

Quæ bona in ægrotantibus signa sint. Caput III.

Bi uero febris aliquem occupat: scire licet non peri-  
clitari, si in latus, aut dextrum, aut sinistrum, ut ipsi  
uisum est, cubat: cruribus paulū reductis: qui fere sani  
quoq; iacentis habitus est: si facile conuertitur: si noctu  
dormit: si interdum uigilat: si ex facili spirat: si nō cō  
fluctatur: si circa umbilicum, & pubem cutis plana est: si præcordia  
eius sine ullo sensu doloris æqualiter mollia in utraq; pie sunt. quod  
si paulo humidiora sunt: sed tamen digitis cædunt, & nō dolent: hæc  
ualetudo, ut spacium aliquod habebit: sic tuta erit. Corpus quoq; quod  
æqualiter molle, & calidum est: quodq; æqualiter totum insudat: &  
cuius febricula eo sudore finitur: securitatem pollicetur: quando iam  
ad sanitatem uenit corpus. Sternutamentum etiā inter bona indicia est.  
Et cupiditas cibi uel à primo seruata, uel etiam post fastidium orta.  
neq; terrere debet ea febris, quæ eodem die finita est: ac ne ea quidē,  
quæ quamuis longiore tempore euauit: tamen ante alterā accessio-  
nem ex toto quieuit sic, ut & corpus integrum, quod ei uirgines græci  
uocant, fieret. Si quis autē incidit uomitus, mixtus esse et bile, & pitui-  
ta debet: & in urina subsidere album: leue, æquale sic, ut etiam si  
quæ quasi nubecule immatarint: in imum deferantur. At uenter ei qui  
à periculo tutus est, reddit modo mollia figurata eodē fere tempore,  
quo secunda ualetudine assueuit: modo conuenientia his quæ assumun-  
tur. peior citā alius est. Sed ne hæc quidem terrere protinus debet: si  
matutinis temporibus coacta magis est: aut si procedente tempore pau-  
latim contrahitur, & ruffa est: neq; foeditate odoris similem aluum  
sani hominis excedit. Ac lumbricos quoq; aliquos sub fine morbi de-  
scendisse nihil nocet. Si inflammatio in superioribus partibus dolore,  
tumoremq; fecit, bonum signum est. sonus uentris inde ad inferio-  
res partes euolutus, magisq; etiam si sine difficultate cum stercore  
excessit.



Contra grauis morbi periculum est: ubi supinus æger  
 iacet porrectis manibus, & cruribus. ubi residere  
 c. nult in ipso acuti morbi impetu, præcipueq; pulmo  
 nibus laborantibus. ubi nocturna uigilia premitur:  
 etiam si interdiu somnus accedit. Ex quo tamen peior  
 est, qui inter quartam horam, & noctem: q̄ qui matutino tempore ad  
 quartam. Pessimum tamen est si somnus neq; noctu, neq; interdiu acce  
 dit. id enim ferè sine continuo dolore esse non potest. Acq; uero signū  
 malum est etiam somno ultra debitum urgeri: peiusq; quo magis se  
 sopor interdiu, noctuq; continuat. Mali etiam morbi testimonium est  
 uehementer, & crebro spirare: à sexto die cœpisse inhorrescere: plus  
 expuere: uix excreare: dolore habere continuū: difficulter ferre mor  
 bum: iactare brachia, & crura: sine uoluntate lachrymare: habere  
 humorem glutinosum dentibus inhaerentem: cutē circa umbilicam, et  
 pubem macram: præcordia inflammata, dolentia, dura, tumida, inten  
 ta: magisq; si hæc dextra parte, q̄ sinistra sunt: periculosissimum ta  
 men est: si uenæ quoq; ibi uehementer agitantur. Mali ē morbi signū  
 est, nimis celeriter emacrescere: caput, et pedes, manusq; calidas habe  
 re: uentre, & lateribus frigentibus, aut frigidis extremas partes acu  
 to morbo urgente: aut post sudorem inhorrescere: aut post uomitū sin  
 gultum esse: uel rubere oculos: aut post cupiditatē cibi, post uel longas fe  
 bres hūc fastidire: aut multū sudare, maximeq; frigido sudore: aut ha  
 bere sudores non per totum corpus æquales, quiq; febrem non fini  
 ant: & eas febres, quæ cotidie tempore eodē reuertantur: quæ uel sem  
 per pares accessiones habeant: neq; tertio quoq; die leuentur, quæ uel  
 continuant, ut per accessiones increuant: per discessiones tantum mol  
 liantur: nec unquam integrum corpus dimittant. Pessimum est si ne le  
 uatur quidem febris: sed æque concitata continuat. Periculosum est  
 etiam post arquatū morbū febrem oriri, utiq; si præcordia dextra  
 parte dura manserunt: ac dolentibus his leua. Nulla acuta febris leui  
 ter terrere nos debet. neq; unquam in acuta febre, aut à somno non  
 est terribilis neruorum distentio. timere ēt ex somno, mali morbi est.  
 Itemq; in prima febre protinus mentem esse turbatam: membrum uel  
 aliquod esse resolutum. ex quo casu quamuis uita redditur: tamen id  
 ferè membrum debilitatur. Vomitus etiam periculosus est sinceræ pi  
 tuitæ uel bilis: peiorq; si uiridis, aut niger est. At mala urina est, in  
 qua subsidunt uel rubra, aut liuida, deterior, in qua quasi fila quædā  
 tenuia, atq; alba. pessima ex his, si tanq̄ ex furfuribus factas nubeculæ



las representat. diluta quoq; atq; alba vitiosa ē: sed in phreneticis maxime. Alius aut mala est ex toto suppressa. Periculosa etiā quæ inter febres fluens, conquiescere hominem in cubili non patitur: utiq; si quod descendit est perliquidum, aut albidum, aut pallidum, aut spumans. Præter hæc periculum ostendit id quod excernitur, si est exiguum, glutinosum, leue, album, idemq; subpallidum: uel si est aut liuidum, aut biliosum, aut cruentum, aut peioris odoris, quàm ex consuetudine. Malum est etiam, quod post longas febres sincerum est.

## De signis longæ ualentinis. Caput. V.

Ost hæc inditia notum est longum morbum fieri. sic enim ne esse est: nisi occidit. Neq; ulla alia spes in malis magnis est: q̄ ut impetum morbi trahendo, aliquis effugiat: porrigaturq; in id tempus, quod curationi locum præstet. protinus tñ signa quedam sunt: ex quibus colligere possumus morbum & si non interemerit: longius tñ tempus habiturum. Vbi frigidus sudor inter febres non auras circa caput tantum, & ceruices oritur: aut ubi febre non quiescente corpus insudat: aut ubi corpus modo frigidum, modo calidum est, & color alius ex alio fit: aut ubi quod inter febres aliqua parte abscessit, ad sanitatē nō peruenit: aut ubi æger pro spacio parum emarescat. Itē si urina modo liquida, et pura est: modo habet quedā subsidentia: si leuia, atq; alba, rubraue sunt, quæ in ea subsidunt: aut si quasdā quasī malas representat: aut si bullulas excitat.

## De indicijis mortis. Caput. VI.

Ed inter hæc quidem proposito meū spes tamen superest. Ad ultima uero iam uentum esse, testatur nares acutæ, collapsa tempora, oculi conuulsi, frigida, languidaq; aures, & in his partibus leniter uersæ: cutis circa frontem dura, et intenta: color aut niger, aut per pallidus: multoq; magis si ita hæc sunt: ut neq; uigilia præsserit, neq; uentris resolutio, neq; inedia. Ex quibus causis interdum hæc species oritur: sed uero die finitur. Itaq; diutius durans, mortis index est. Si uero in morbo uetere iam triduo talis est: in propinquo mors est: magisq; si præter hæc oculi quoq; lumen refrugunt et illachrymant: quæq; in his alba esse debent, rubescunt: atq; in hisdem uenulæ pallēt: pituitaq; in his innatās nouissimo angulis inhaerescāt: alterq; ex his miior est: nigr; aut uehementer subsederunt: aut facti tumidiore sunt:



perq; somnum palpebræ non cōmittuntur: sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet: neq; id fluens alius expressit: eademq; palpebræ pallent: & idem pallor labra, et nares decolorat. eademq; labra, & nares, oculiq; et palpebræ, et supercilia, aliqua'ne ex his peruertuntur: isq; propter imbecillitatem iam non audit: aut non uidet eadem: mors denuntiatur. Vbi ægri supini cubant: hisq; genua contrahuntur: ubi deorsum ad pedes subinde delabitur: ubi brachia, & crura nudat, & inæquabiliter dispergit: neq; his calor subest: ubi hiat: ubi assidue dormit: ubi his qui mentis suæ non est: neq; id facere sanus solet: dentibus stridet: ubi ulcus quod aut ante, aut in ipso morbo natum est: aridum, & aut pallidum, aut liuidum factum est. Illa quoq; mortis indicia sunt: unguis, digitq; pallidi: frigidus spiritus: aut si manibus quis in febre, & acuto morbo uel insania; pulmo nis'ue dolore, uel capitis, in ueste floccos legit: fimbrias'ue diducit: uel in adiuncto pariete si qua minuta eminent: carpit. Dolores etiam circa coxas, et inferiores partes orti, si ad uiscera transierunt: subitoq; desierunt: mortē subesse testantur: magisq; si alia quoq; signa accesserunt. Neq; is seruari potest, qui sine ullo timore febricitans, subito stragulat: aut deuorare salinam suam non potest. Cui'ue in eodem febris, corporisq; habitu ceruix conuertitur: sic ut deuorare æque nihil possit: aut cui simul & continua febris, & ultima corporis infirmitas est: aut cui febre non quiescente exterior pars friget: interior sic calet: ut etiam sitim faciat: aut qui febre æquæ non quiescente: simul & delirio, & spirandi difficultate uexatur: aut qui epoto ueratro exceptus distentione nervorum est: aut qui ebrius obmutuit: is enim febre, adiecta nervorum distentione consumitur: nisi aut febris accessit, aut eo tempore, quo ebrietas solui debet, loqui cepit. Mulier quoq; grauida acuto morbo facile cōsumitur: & is, cui somnus dolorem augeat: & cui protinus in recenti morbo bilis atra, uel infra, uel supra se ostendit: cui'ue alterutrum modo se prompsit: cum iam longo morbo corpus eius esset extenuatum, et affectum. sputum et biliosum, & purulentum, siue separatim ista, siue mixta proueniunt: interitus periculū ostendunt. Ac si circa septimum diē tale esse coepit: proximū est ut is circa quartumdecimum diem deccdat: nisi alia signa meliora, peiora'ue accesserint. quæ quo leuiora, grauiora'ue subsequuta sunt: eo uel seriores mortem, uel maturiores denunciant. Sudor quoq; frigidus in acuta febre pestiferus est. atq; in omni morbo uomitus: qui uariis, & multorum colorum est: præcipueq; si malus in hoc odor est. Ac sanguinē quoq; in febre uomuisse pestiferum est. Urina uero rubra, & tenuis in magna cruditate esse cōsuevit: & sæpe antequam spacio



matureſcat, hominem rapit. Itaq; ſi talis diutius permanet, periculū  
mortis oſtendit. Peſſima tamen eſt, præpueq; mortifera, nigra, craſſa,  
mali odoris: atq; in uiris quidem, & mulieribus talis deterrima eſt.  
In pueris uero, quæ tenuis, & diluta eſt. Alius quoq; uaria peſtifera  
eſt: quæ ſtrigmentū, ſanguinem, bilem uiridem, aliquid modo diuerſis  
temporibus, modo ſimul: & in mixtura quadam diſcreta tamen re=  
preſentat. ſed hæc quidem poteſt paulo diutius trahere. In præcipiti  
uero iam eſſe denunciat quæ liquida: eademq; uel nigra, uel pallida,  
uel pinguis eſt: utiq; ſi magna foeditas odoris acceſſit. Illud interroga=  
ri me poſſe ab aliquo ſcio, ſi certa futuræ mortis indicia ſunt: quomo=  
do interdum deſerti à medicis conualeſcant: quosdamq; fama prodi=  
derit in ipsis funeribus reuixiſſe. Quinetiam uir iure magni nomi=  
nis Democritus, ne finitæ quidē uitæ ſatis certas notas eſſe propoſuit,  
quibus medici credidiſſent: adeo illud non reliquit, ut certa aliqua ſi=  
gna futuræ mortis eſſent: aduerſus quos, ne dicam illud quidem, quod  
in uicino ſæpe quedam notæ poſitæ non bonos, ſed imperitos medi=  
cos decipiunt: quod Aſclepiades funeri obuius intellexit eum uiuere,  
qui efferebatur: ne protinus crimen artis eſſet, ſi quod profeſſoris ſui:  
illa tamen moderatius ſubiiciam. Coniecturalē artem eſſe medicinam,  
rationemq; coniecturæ talem eſſe: ut cum ſæpius aliquando reſponde=  
rit, interdum tñ fallat nos. Si quid itaq; uix in milleſimo corpore ali=  
quādo decipit: id notā nō habet, cum per innumerabiles homines re=  
ſpondeat. Idq; non in his tantum, quæ peſtifera ſunt, dico: ſed in his  
quoq; quæ ſalutaria. Si quidem etiam ſpes interdum fruſtratur: &  
moritur aliquis, de quo medicus ſecurus primo fuit. Quæq; medendi  
cauſa reperta ſunt, non nunquam in peius aliquid conuertunt. Neq;  
id euitare humana imbecillitas in tanta uarietate corporum poteſt.  
ſed eſt tamen medicinæ fides, quæ multo ſæpius, perq; multo plures  
ægros prodeſt. Neq; tamen ignorare oportet in acutis morbis fallaces  
magis notas eſſe & ſalutis, & mortis.

De notis, quas aliquis in ſingulis morborum generibus habere poſſit.  
Caput ſextum.

Ed cum propoſuerim ſigna quæ in omniā aduerſa ua=  
litudine cōia eſſe conſuerunt: ea quoq; trāſibo, ut quas  
aliquis in ſingulis morborū generibus habere poſſit  
notas, indicē. Quædā aut ſunt, quæ añ febres, quæ=  
dam, quæ inter eas quid aut intus ſit, aut uenturum  
ſit, oſtendunt. Ante febres, ſi caput graue eſt: aut ex ſomno oculi cali=  
ſcit, oſtendunt.

*Pericula ipſorum  
indicia*



gant: aut frequentia sternutamenta sunt: circa caput aliquis pituitæ im-  
petus timeri potest. Si sanguis, aut calor abundat: proximum est, ut ali-  
qua parte profusum sanguinis fiat. Si sine causa quis emacrescit:  
ne in malum habitum corpus eius recadat, metus est. Si præcordia do-  
lent: aut inflammatio grauis est: aut non toto die concocta fertur urina:  
cruditas esse manifestum est. Quibus diu color sine morbo regio ma-  
lus est: hi uel capitis doloribus cōsistantur: uel terrâ edunt. Qui diu  
habent faciem pallidam, & tumidam: aut capite, aut uisceribus, aut  
alio laborant. Si in cōtinua febre puero ueter nihil reddit, mutatur q̃;  
ei color: nec somnus accedit: ploratq; is assidue: metuenda neruorū di-  
stentio est. Frequens aut destillatio in corpore tenui, longoq; tabem ti-  
mendam esse testatur. Vbi pluribus diebus non descendit aluus, docet  
aut subitam deiectionē, aut febriculam instare. Vbi pedes turgent, lon-  
gæ deiectiones sunt. Vbi dolor in imo uentre et icoxis est, aqua inter-  
cutis instat. sed hoc morbi genus ab ilibus oriri solet. Idem proposui  
periculum est his, quibus uoluntas desidendi est: uenter nihil reddit,  
nisi & egre, & durū: tumor in pedibus est. idemq; modo dextra,  
modo sinistra parte uentris inuicē oritur, atq; finitur. sed à iecinore  
id malum proficiat uidetur. eiusdem morbi nota est. Vbi circa um-  
bilicum intestina torquentur (σπόροι græci nominant) oxæq; dolores  
manent: eaq; neq; tempore, neq; remedijs soluantur. Dolor aut arti-  
culorum, pro ut in pedibus, manibus ue, aut alia qualibet parte sic  
est, ut eo loco nerui contrahantur: aut si id membrum ex leui causa  
fatigatum, æq; frigidum, calidoq; offenditur: podagrâ, chiramam ue, uel  
eius articuli, in quo id sentitur, morbi futurum esse denuntiat. Qui-  
bus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desit: hi uel ca-  
pitis doloribus cōsistantur necesse est: uel in articulis aliquas exulce-  
rationes graues habeant: uel aliquo morbo etiam debilitentur. Qui-  
bus sceminis menstrua non proueniunt, necesse est capitis acerbissimi  
dolores sint: uel quælibet alia pars morbo infestetur. Eademq; his  
pericula sunt, quibus articulorum uitia dolores, tumoresq; sine poda-  
gra, similibusq; morbis oriuntur, & desinant. Vtiq; si sæpe tempora  
hisdem dolent: noctuq; corpora insudant: si frons prurit, lippitudi-  
nis metus est. Si mulier à partu uehementes dolores habet: neq; alia  
præter ea signa mala sunt: circa uigintiimum diem aut sanguis per na-  
res erumpet, aut in inferioribus partibus aliquid abscedet. Quicūq;  
etiam dolorem ingentem circa tempora, & frontem habebit: is alte-  
rutra ratione eum finiet, magisq; si iuuenis erit, per sanguinis pro-  
fusionem: si senior, per suppurationem. Febris aut quæ subito sine ra-  
tione sine bonis signis finita est, ferè reuertitur. Cui fauces sanguine, et



interdum, & noctu replentur sic, ut neq; capitis dolores, neq; præcordiorum, neq; tussis, neq; uomitus, neq; febricula præesserit: huius aut in naribus, aut in faucibus ulcus reperietur. Si mulieri ex inguine febricula orta est: neq; causa apparet, ulcus in vulua est. Vrina autem crassa, ex qua quod desidet, album est: significat circa articulos, aut circa viscera dolorem, metumq; morbi esse. Eadem viridis, aut viscerum dolorem, tumoremq; cum aliquo periculo subesse: aut certe corpus integrum non esse testatur. At si sanguis, aut pus in urina est: vel uescit, vel renes exulcerati sunt. Si hæc crassa atrum, ulas quasdam exiguis quasi capillos habet: aut si bullat, aut si male olet: & interdum quasi harenam, interdum quasi sanguinem trahit: dolent autem coxæ: quæq; inter has, superq; pubem sunt: & accedunt frequentes ructus: interdum uomitus biliosus, extremæq; partes frigescent: urine crebra cupiditas, sed magna difficultas est: & quod inde excretum est, aquæ simile vel rufum, vel pallidum est: paulum tamen in eo leuamenti est: alius uero cum multo spiritu redditur: utiq; in renibus uitium est. Aut si paulatim desillat: vel si sanguis per hanc editur, & in eo quedam cruenta concretæ sunt, idq; ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent, in eadem uescit uitium est. Calculosi uero his indicij cognoscuntur. Difficiliter urina redditur: paulatimq; interdum etiam sine uoluntate desillat. Eadem harenosa est: nonnunq; aut sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excremitur. Eamq; quidam promptius recti, quidam resupinati: maximeq; hi qui grandes calculos habent: quidam etiam inclinati reddunt: colemq; extendendo, dolorem lenant. Gravitatis quoq; cuiusdam in ea parte sensus est: atq; ea cursu, omniq; motu augentur. Quidam etiam cum torquentur, pedes inter se subinde mutatis uicibus implicant. Fœminæ uero oras naturalium suorum manibus admotis scalpere crebro coguntur. Nonnunquam si digitum admonerunt, ubi uesciæ ceruicem is urget, calculum sentiunt. At qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone uicium est. Mulieri grauidæ sine modo fusa alius elidere partum potest. Eidem si lac ex mamis profluit, imbecillum est, quod intus gerit. duræ mame sanum illud esse testantur. Frequens singultus, & præter consuetudinem continuus iecur inflammatum esse significat. Si tumores super ulcera subito esse desierunt, idq; à tergo incidit: uel distentio nervorum, uel rigor timeri potest. At si à priore parte id euenit: uel lateris acutus dolor, uel insania expectanda est. Interdum etiam huiusmodi casum, quæ tutissima inter hæc est, profusio alui sequitur. Si ora uenarum sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt: aut aqua



## LIBER

intercutis aut tabes sequitur: eadem tabes subit, si in lateris dolore orta suppuratio, intra quadraginta dies purgari nō potuit. At si longa tristitia cum longo timore, & uigilia est: atræ bilis morbus subest. Quibus sæpe ex naribus fluit sanguis, his aut lienis tumet: aut capitis dolores sunt: quos sequitur, ut quædam ante oculos tanquam imagines obuersentur. At quibus magni lienes sunt, his gingivæ malæ sunt: et os olet: aut sanguis aliqua parte prorumpit. quorum si nihil euenit, necesse est in cruribus mala ulcera, & ex his nigræ cicatrices fiant. Quibus causa doloris neq; sensus eius est, his mens labat. Si in uentrē sanguis confluit: ibi in pus uertitur. Si a coxis, et ab inferioribus partibus dolor in pectus transit: neq; ullum signum malum accessit: suppuratōis eo loco periculum est. Quibus sine febre aliqua ex parte dolor, aut prurigo cū rubore, aut calore est: ibi aliquid suppurat. Vrina quoq; quæ in homine sano parum liquida est, circa aures futuram aliquam suppuratōem esse denunciat. Hæc uero cum sine febre quoq; uel latentium, uel futurarum rerū notis habeant, multo certiora sunt, ubi febris accessit: atq; etiam aliorū morborum tum signa nascuntur. Ergo protinus insania timenda est: ubi expeditior alicuius, q̃ sani fuit sermo est: subitaq; loquacitas orta est: & hæc ipsa solito audacior. aut ubi raro quis, & uehementer spirat: uenasq; concitatas habet, præcordiis duris, & tumentibus. Oculorū quoq; frequens motus, & in capitis dolore offusæ oculis tenebræ: uel nullo dolore substante somnus ereptus, continuatq; nocte, & die uigilia: uel prostratum contra consuetudinem corpus in uentrem sic, ut ipsius alui dolor id non coegerit. Item robusto adhuc corpore insolitus dentium stridor, insaniæ signa sunt. Siquid etiam abscessit: & anteq̃ suppuraret, manente adhuc corpore insolita febre subsedit, periculū affert primum furoris, deinde interitus: auris quoq; dolor acutus cū febre continua, uehementiq; sæpe mentem turbat: & ex eo casu iuniores interdum intra septimum diē moriuntur: seniores tardius. quoniam neq; æque magnas febres experiuntur: neq; æque insaniunt. ita sustinent, dum his affectus intus uersatur. Suffusæ quoq; sanguine mulieris mammæ, furorem uenturum esse testantur. Quibus autē longæ febres sunt: his aut abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt. Quorum faucibus in febre eliditur spiritus, instat his neruorū distentio si angina subito finita est, in pulmonem id malum transit: idq; sæpe intra septimum diem occidit: quod nisi inadat, sequitur, ut aliqua parte suppuret. Deinde post alui longam resolutionē, tormina. Post hæc intestinorum lenitas oritur. Post nimias desillationes, tabes. post lateris dolores, uitia pulmonum. post hæc, insania. Post magnos feruores corporis, neruorum rigor, aut diſtentio. v li



distentio. ubi caput vulneratum est, delirium. ubi uigilia torsit, nervorum distentio. ubi uehementer uenæ super ulcera moventur: sanguinis profluvium erit. suppuratio uero pluribus morbis excitatur. Nā si longæ febres sine dolore, sine manifesta causa remanent: in aliquā partem id malum incumbit, in iunioribus tamen: nam in senioribus ex eiusmodi morbo quartana ferè nascitur. Eadem suppuratio fit, si præcordia dura dolentia ante uigesimum diem hominē non sustulerunt: neq; sanguis ex naribus fluxit, maximeq; in adolescentibus. utiq; si inter principia aut oculorū caligo, aut capitis dolores fuerunt: sed cum inferioribus partibus aliquid abscessit. aut si præcordia tumorem mollem habent: neq; habere intra sexaginta dies desinunt: hæretq; per omne id tempus febris. Sed tum in superioribus partibus fit abscessus: ac si inter ipsa ulcera nō fuit: circa aures erumpit. Cumq; omnis longus tumor ad suppurationem ferè spectet: magis se tendit is, qui in præcordiis, q̄ is qui est in uentre: & is qui supra umbilicū, q̄ is qui infra est. si lassitudinis etiam sensus in febre est: uel in maxillis, uel in articulis aliquid abscedit. Interdum quoq; urina tenuis, et cruda sic diu fertur: ut alia salutaria signa sint. Ex quo eo casu plerumq; infra transversum septum, quod διαφραγμα græci uocant, fit abscessus. Dolor autem pulmonis si neq; per sputa, neq; per cucurbitulas, neq; per sanguinis detractionem, neq; per uictus rationem finitus est, uomica aliquas intus excitat aut circa uigesimum diem, aut circa xxx: nonnunq; etiam circa sexagesimum. numerabimus autem ab eo die, quo primū febricitauit aliquis, aut inhorruit, aut grauitatem eius partis sensit. sed hæ uomicae modo à pulmone, modo à contraria parte nascuntur. Quod suppurat ab ea parte, quam afficit: dolorem, inflātionemq; conatit, ipsum calidius est: et si in partem sanam aliquis decubuit: onerare eam ex pondere aliquo uidetur. Omnis etiā suppuratio quæ nondum oculis patet, sic deprehendi potest. si febris nō dimittit: eaq; interdū leuior est: noctu increscit: multus sudor oritur: cupiditas tussēdi est: et penè nihil in tussi excreatur: oculi cæui sunt: malæ rubent: uenæ sub lingua inalbescunt: in manibus fiunt adunci ungues, digiti, maximeq; summi pallēt: in pedibus tumores sunt: spiritus difficiliter trahitur: cibi fastidium est: pustulæ toto corpore oriuntur. Quod si protinus initio dolor & tussis fuit, & spiritus difficultas: uomica uel ante, uel circa uigesimum diem erumpet. si serius ista cœperint: necesse est quidem increscant. sed quo minus cito affecterint: eo tardius solentur. Solent etiam in graui morbo pedes cum digitis, unguibusq; nigrescere. quod si non est mors consecuta, & reliquum corpus inualuit: pedes tamen decidunt.

Aurelij Cor.

c



Quæ notæ in quolibet morbi genere, uel spem, uel pericula ostendant.  
Caput. VII.

Equitur ut in quolibet morbi genere proprias notas explicem: quæ uel spem, uel periculum ostendant. Ex uiscera do-  
lente si purulenta urina processit: inquit ea leue, et album  
sub sedulo metu detrahit. In pulmonis morbo si sputo ipse  
leuatur dolor: quantum id purulentum est: tamen æger facile spirat: fa-  
cile excreat: morbum ipsum non difficulter ferit: potest ei secunda ua-  
letudo contingere. Neque inter initia terreri conuenit: si protinus sputum  
mixtum est ruffo quodam, et sanguine, dummodo statim edatur. La-  
terum dolores suppuratione facta, deinde intra quadragesimum diem  
purgata finiuntur. Si in icterore uomica est, et ex ea fertur pus pu-  
rum, et album: salus ei facilis. Id enim malum in tunica est. Ex sup-  
purationibus uero hæ tolerabiles sunt: quæ in exteriorem partem fe-  
runtur, et acuiuntur. Et ex his quæ intus procedunt, hæ leuiiores: quæ  
contra se cutem non afficiunt: eamque et sine dolore esse, et eiusdem  
coloris, cuius reliquæ partes sunt, sinunt esse. Pus quoque quacunque par-  
te erumpit: si est leue, album, et unius coloris, sine ullo metu est: et  
quo effuso febris protinus conquieuit: desieruntque urgere cibi fastidium,  
et potionis desiderium. si quando etiam suppuratio descendit in cru-  
ra: sputumque eiusdem factum pro ruffo purulentum est: periculi mi-  
nus est. At in tabe eius, qui saluus futurus est: sputum esse debet album,  
æquale totum: eiusdemque coloris sine pituita: eique etiam simile esse opor-  
tet si quid in nares à capite destillat. Longe optimum est febrem omni-  
no non esse. secundum est tantulum esse: ut neque cibum impediat, neque  
crebram sitim faciat. Alius in hac ualetudine ea tuta est: quæ cotidie  
coacta: eaque conuenientia his quæ assumuntur, reddit. Corpus, id quod  
minime tenue, maximeque lati pectoris, atque setosi est: cuiusque cartilago  
exigua, et carnosæ est. Super tabem si mulieri quoque suppressa men-  
strua fuerunt: et circa pectus, atque scapulas dolor mansit: subitoque san-  
guis erupit: leuari morbus solet. Nam et tussis minuitur: et sitis atque fe-  
bricula desinunt. Sed ipsæ ferè nisi redit sanguis, uomica erumpit: quæ  
quo cruentior, eo melior est. A qua autem inter cutem minime terribi-  
lis est: quæ nullo antecedente morbo caput. deinde quæ longo morbo  
superuenit. Utique si firma uiscera sunt: si spiritus facilis: si nullus do-  
lor: si sine calore corpus est: equaliterque in extremis partibus macrum  
est: si uenter mollis: si nulla tussis: nulla sitis: si lingua ne per som-  
num quidem inarescit: si cibi cupiditas est: si uenter medicamentis mo-  
uetur: si per se excernit mollia, et figurata: si extenuatur: si urina et



uini mutatione, & epotis aliquibus medicamentis mutatur: si corpus sine lassitudine est, & morbum facile sustinet. siquidē in quo omnia hæc sunt: is ex toto tutus ē: in quo plura ex his sunt, is in bona spe est. Articulorum uero uitia ut podagra, chiragraeq; si iuuenes tentant: neq; callum induxerunt: solui possunt: maximeq; torminibus leniuntur: & ex quocunq; modo uenter fluit. Item morbus comitialis ante pubertatem ortus non ægre finitur: & in quo ab una parte corporis uenientis accessionis sensus incipit. optimum est à manibus, pedibusue initium fieri: deinde à lateribus: pessimum inter hæc à capite. Atq; in his quoq; ea maxime profunt: quæ per deiectiones excernuntur. Ipsa autem deiectio sine ulla noxa est: quæ sine febre est: si celeriter desinit: si contracto uentre nullus motus eius sentitur: si extremam aluum spiritus sequitur. Acræ tormina quidem periculosa non sunt: si sanguis, & strigmenta descendunt: dum febris, cæteraq; accessiones huius morbi absint: adeo ut etiam grauida mulier non solum reservari possit: sed etiam partum reservare. Prodestq; in hoc morbo si iam ætate aliquis processit. Contra intestinorū leuitas facilius à teneris ætatibus depellitur: utiq; si fieri urina, et alio corpus incipit. Eadem ætas prodest, & in coxæ dolore, & humerorum, et in omni resolutione nervorum. ex quibus coxa si sine torpore est: si leniter friget: quantum magnos dolores habet: tamen & facile, & mature sanatur: resolutumq; membrū si nihilominus aliter fieri sanum potest: oris resolutio, etiam alio citā finitur: omnisq; deiectio lippienti prodest. At narix ortus, uel per ora uenarū subita profusio sanguinis, uel tormina insaniam tollunt. Humerorum dolores, qui ad scapulas uel manus tendunt: uomitus atræ bilis soluantur. et quisquis dolor deorsum tendit: sanabilius est. singultus sternutamento finitur. Longas deiectiones supprimit uomitus. Mulier sanguinē uomens, profusis mēstruis liberatur. Quæ mēstruis nō purgatur, si sanguinē, ex naribus fudit: omni periculo uacat. Quæ locis laborat: aut difficulter partū edū: sternutamento leuatur. Aestua quartana fere breuis est. cui calor, & tremor est: saluti deliriū est. Lienosis bono tormina sunt. deniq; ipsa febris, quod maxime mirū uideri potest: sæpe præsidio est. nā & præcordiorum dolores si sine inflammatione sunt, finit: & in iecinoris dolore succurrit: & nervorū distentionem, rigoremq; si postea cæpit: ex toto tollit: & ex difficultate urinae morbu tenuioris intestini ortum, si urinam per calorem mouet: leuat. At dolores capitis quibus oculorū caligo, et rubor cum quadā frontis prurigine accedunt: sanguinis profusione, uel fortuita uel et petita summonentur. Si capitis, ac frontis dolores ex uento, uel frigore, aut aestu sunt: grauedine, et sternutamentis finiuntur.



## LIBER

Febrem autem ardentem, quam græci *ναύρωα* uocant: subitus horror  
 exoluit. Si in febre aures obtusæ sunt: si sanguis e naribus fluxit: aut  
 uenter resolutus est: illud malum desinit ex toto. Nihil plus aduersus  
 surditatem, quàm biliosa aluus potest. Quibus in fistula urinae uti ma-  
 nuti apices, quos *ὀύρα* græci uocant: esse cœperūt: ijs ubi pus ea pte  
 profluxit, sanitas redditur. ex qbus cum pleraq; per se proueniant:  
 scire licet interea quoq; quæ ars adhibet: naturā plurimū posse. Con-  
 tra si caput febre continenti dolet: neq; quicquam reddit: malum atq;  
 mortiferum est: maximeq; id periculum est pueris à septimo anno ad  
 quartum decimum. In pulmonis morbo si sputum primis diebus non  
 fuit: deinde à septimo die cœpit, & ultra septimum mansit: pericu-  
 losum est. Quantoq; magis mixtos, neq; inter se diductos colores ha-  
 bet: tanto deterius. et tamen nihil peius est, quàm sincerum id edi: siue  
 ruffum est, siue cruentum: siue album, siue glutinosum: siue palli-  
 dum, siue spumans. nigrum tamen pessimum est. In eodem morbo peri-  
 culosa sunt tussis, destillatio, etiam quod aliàs salutare habetur, sternus  
 tamētum. Periculosissimūq; est si hæc secuta subita deiectio est. Ferè  
 uero quæ in pulmonis, eadem in lateris doloribus, & mitiora signa,  
 & asperiora esse consuerunt. Ex iecinore si pus cruentum exit: mor-  
 tiferum est. At ex suppurationibus hæc pessimæ sunt: quæ intus ten-  
 dunt sic, ut exteriorem quoq; cutem decolorent. Ex his deinde, quæ  
 in exteriorem partem prorumpūt, quæ maximæ: quæq; planissimæ  
 sunt. Quod si ne rupta quidem uomica uel pure extrinsecus emissio  
 febris quieuit: aut quamuis quierit: tamen repetit. item si sitis est: si  
 cibi fastidium, si uenter liquidus, si pus est lividum, & pallidum, si  
 nihil æger excreat, nisi pituitam spumantem: periculum certum est.  
 Atq; ex his quidem suppurationibus, quas pulmonum morbi concita-  
 runt: ferè senes moriuntur: ex cæteris iuniores. At in tabe sputum  
 mixtum, purulentum, febris assidua, quæ & cibi tempora eripit: &  
 siti affligit in corpore tenui: periculum subesse testatur. Si quis etiam  
 in eo morbo diutius traxit: ubi capilli flunt: ubi urina quædam ara-  
 neis similia subsidentia ostendit: atq; in his odor fædus est: maximeq;  
 ubi post hæc orta deiectio est: protinus moritur. Vtiq; si tempus au-  
 tumni est: quo ferè qui cætera parte anni traxerunt: resoluuntur. Itē  
 pus expuisse in hoc morbo, deinde ex toto spueri desisse, mortiferum  
 est. Solent etiam in adolescentibus ex eo morbo uomica, fistulæq; ori-  
 ri: quæ non facile sanescunt: nisi si multa signa bonæ ualeitudinis sub  
 secuta sunt. Ex reliquis uero minime facile sanantur uirgines, aut hæ  
 mulieres: quibus super tabem menstrua suppressa sunt. Cui uero sano  
 subitus dolor capitis ortus est: deim somnus oppressit, sic ut stertat:

neq;



neq; expergisatur, intra septimum diem pereundū est: magis si cum alius cita non antecesserit. Si palpebræ dormientis non cœunt: si albū oculorum apparet. quos tamen ita mors sequitur: si id malum non est febre discussum. At aqua inter cūtem, si ex acuto morbo cœpit: ad sanitatem raro perducitur. utiq; si contraria his, quæ supra posita sunt: subsequuntur. æque in ea quoq; tussis spem tollit. Item si sanguis sursum, deorsumq; erupit: & aqua medium corpus impleuit. Quibusdam etiā in hoc morbo tumores oriūtur: deinde desinunt: deinde rursus assurgunt. Hi quidem tutiores sunt: quā qui supra compressi sunt, si attenduntur. sed ferè fiducia secundæ valetudinis opprimuntur. Illud iure aliquis mirabitur: quomodo quædam simul & affligunt nostra corpora, & parte aliqua tueantur. Nam siue aqua inter cūtem quem impleuit: siue in magno abscessu multum puris coit: simul id omne effundisse æque mortiferum est: ac si quis sani corporis vulnere factus exanguis est. Articuli uero, qui sic dolent, ut super eos ex callo quædam tubercula innata sint: nunquam liberantur. quæq; eorum uicia uel in senectute cæperunt: uel in senectutem ab adolescentia peruenierunt, ut aliquando leniri possunt: sic nunquam ex toto finiuntur. Morbus quoq; comitialis post annum quintum & uigessimū ortus ægre curatur: multoq; ægrius is, qui post quadragesimum annum cœpit, adeo ut in ea ætate aliquid in natura spei, uix quicquam in medicina sit. In eodem morbo si simul totum corpus afficitur: neq; ante in partibus aliquis uenientis mali sensus est: sed homo ex improviso concidit: cuiuscunq; is ætatis est: uix sanescit. Si uero aut mens læsa est: aut nervorū facta resolutio: medicinæ locus non est. Deiectionibus quoq; si febris accessit: si inflammatio iocinoris, aut præcordiorum, aut uentris: si inmodica sitis, si longius tempus, si alius uaria, si cum dolore est: etiam mortis periculum subest. maximeq; si inter hæc tormina uetera esse cæperunt. Isq; morbus maxime pueros absumit usq; ad annum decimum. cæteræ ætates facilius sustinent. Mulier quoq; grauida eiusmodi casu rapi potest, atq; etiam si ipsa conuuluit, partum tamen perdit. Quin etiā tormina ab atra bile orsa, mortiferæ sunt: aut si sub his extenuato iam corpore subito nigra alius profluxit: aut intestinorum leuitas. Periculosior est si frequens deiectio est: si uenter omnibus horis, & cum somno, & sine hoc profluit: si similiter noctu, & interdium: si quod excernitur aut crudum est, aut nigrum: & præter id etiam leue, & mali odoris sit: si sitis urget: si post potionem urina non redditur: quod euenit quia tunc liquor omnis non in uesciam, sed in intestina descendit: si os exulceratur: si rubet facies, & quasi maculis quibusdam colorum omnium distin-

Aurelij Cor.

c iij



gnitur: si uenter est quasi fermentatus, pinguis, atq; rugosus: si & ibi cupiditas non est. Inter quæ cum euidentis mors sit, multo euidentior est: si iam longum quoq; id uitium est: maximeq; si etiã in corpore senili est. si uero in tenuiore intestino morbus est: uomitus, singultus, nervorum distentio, delirium: mala sunt. At in morbo arquato durũ fieri iecur perniciosissimum est. Quos lienis male habet, si tormina prehenderunt: deinde uersa sunt: uel in aquam inter cutem, uel intestinorum leuitatem uix ulla medicina periculo subtrahit. Morbus intestini tenuioris, nisi resolutus est intra septimum diem, occidit. Mulier ex partu si cum febre uehementibus etiam, & assiduus capitis doloribus premitur: in periculo mortis est. si dolor, atq; inflammatio est in his partibus, quibus uiscera continentur: frequenter spirare signum malum est. si sine causa longus dolor capitis est: & in cernices, ac scapulas transit: rursusq; in caput reuertitur: aut à capite ad cernices, scapulasq; peruenit: perniciosus est: nisi uomitam aliquam excitauit sic, ut pus extussiretur: aut nisi sanguis ex aliqua parte prorupit: aut nisi in capite multa prurigo, toto ue corpore pustulæ ortæ sunt. Aequè magnum malum est, ubi torpor, atq; prurigo peruagantur modo per totum caput, modo in parte: aut sensus alicuius ibi quasi frigoris est: eaq; ad summam quoq; linguam perueniunt. Et cum in hisdem abscessibus auxilium sit: eo difficilior sanitas est: quo minus sæpe sub his malis illi subsequuntur. In coxæ uero doloribus si uehemens torpor est: frigescatq; crus, & coxa: aliusq; nisi coacta non reddat: idq; quod excernitur, mucosum est: iamq; ætas eius hominis quadragesimum annum excessit: is morbus erit longissimus, minimeq; annuus: neq; finire poterit nisi aut uere, aut autumnò. Difficilis æque curatio est in eadem ætate, ubi humerorum dolor uel ad manus peruenit: uel ad scapulas tendit: torporemq; & dolorem creat: neq; bilis uomitu leuatur. Quacumq; uero parte corporis membrum aliquod resolutum est: si neq; mouetur, & emacrescat: in pristinum habitum non reuertitur: eoq; minus quo uetustius id uitium est: & quo magis in corpore senili est. Omnisq; resolutioni nervorum ad medicinam non idonea tempora sunt hyems, & autumnus. aliquid sperari potest uere, & æstate. Isq; morbus mediocris uix sanatur: uehemens sanari non potest. Omnis etiã dolor minus medicinæ patet: qui sursum proædit. Mulieri grauidæ, si subito mammæ emacruerunt: abortus periculũ est. Quæ neq; peperit, neq; grauida est, si lac habet: à menstruis defecta est. Quartana æstus breuis: autumnalis ferè longi est: maximeq; quæ cœpit hyeme appropinquante. si sanguis profluxit: deinde secuta est dementia cum distensione nervorum: periculum mortis est. Itemq; si



medicamentis purgatum, & adhuc inanem, nervorū distentio oppres-  
sit: aut si in magno dolore extremæ partes frigent: neq; is ad vitam  
redit: qui ex suspendio spumante ore detractus est. Alius nigra san-  
guini atro similis repentina siue cum febre, siue etiam sine hac, per-  
niciosa est.

De morborum curationibus. Caput. VIII.

Ognitis inditijs, quæ nos uel spe consolentur: uel metu ter-  
reant: ad curationes morborum transeundum est. Ex his  
quædam cōes sunt: quædam propriæ. cōes, quæ pluri-  
bus morbis opitulantur. propriæ, quæ singulis. ante de  
communibus dicam. Ex quibus tamen quædam non ægros solum, sed  
sanos quoq; sustinent: quædam in aduersa tantum ualitudine adhiben-  
tur. Omne uero auxilium corporis aut demit aliquam materiam:  
aut adiuvat: aut euocat: aut reprimit: aut refrigerat: aut calefacit: si-  
mulq; aut durat: aut mollit. Quædam non uno modo tantum, sed et  
duobus inter se non contrarijs adiuvant. Demitur materia sanguinis  
detractione, cucurbitula, deiectione, uomitu, frictiōe, gestatione, omniq;  
exercitatione corporis, abstinentia, sudore: de quibus protinus dicam.

De sanguinis detractiōe per uenas. Caput. IX.

Anguinem incisa uena mitti nouum non est. sed nullum  
pene morbum esse, in quo non mittatur: nouum est. Item  
mitti iunioribus, & foeminis uterū non gerentibus, uetus  
est. In pueris uero idē experiri, & in senioribus, & in  
gravidis quoq; mulieribus uetus non est. si quidē antiqui primam, ul-  
timamq; ætatem sustinere non posse hoc auxiliij genus indicabant: per-  
suaserantq; sibi mulierem gravidā, quæ ita curata esset: abortum esse  
facturā. Postea uero usus ostendit nihil ex his esse perpetuum: aliasq;  
potiores obseruationes adhibendas esse: ad quas dirigi curantis consi-  
lium debeat. interest enim non quæ ætas sit: neq; qd in corpore in-  
tus geratur: sed quæ uires sint. Ergo si iuuenis imbecillus est: aut si mu-  
lier, quæ gruida non est: parum ualet: male sanguis emittitur. E mo-  
ritur enim uis, si quæ his supererat: et hoc modo erepta ē. At firmus  
puer, & robustus senex, & gruida mulier ualens, tuto curantur. Ma-  
xime tamen in his medicus imperitus falli pōt: quia ferē minus robo-  
ris illis ætatibus subest. Mulieriq; prægnatī post curationē quoq; uiri  
bus opus est nō tantū ad se, sed et ad partū sustinendū. Non qd aūt



intentionem animi, aut prudentiam exigit, protinus faciendum est: cum præcipua in hoc ars sit, quæ non annos numeret: neque conceptionem solam uideat: sed vires æstimet: & ex eo colligat, possit nec ne superesse quod uel puerum, uel senem, uel in una muliere quod duo corpora simul sustineat. Interest enim inter ualens corpus, et obesum: inter tenue, & infirmum. Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat. Facilius itaque illi detractionem eiusmodi sustinent: celeriusque ea, si nimium est pinguis: quis affligitur. Ideoque uis corporis melius ex uenis, quam ex ipsa specie æstimatur. neque enim solum hæc considerata sunt, sed etiam morbi genus quod sit. utrum superans, an deficiens materia læserit. Corruptum corpus sit, an integrum. Nam si materia uel deest, uel integra est: istud alienum est. At si uel copia sui male habet, uel corrupta est: nullo modo melius succurritur. Ergo uehemens febris ubi rubet corpus, plenæque uenæ tument: sanguinis detractionem requirit. Item uiscerum, morbi, nervorumque resolutio, & rigor, & distentio, quicquid denique fauces difficultate spiritus strangulat: quicquid subito suppressit uocem: quisquis intolerabilis dolor est: & quacunque de causa ruptum aliquid intus, atque collisum est. Item malus corporis habitus, omnesque acuti morbi, qui modo, ut supra dixi, non infirmitate, sed onere nocent: fieri tamen potest, ut morbus quidem id desideret: corpus autem uix pati posse uideatur. Sed si nullum tamē appareat aliud auxilium: periturusque sit qui laborat, nisi temeraria quoque uia fuerit adiutus: in hoc statu boni medici est ostendere: quod nulla spes sine sanguinis detractione sit: facientiisque quantus in hac ipsa re sit metus. & tum demum si exigetur, sanguinem mittere. de quo dubitari in eiusmodi re non oportet: satius est enim anceps auxilium experiri, quam nullum. idque maxime fieri debet ubi nervi resoluti sunt: ubi subito aliquis obmutuit: ubi angina strangulatur: ubi prioris febris accessio penè conficit, paremque subsequi uerisimile est, neque eandem uidentur sustinere ægri vires posse. Cum sit autem minime crudo sanguis mittendus: tamen ne id quidem perpetuum est. neque enim semper concoctionem res expectat. Ergo si ex superiore parte aliquis decidit: si contusus est: si ex aliquo subito casu sanguinem uomit, quantum paulo ante sumpsit cibum: tamen protinus ei demenda materia est: ne si subsederit, corpus affligat. Idemque etiam in alijs casibus repentinis qui strangulabunt, dictum erit. At si morbi ratio patietur: tum demum nulla cruditatis suspicionem remanente id fiet. Ideoque ei rei uidetur aptissimus aduersæ uoletudinis dies secundus, aut tertius. sed ut aliquando etiam primo die sanguinem mittere necesse est: sic nunquam utile post diem quartum est:



tum est: cum iam spatio ipso materia & exhausta est, & corpus cor-  
rumpit: ut detractio imbecillum id facere possit: non possit integrum.  
Quod si uehemens febris urget: in ipso impetu eius sanguinem mitte-  
re, hominem ingulare est. Expectanda ergo remissio est, si non decre-  
scat: sed crescere desit: neque speratur remissio, tunc quoque, quamuis pe-  
ior: sola tamen occasio non omittenda est. Ferè etiam ista medicina  
ubi necessaria est: in biduum diuidenda est. satius est enim in primū  
lenare ægrum: deinde perpurigare: quàm simul omni ui effusa for-  
tasse præcipitare. Quod si in cura quoque aquæ, quæ inter cūtem est,  
ista respondet: quanto magis necesse est in sanguine respondeat. mit-  
tendi uero is debet, si totius corporis causa fit, ex brachio: si partis alicuius,  
ex ea ipsa parte: aut certe quàm proxima. quia non ubique mitti potest,  
sed in temporibus: in brachijs, iuxta talos. Neque ignoro quosdam dice-  
re quamlongissime sanguinem inde, ubi lædit, esse mittendum. sic enim  
auerti materiæ cursum: at illo modo in id ipsum quod grauatur, euoca-  
ri. sed id ipsum falsum est. Proximum enim locum primo exaruit.  
Ex ulterioribus autem catenus sanguis sequitur, quatenus emittitur.  
ubi is suppressus est: quia non trahitur, ne uenit quidem. Videtur ta-  
men usus ipse docuisse: si caput fractum est, ex brachio potius sangui-  
nem mittendum esse. Si quod in humero uictum est, ex altero brachio:  
credo quia si quid parum cesserit, opportuniore hæ partes iniuriæ  
sunt: quæ iam male habent. auertitur quoque interdum sanguis, ubi  
alia parte prorumpens: alia emittitur. Desinit enim fluere qua uolu-  
mus: inde obiectis quæ prohibeant, alio dato itinere. Mittere autem  
sanguinem cum sit expeditissimum: usum habenti, tam ignaro diffi-  
cillimum est. iuncta enim est uena arterijs, his nerui. ita si neruum  
scalpellus attingit: sequitur neruorum distentio: eaque hominem crudeli-  
ter consumit. At arteria incisa neque coit, neque sanescit: interdum etiam  
ut sanguis uehementer erumpat, efficit. Ipsius quoque uenæ, si forte præ-  
cisa est, capita comprimuntur: neque sanguinem emittunt. At si timide  
scalpellus demittitur: summam autem lacerat: neque uenam inadiit. Nō  
nunquam etiam ea later: neque facile reperitur. ita multæ res id diffi-  
cile incito faciunt: quod perito facillimum est. Incidenda ad medium  
uena est: ex qua cum sanguis erumpit, colorem eius, habitumque oportet  
attendere. Nam si is crassus, & niger est, uitiosus est: ideoque utiliter  
effunditur. Si rubet, & pellucet, integer est. eaque missio sanguinis adeo  
nō prodest: ut etiā noceat protinusque is suppressendus est. Sed id eue-  
nire non potest sub eo medico, qui scit ex quali corpore sanguis mitten-  
dus sit. Illud magis fieri solet, ut æquæ niger assidue ac primo die  
profluat. quod quamuis ita est, tamen si iam satis fluxit: suppressen-



duus est: semperq; ante finis faciendus est, q̃ anima deficiat. delig-  
dumq; brachiū super imposito expresso ex aqua frigida penicillo: et  
postero die auerso medio digito, non aut scalpello, uena ferienda: ut re-  
uens coitus eius resoluatur: iterumq; sanguinem fundat. Siue aut pri-  
mo, siue secundo die sanguis, qui crassus, et niger initio fluxerat: et  
rubere, et pellucere cepit: satis materiae detractum est: atq; quod  
superest, sincerum est. Ideoq; protinus brachium deligandum: ha-  
bendumq; ita est, donec ualens cicatrixcula sit: quæ celerime in uena  
confirmatur.

De sanguinis detractiōe per cucurbitulas. Caput. X.

Cucurbitularum uero duo genera sunt: aenea, et cor-  
neum. Aenea altera patet: altera clausa est. Cornea alte-  
ra parte æque patens, altera foramen habet exiguum. In  
aeneam linamentum ardēs coniūctur: ac sic os eius corpo-  
ri aptatur: imprimaturq; donec inhaereat. Cornea per se corpori im-  
ponitur: deinde ubi ea parte qua exiguum foramen est, ore spiritus ad-  
ductus est: superq; cœra cauum id clausum est: æque inhaereat.  
Vtraq; non ex his tantum materiae generibus, sed etiam ex quolibet  
alio recte fit. At si cætera defecerūt: caliculus quoq; aut pultarius oris  
compressioris ei rei commode aptatur: ubi inhaesit: si concisa ante scal-  
pello cutis est, sanguinem extrahit. si integra est, spiritum. Ergo ubi  
materia quæ intus est, lædit: illo modo: ubi inflatio, hoc imponi solet.  
Vsus autem cucurbitulae præcipuus est: ubi non in toto corpore, sed in  
parte aliqua uitium est: quam exhauriri ad confirmandam ualetu-  
dinem satis est. Idq; ipsum testimonium est: etiam scalpello sanguinē,  
ubi membro succurritur, ab ea potissimum parte: quæ iam laesa est: esse  
mittendum. q̃ nemo cucurbitulam diuersæ parti imponit: nisi cum  
profusionem sanguinis eo auertit: sed ei ipsi quæ dolet: quæq; liberā-  
da est. Opus etiam esse cucurbitula potest in morbis longis: quanuis et  
spacium aliquod accessit: siue corrupta materia, siue spiritu male ha-  
bente. In acutis quoq; quibusdā si et leuari corpus debet: et ex uena  
sanguinem mitti: uires non patiuntur. Idq; auxilium ut minus uehe-  
mens, ita magis tutum. Neq; unquam periculosum est, et si in medio fe-  
bris impetu: et si in cruditate adhibetur. Ideoq; ubi sanguinem mitti  
opus est: si incisa uena præceps periculum est: aut si in parte corpo-  
ris etiam uitium est: huc potius confugiendum est. cū eo tamen ut scia-  
mus, hic ut nullum periculum, ita lenius præsidium esse: nec posse ue-  
hementi malo, nisi æque uehemens auxilium succurrere.



## De deiectione. Caput. XI.

Eiectionem aut antiqui varijs medicamentis, crebraq; alui  
**d** uctione in omnibus fere morbis moliebantur: dabantq;  
aut nigrum ueratrū, aut filiculam, aut squamam aeris,  
quam *λεπίδος χαλκου* græci uocant: aut lactucæ marinæ  
lac: cuius gutta pani adiecta, abunde purgat: aut lac uel asininum, uel  
bubulum, uel caprimum: eiq; salis paulum adiciebant: decoquebantq;  
id: et sublatis his, quæ coierant: quod quasi serum supererat: bibere  
cogebant. Sed medicamenta stomachū fere lædunt. ideoq; omnibus cat-  
harticis aloë miscenda est. Alius si uehementius fluit: aut sæpius duci-  
tur: hominem infirmat. Ergo nunquam in aduersa uale tudine medica-  
mentum eius rei causa recte datur: nisi ubi is morbus sine febre est. Vt  
cum ueratrū nigrum, aut atra bile uexatis, aut cum tristitia insaniē-  
tibus, aut is quorū nervi parte aliqua resoluti sunt: datur. At ubi fe-  
bres sunt: satius est eius rei causa cibos, potionesq; assumere: qui simul  
et alant: et uentrē molliant. Suntq; uale tudinis genera, quibus ex la-  
cte purgatio conuenit. Plerumq; uero aluius potius ducenda est: quod ab  
Asclepiade quoq; sic uituperatum, ut tamen seruatum sit: uideo ple-  
rumq; sæculo nostro præteriri. Est autem ea moderatio, quam is se-  
tus uidetur: aptissima: ut neq; sæpe ea medicina tentetur: et tamen se-  
mel sumptum uel bis, non omittatur. Si caput graue est: si oculi cali-  
gant: si morbus maioris intestini est, quod græci *ὠλον* nominant: si in  
imo uentre, aut in coxa dolores sunt: si in stomachū quædam biliosa  
cōcurrunt: uel et pituita eò se, humor uel aliquis aquæ similis confert:  
si spiritus difficiliter redditur: si nihil per se uenter excernit. utiq; si  
iuxta quoq; stercus est, et intus remanet: aut si stercoris odorē nihil  
deiciens, æger ex spiritu suo sentit: aut si corruptum est quod excerni-  
tur: aut si prima inedia febre non sustulit: aut si sanguinem mitti, cū  
opus sit: uires non patiuntur: tempus uel eius rei præterijt. aut si mul-  
tum ante morbū aliquis portauit: aut si is qui sæpe, uel sponte, uel casu  
purgatus est: subito habet aluiū suppressam. seruanda uero illa sunt, ne  
ante diem tertiu ducatur: ne ulla cruditate substantive, ne in corpore in-  
firmo, diuq; aduersa uale tudine exhausto: ne uel in eo, cui satis aluius  
reddit cotidie, qui uel eam liquidam habebit: ne in ipso, accessionis im-  
petu, quia quod tum infusum est, aluo continetur: regestumq; in caput  
multo grauius piculū efficit. pridie uero abstinere debet æger: ut aptus  
tali curationi sit. Eodē die ante aliquot horas aquā calidā bibere, ut  
superiores eius ptes madescat: tum immittēda in aluiū est: si leni medici-  
na cōiecti sumus: pura aqua, si paulo ualētiori: mulsa, si leni, ex aqua in



qua fœnum græcum uel ptisana uel malua decocta sit. si reprimen-  
di causa: ex uerbena. acris autem est marina aqua uel alia, sale adie-  
cto: atq; utraq; decocta commodior est. Acrior fit adiecto uel oleo elu-  
nitro uel melle quoq; si acrior est: eo plus extrahit: sed minus faciel  
sustinetur. Id quod infunditur: neq; frigidum esse oportet: neq; calidū:  
ne alterutro modo lædat. Cum infusum est: quantum fieri potest con-  
tinere se in lectulo debet æger: nec primæ cupiditati deiectionis pro-  
stinus cedere. ubi necesse est, tum demum residere. ferèq; eo modo  
dempta materia superioribus partibus leuatis morbum ipsum mol-  
lit. Cum uero, quoties res coegit, desidendo aliquis se exhaust: pau-  
lisper debet conuiescere, et ne uires deficiant: utiq; eo die cibum assu-  
mere. qui plenior an exiguus sit dandus: ex ratione eius accessionis,  
quæ expectabitur, aut in metu non erit, æstimari oportebit.

## De uomitu. Caput. XII.

Vomitus ut in secunda quoq; ualitudine sæpe necessa-  
rius biliosis est: sic et in his morbis, quos bilis concitauit.  
Ergo omnibus, qui ante febres horrore, et tremore uexan-  
tur: omnibus, qui cholera laborant: omnibus et cum qua-  
dam hilaritate insipientibus, et comitiali quoq; morbo oppressis, ne-  
cessarius est. Sed si acutus morbus est, sicut in cholera: si febris est, ut  
inter horrores: asperioribus medicamentis opus nõ est: sicut in deiectioni-  
bus quoq; supra dictum est. satisq; est ea uomitus causa sumi: quæ  
sanis quoq; sumenda esse proposui. At ubi longi ualentisq; morbi sine  
febre sunt, ut comitialis, aut insania: ueratro quoq; albo utendū est: id  
neq; hyeme, neq; æstate recte datur: optime uere: tolerabiliter autumno.  
quisquis daturus erit, id agere ante debet, ut accepturi corpus humi-  
dius sit. Illud scire oportet, omne eiusmodi medicamentum, quod po-  
tius datur, non semper ægris prodesse: semper sanis nocere.

## De frictione. Caput. XIII.

E frictione uero, et gestatione adeo multa Asclepiades  
tanquam inuentor eius posuit: quod in eo uolumine, quod  
communium auxiliorum scripsit: cum trium tantum fa-  
cere mentionem, uinis. s. et aque, et gestationis: tamen ma-  
ximam partem in hoc consumpserit. Oportet autem neq; recentio-  
res uiros in his fraudare: quæ uel repererunt: uel recte secuti sunt.  
Et tamen ea, quæ apud antiquiores aliquos posita sunt: autho-  
ribus suis reddere. Neque dubitari potest quin latius quidem



Et dilucidius ubi, et quomodo frictione utendū esset. Aselepiades præ-  
 cepit: nihil tamen repperit, quod non à vetustissimo auctore Hip-  
 pocrate paucis uerbis cōprehensum sit: qui dixit. frictione, si uehementis  
 sit, durari corpus: si lenis, molliri: si multa, minui: si modica, impleri. se-  
 quitur ergo ut tum utendum sit: cum aut astringendum corpus sit,  
 quod fluēs est: aut moliendū quod induruit: aut digerendū in eo quod  
 copia nocet. aut alendum id q̄ tenue: et infirmum est. Quas tamen  
 species si quis curiosius æstimet, quod iam ad medicum non pertinet: fa-  
 cile intelliget omnes ex una causa pendere, quæ demit. Nam et astrin-  
 gitur aliqd eo dempto: quod interpositum, ut id laxaretur, efficerat.  
 et mollitur eo detracto, quod duriciē creabat: et impletur non ipsa  
 frictione, sed eo cibo: qui postea usq; ad cutem digestionē quadam rela-  
 xatam penetrat. Dīuersarum uero rerū in modo causa est. Inter un-  
 ctionem autem, et frictionem multum interest. Vng. n. leuiterq; per-  
 tractari corpus ēt in acutis, et recentibus morbis oportet: in remissio-  
 ne tamen, et ante cibum. Longa uero frictione uti neq; in acutis mor-  
 bis, neq; in crescentibus conuenit: præter q̄ cum phrenitis somnus ea  
 requiritur. Amat aut hoc auxiliū ualetudo longa, et ēt à primo im-  
 petu inclinata. Neq; ignoro quosdā dicere omne auxilium necessarium  
 esse increscentibus morbis: non cum iam per se finiuntur. quod non  
 ita se habet. Potest. n. morbus etiam qui per se finem habiturus est: ci-  
 tius tamen adhibito auxilio tolli. quod duabus de causis necessarium  
 est: ut et q̄ primum bona ualetudo contingat: et ne morbus qui re-  
 manet, iterum quamuis leui de causa exasperetur. Potest. n. morbus mi-  
 nus grauis esse q̄ fuerit: neq; ideo tamen solui: sed reliquiis quibusdā  
 inhæere: quas admotum aliquod auxiliū discent. Sed ut leuata quoq;  
 aduersa ualitudine recte frictio adhibetur: sic nunq; adhibenda est fe-  
 bre increscente. Verum si fieri poterit, cum ex toto corpus ea uacabit:  
 minus certe cum ea remiserit. Eodem autem modo in tutis corpori-  
 bus esse debet: ut cum infirmus aliquis implendus modo est in par-  
 tibus: aut quia ipsius membri imbecillitas id requirit: aut quia  
 alterius. Nam et capitis longos dolores ipsius frictio leuat: non in-  
 impetu tamen doloris, et membrum aliquod resolutum ipsius fri-  
 ctione confirmatur. Longe tamen sepius aliud perfricandum est, cum  
 aliud doler: maximeq; cum à summis, aut à medijs partibus corporis  
 euocare materiā uolumus: ideoq; extremas partes perfricamus. Neq;  
 audiendi sunt, qui numero finiunt quoties aliquis perfricandus sit. Id  
 enim ex uiribus hominis colligendum est. Et si is qui per infirmus est:  
 potest satis esse, quinquagies. si robustior pōt, ducenties esse faciendum.  
 Inter utrunq; deinde prout uires sunt. Quo sit ut et minus saepe in



muliere, quàm in uiro: minus sæpe in puero, uel sene, quàm in iuvene manus dimouendæ sint. Deniq; si certa membra perficiantur: multa, ualentiq; frictione opus est. Nam neq; totum corpus infirmari cito per partem pôt: & opus est quã plurimũ materiæ digerit: siue id ipsum membrum, siue per id aliud leuamus. At ubi totius corporis imbecillitas hanc curationē per totum id exigit: breuior esse debet, & lenior: ut tantummodo summam cutem emolliat: quo facilius capax ex recēti cibo nouæ materiæ fiat. In malis iam ægrum esse testatur: ubi exterior pars corporis friget: interior cum siti calet: ut supra posui. Sed tunc quoq; unicum in frictione præsidium est: quæ si calore in cutem euocauit: potest alicui medicinæ locum facere.

## De gestatione. Caput. XIII.

gestatio quæq; longis etiam, & inclinatis morbis aptissima est: utilisq; est & his corporibus, quæ iam ex toto febre carent: sed adhuc exerceri per se nõ possunt: & his quibus lentæ morborũ reliquæ remanent: neq; aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti, uehementiq; febre, præcipuq; ardente, ad discutiendam eam, gestatione dixit utendum esse: sed id periculose fit: meliusq; quiete eiusmodi impetus sistitur. si quis tamen experiri uolet: sic experiatur. si lingua non erit aspera: si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor uisceribus, aut capiti, aut præcordijs suberit. et ex toto nunquã gestari corpus dolens debet: siue id in toto, siue in parte est: nisi tamen solis nervis dolentibus, neq; unquam in recenti febre, sed in remissione eius. Genera autem gestationis plura sunt adhibenda: quæ sunt et pro uiribus cuiusq; & pro opibus: ne aut imbecillum hominem nimis digerant: aut humili obsint. Gestationum lenissima est navi, uel in portu, uel in flumine. uehementior in alto mari navi, uel lectici, aut scanno: acrior uehiculo. Atq; hæc ipsa & intendi, & leniri possunt. si nihil horum est, suspendi lectus debet: & moueri. si ne id quidem est: at certe uni pedi lecti subiiciendus funiculus est: atq; ita lectus huc, & illuc manu impellendus. Et leuia quidem genera exercitationis infirmis conueniunt. Valentiora uero his qui iam pluribus diebus febre liberati sunt: aut his qui grauium morborum initia sic sentiunt: ut adhuc febre uacent. Quod & in tabe, et in stomachi uitij, & cum aqua cutem subiit, & interdum in morbo regio fit: aut ubi quidã morbi, qualis comitialis, qualis insania ē sine febre, quanuis diu manent. In quibus affectibus ea quoq; genera exercitationum necessaria sunt, quæ cõprehendimus eo loco: quo quemadmodum sani, neq; firmi homines se gererent: præcipimus.



Abstinentiæ uero duo genera sunt: alterum ubi nihil assumit æger: alterum ubi non nisi quod oportet. Initia morborum primum famem, sitimq; desiderant: ipsi deinde morbi, moderationem: ut neq; aliud quam expedit: neq; eius ipsius nimis sumatur. Neq; enim conuenit iuxta inediam protinus sacietatem esse. Quod si sanis quoq; corporibus inutile est: ubi aliqua necessitas famem fecit: quanto inutilius est in corpore et ægro? Neq; ulla res magis adiuvat laborantem, q̄ tempestiua abstinentia. Intemperantes homines apud nos, ipsi cibi tempora curantibus dant. Rursus alij tempora medicis pro dono remittunt: sibi ipsis modum uē dicant. Liberaliter agere se credunt qui cætera illorum arbitrio relinquit: in genere cibi liberi sunt: quasi quaeratur qd medico liceat: non quid ægro salutare sit: cui uehemēter nocet, quotiens in eius quod assumitur uel tempore, uel modo, uel genere peccatur.

## De sudore. Caput. XVI.

Vdor etiam duobus modis elicitur: aut siccō calore, aut balneo. Siccus calor est, & harenæ calidæ, & læoni cī, & clibanī, et quarundam naturalium sudationes. ubi ē terra profusus calidus uapor edificio includitur: sicut sup̄ aras in myrtetis habemus. Præter hæc sole quoq; et exercitatioe is mouetur. Vtiliq; hæc genera sunt quoties humor intus nocet: isq; digerendus est. Ac neruorum quoq; quædam uitia sic optime curantur: sed cætera infirmis possunt conuenire. solet exercitatio tantum robustioribus, qui tamen sine febre, uel initio morbi, uel et grauius morbis tenentur. Cauendum autem est nequid horū uel in febre, uel in cruditate tentetur. At balnei duplex usus est. nam modo dī scissis febribus initium cibi plenioris, uiniq; firmiter ualetdini facit: modo febrem ipsam tollit: ferēq; adhibetur, ubi summam cātem relaxari, euocariq; corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit. antiqui timidius eo utebātur. Asclepiades audacius. Neq; terrere autem ea res, si tempestiua est: debet. & ante tempus nocet. Quisquis febre liberatus est: simulatq; ea uno die non accessit: eo, qui proximus est, post tēpus accessionis, tuto lauari potest. At si circūm habere ea febris solita est, sic, ut tertio, quarto uē die reuertatur: quodcumq; non accessit: balneum tutum est. Manentibus uero adhuc febribus, si hæc sunt lentæ, lienesq; iā diu male habent: recte mediana ista tentatur: cum eo tamen ne præcordia dura sint:



ne'ue ea tumeant: ne'ue lingua aspera sit: ne'ue aut in medio corpore, aut in capite dolor ullus sit: ne'ue tum febris increseat. At in his quidem febribus, quæ certum circuitum habent, duo balnei tempora sunt: alterum ante horrorem, alterum febre finita. In his uero, qui lentis febriculis diu detinentur: cum aut ex toto recessit accessio: aut si id non solet, certe lenita est: iamq; corpus tam integrum est: quam maxime esse in eo genere ualetudinis solet: imbecillus homo iturus in balneum uitare debet: ne ante frigus aliquod experiatur. Vbi in balneum uenit, paulisper resistere: expeririq; num tempora astringantur: & an sudor aliquis oriatur. Illud si incidit, hoc non secutum est: inutile eo die balneum est: perungendus est is leniter, & auferendus est: uitandumq; omnimodo frigus: & abstinentia utendum. At si temporibus integris primum ibi, deinde alibi sudor incipit: fouendum os aqua calida: tñ in solio desidendum est: atq; ibi quoq; uidendum, num sub primo cō tactu aquæ calidæ summa cutis inhorrescat: quod uix tamen fieri potest, si priora recte cesserunt. certum id autem signum inutilis balnei est. Ante uero, an posteaquam in aquam calidā se demittat: aliquis perungi debeat: ex ratione ualetudinis suæ cognoscat. Ferè tamen, nisi ubi nominatim, ut postea fiat, id præcipietur: moto sudore leniter corpus perungendum: deinde in aquam calidam demittendū est. atq; hic quoq; habenda uirium ratio est. Neq; committendum ut per æstum anima deficiat: sed maturius is auferendus: curiosq; in uestimentis inuoluendus est. ut neq; ad eum frigus aspiret: & ibi quoq; antequam aliquid assumat: insudet. Fomenta quoq; calida sunt miliū, sal, harena, quodlibet eorum calefactum, et in linteam coniectum. si minore ui opus est: etiam solum linteū. At si maiore: extincti titiones, inuolutiq; panniculi, & sic circumdati. Quin etiam calido oleo replentur utriculi: & in uasa fitchilia: ad similitudinem, quas lenticulas uocant: aqua coniungitur: & sal sicco linteo excipitur. demittiturq; in aquam bene calidam. tum super id membrum, quod fouendum est: collocatur: iuxtaq; igne ferramenta duo sunt capitula paulo latioribus: alterumq; ex his demittitur in eū salem: & aqua super leniter aspergitur. ubi frigere coepit, ad ignem refertur: & idem in altero fit: deinde inuicem in utroq; inter quæ descendit salsus, & calidus succus: qui contractis aliquo morbo neruis opitulatur. His omnibus commune est digerere id quod uel præcordia onerat: uel fauces strangulat: uel in aliquo membro nocet. Quando autem quoq; utendū sit, in ipsis morborum generibus dicitur.

Qui abi,



Qui cibi, potiones ue, aut ualentis, aut media, aut imbecillae materiae sint. Caput. XVII.

Vm de his dictum sit, quae detrahendo iuuant: ad ea ueniendum est, quae nos alunt: id est cibum, et potionem. haec aut non omnium tantum morborum, sed et secundum aetate praesidia sunt. Pertinetque ad rem omnium proprietates nosse. primum ut sani sciant quomodo his utantur. deinde ut exsequentibus nobis morborum curationem, liceat species rerum, quae assidue necessariae erunt: subijcere. neque necesse est subinde singulas eas nominare. Scire igitur oportet omnia legumina, quaeque ex frumentis panificia sunt, generis ualentissimi esse. Id ualentissimum uocatur in quo plurimum alimenti est: item omne animal quadrupes domesticum: omnem grandem feram, quales sunt caprea, ceruus, aper, onager, omnem grandem auem, quales sunt anser, et pauo, et grus: omnes beluas marinas, ex quibus cetos est: quaeque his pares sunt. Item mel, et caseum quo minus mirum est, opus pistorium ualentissimum esse: quod ex frumento, adipe, melle, caseo constat. In media uero materia numerari ex oleribus debere ea: quorum radices uel bulbos assidue minus. Ex quadrupedibus leporem aues omnes a minimis ad phoenix, et pterodactylum. item pisces omnes, qui salem non patiuntur: solidi uel saluntur. Imbecillissimam uero materiam esse omne olus: et quicquid in cauliculo nascitur: qualis est cucurbita, et cucumis, et capparitis, omnia poma, oleas, coctileas, itemque cochilia. Sed quamuis haec ita discreta sunt: tamen et quae sub eadem specie sunt: magna discrimina recipiunt: aliaque res alia, uel ualentior est, uel infirmior. Si quidem plus alimenti est in carne, quam in ullo alio. Firmitus est triticum, quam milium: id ipsum: quam hordeum: et ex tritico firmissima siligo: deinde simila: deinde cui nihil ademptum est, quod αὐτό πῦρον graeci uocant: infirmior est. ex polline infirmissimus abarius panis. Ex leguminibus uero ualentior faba, uel lenticula, quam pisum. Ex oleribus ualentior rapa, napique, et omnes bulbi: in quibus cepam quoque, et allium numero: quam pastinaca, uel quae specialiter radícula appellatur. Item firmitus brassica, et beta, et porrum: quam lactuca, uel cucurbita, uel asparagus. At ex fructibus succulentiorum ualentiores uuae, ficus, mices, palmulae: quam quae poma proprie nominantur. Atque ex his ipsis firmitus, quae succosa: quam quae fragilia sunt. Itemque ex his auiibus, quae in media specie sunt: ualentior ea quae pedibus: quam quae uolatu magis nititur: et ex his quae uolatu fidunt: firmitus sunt quae graviores: quam quae minutae sunt, ut ficedula, et turdus. Atque ea quoque,

Aurelij Cor.

d



## LIBER

quæ in aqua degunt, leuiorem cibum præstant: quàm quæ natandi scientiam non habent. Inter domesticas uero quadrupedes leuissima fuilla est: grauiissima bubula. Itemq; ex feris quo maius quodq; animal, eo robustior ex eo cibus est. Pisciumq; eorum, qui ex media materia sunt, quibus maxime utimur: tamen grauissimi sunt: ex quibus salsamenta quoq; fieri possunt: qualis lacertus est. deinde qui quantus teneriores: tamen duri sunt, ut aurata, coruus, scærus, oculata, tum plani, post quos etiam leuiiores lupi, muli; et post hos omnes saxatiles. Neq; uero in generibus rerum tantummodo discrimen est: sed etiã in ipsis: quod et ætate fit, et membro, et solo, et cælo, et habitu. nã quadrupes animal omne si lactans est, minus alimenti præstat. Item quo tenerior pullus, cohortalis est. In piscibus quoq; media ætas, quæ non dum summam magnitudinem impleuit. Deinde ex eodem sue unguis, rostrum, aures, cerebellum. Ex agno, hedo uel cum pectiolis totum caput aliquanto quàm cetera membra leuiora sunt: adeo ut in media materia poni possint. Ex auibus pectora, colla, alæ uel recte infirmis annumerantur. Quod ad solum uero pertinet: frumentum quoq; ualentius est collinum, quàm campestre. leuior piscis inter saxa editus, quàm in harena: leuior in harena, quàm in limo. Quo fit, ut ex stagno, uel lacu, uel flumine eadẽ genera grauiora sint. Leuiorq; qui in alto, quàm qui in uado uixit. Omne etiam ferum animal domesticum leuius, et quodcunq; humido cælo, quàm quod siccum natum est. Deinde eadem omnia pinguis, quàm macra: recentia, quàm salsa, noua, quàm uetusta plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit iurulenta, quàm assa: magis assa, quàm elixa. Ouum durum ualentissimæ materiæ est: molle, uel forbile, imbecillissimæ. Cum quæ panificia omnia firmissima sint: elota tamen quædam genera frumenti, ut alia, oriza, ptisana, uel ex hisdẽ facta sorbitio, uel pulticula. Et aqua quoq; madens panis imbecillissimis annumerari potest. Ex potionibus uero quæcunq; ex frumento facta est: itemq; lac mulsum, defrutum, passum, uinum aut dulce, aut uehemens, aut mustum, aut magnæ uetustatis, ualentissimi generis est. At acetum, et id uinum: quod paucorum annorum, uel austerum, uel lene est: in media materia est. Ideoq; infirmis nunquam generis alterius dari debet. A qua omnium imbecillissima est. firmiorq; ex frumento potio est, quo firmitus fuit ipsum frumentum. firmior ex eo uino, quod bono solo, quàm quod tenui: quodq; temperato cælo, quàm quod aut nimis humido, aut nimis siccum: nimumq; aut frigido, aut calido natum est. Mulsum quo plus mellis habet: defrutum quo magis incoctum est: passum quo ex siccioris uua est: eo ualentius est. A qua leuissima pluuialis est: deinde



fontana: tum ex flumine, tum ex puteo: post hæc ex nive, aut glacie: grauior his ex lacu: grauiſſima ex palude. Facilis etiam & neceſſaria cognitio eſt naturam eius requirentibus. nam leuis pondere apta paret: & ex his quæ pondere pares ſunt, eo melior quæque eſt: quo celerius & caleſcit, & frigefcit: quoque celerius ex ea legumina percoquantur. ferè uero ſequitur ut quo ualentior quæque materia eſt: eo minus facile concoquatur: ſed ſi concocta eſt, plus alat. Itaque utendum eſt materia genere pro uiribus: modusque omnibus pro genere ſumendus. Ergo imbecillis hominibus rebus inſirmiſſimis opus eſt. mediocriter firmos media materia optime ſuſtinet. & robuſtis apta, ualidiſſima eſt. Plus deinde alijs aſſumere ex leuioribus poteſt, magis in his quæ ualentiffima ſunt, temperare ſibi debet.

Quæ natura, ac proprietas cuiusque rei ſit, qua uelſcitur.

## Caput. XVIII.

Eq; hæc ſolo discrimina ſunt: ſed etiã aliæ res boni ſucci:  
 n aliæ mali ſunt: quas οὐχόλας, uel κακοχόλας græci uocant. Aliæ lenes, aliæ acres: aliæ craſſiorem pituitam in nobis faciunt, aliæ tenuiore: aliæ idoneæ ſunt ſtomacho: aliæ alienæ ſunt. Itemque aliæ inflant: aliæ ab hoc abſunt. aliæ caleſcunt: aliæ refrigerant: aliæ facile in ſtomacho acſcunt: aliæ non facile intus corrumpuntur. aliæ mouent aluum: aliæ ſupprimunt. aliæ citant urinam: aliæ tardant. Quædam ſomnum mouent: quædam ſenſus excitant. Quæ omnia ideo noſcenda ſunt, quoniã aliud aliter, uel corpori, uel ualitudini conuenit.

## Quæ res boni ſucci ſint. Caput. XIX.

b Oni ſucci ſunt triticum, ſiligo, alia, oriza, amilũ. Itẽ et lenes ſunt, & ſtomacho aptæ: et caleſcunt tragum, ptifana, lac, caſeus mollis, omnis uenatio, omnes aues, quæ ex media materia ſunt. Ex maioribus quoque hæc, quas ſupra nominauimus. Mediũ inter teneros, durosque piſces, ut mulus, & lupus, uerna, lactuca, urtica, malua, cucumis, cucurbita, ouũ ſorbile, portulaca, cochleæ, palmule. ex pomis quodcunque neque acrlum, neque acidũ eſt. Vinum dulce uel lene, paſſum, defrutum: oleæ quæ ex his duobus in alterutro ſeruata ſunt: uulua, roſtra, trunculiq;. In ſumma omnis pinguis caro, omnis glutinofa, omne iecur.

d ij



## LIBER

Quæ res mali succi sint. Caput. XX.

Ali uero succi sunt milium, panicum, hordeum, legumi-  
 na, caro domestica permacra, omnisq; caro salsa, omne  
 falsamentum, garû: uetus caseus, cicer, radícula, rapa, napi,  
 bulbi, brassica: magisq; et cyma eius, asparagus, beta, cu-  
 cumis, porrum, eruca, nasturtium, thymum, nepeta, satyria, hyssopum,  
 ruta, anethum, feniculum, cuminum, anesum, lapatium, sinapi, et  
 allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcunq; acidum, uel acer-  
 bum est: acetum, omnia acria, acida, acerba, oleum: pisces quoq; saxa-  
 tiles, omnesq; qui ex tenerrimo genere sunt: aut hi qui rursus nimium  
 duri: uirosiq; sunt: ut ferè quos stagna, lacus, limosi ue riui ferunt:  
 qui ue in nimiam magnitudinem excesserunt.

Quæ res lenes: quæ ue acres sint. Caput. XXI.

Enes autem sunt sorbitiones, pulicula, laganum, amilû,  
 ptisana, pinguis caro, et quæcunq; glutinosa est. Quod  
 ferè quidem in omni quæ domestica fit: præcipue tamen  
 in ungulis, trunculisq; suum: in pectiolis, capitulisq; he-  
 dorum, et uitulorum, et agnorum: omnibusq; cerebellis. Item si qui  
 proprie bulbi nominantur: lac, defrutum, passum, nuclei pinei. Acria  
 sunt omnia nimis austerâ: omnia acida, omnia salsa, et mel quidem  
 quo melius est: eo magis. Item allium, cepa, eruca, ruta, nasturtium, cu-  
 cumis, beta, brassica, asparagus, sinapi, radícula, intubus, ocymum, la-  
 ctuca, maximaq; olerum pars.

Quæ res crassiorè, quæ ue tenuiorem pituitâ faciunt. Caput. XXII.

Crassiorem autem pituitam faciunt omnia sorbilia, alicia, ori-  
 za, amilum, ptisana, lac, bulbi, omniaq; ferè glutinosa.  
 Extenuant eandem omnia salsa, atq; acria, et acida.

Quæ res stomacho idoneæ sunt. Caput. XXIII.

Stomacho autem aptissima sunt quæcunq; austera sunt:  
 et quæ acida sunt: quæq; contacta sale modico sunt. Item  
 panis sine fermento, et elota alicia, uel oriza, uel ptisana:  
 omnis auis, omnis uenatio, atq; utraq; uel assa, uel elixa.  
 Ex domesticis animalibus bubula. si quid ex cæteris sumitur, macrius  
 potius,



potius, quàm pingue. Ex sue ungulæ, rostra, aures, uulvæ, sterilesq̃.  
Ex oleribus intubus, lactuca, pastinaca, cucurbita elixa, sifer. Ex po-  
mis cerasium, morum, sorbum, pirũ fragile, quale crustuminum uel  
neuiianum est. Item pira quæ reponuntur tarëtina, atq; signina. Ma-  
lum orbiculatum, aut scandianum, uel amerinum, uel cotoneũ, uel pu-  
nium absinthium. Vuæ ex olla, molle ouum, palmulæ, nuclei pinci,  
oleæ albæ ex dura nũria, eadem aceto intinctæ, uel nigræ, quæ in ar-  
bore bene permaturuerũt: uel quæ in passo, defrutu uel seruata sunt.  
Vinum austerum, licet iam asperum sit: item resinatum. Duri ex me-  
dia materia pisces, ostrea, peccines, murices, purpuræ, cochleæ, cibi, poti-  
onesq̃: uel frigida, uel feruentes, absinthium.

Quæ res alienæ stomacho sunt. Caput. XXIII.

Lienæ uero stomacho sunt omnia tepida, omnia salsa, om-  
nia iurulenta, prædulcia, omnia pingua, sorbitio, panis,  
itemq̃: uel ex milio, uel ex hordeo, oleum, radices olerũ,  
et quodcunq; olus ex oleo, garo uel estur: mel, mulsum, de-  
frutum, passum, lac, omnis caseus, una recens, ficus & uiridis, & ari-  
da, legumina omnia, quæq; inflare consueuerunt. item thymum, nepe-  
ta, satueria, hyssopum, nasturtium, lapatium, lapsanum, iuglandes. Ex  
his autem intelligi potest non quicquid boni suci est, protinus stomacho  
conuenire: neq; quicquid stomacho conuenit, protinus boni suci esse.

Quæ inflant, aut inflationem leuant. Caput. XXV.

Inflant autem omnia ferè legumina, omnia pingua, om-  
nia dulcia, omnia iurulenta, mustum, atq; etiam id uinũ,  
cui nihil adhuc ætatis accessit. Ex oleribus alium, cepa,  
brassica, omnesq; radices excepto sifere & pastinaca:  
bulbi, ficus etiam arida, sed magis uirides: una recens, nũces omnes  
exceptis nucleis pineis: lac, omnisq; caseus, quicquid deinde suberudũ  
aliquis assumpsit. Minima inflatio fit ex uenatione, aucupio, piscibus,  
pomis, oleis, conchilijs, ouis uel mollibus, uel sorbilibus, uino uetere. For-  
niculum uero, & anetum inflationes etiam leuant.

Quæ res aut calefaciunt, aut refrigerant. Caput. XXVI.

Calefaciunt piper, sal, caro omnis iurulenta, alliũ, cepa,  
ficus arida, salsamentum, uinum, & quo meracius est, eo  
Aurelij Cor. d iij



## LIBER

magis refrigerant olera, quorum crudi caules assumuntur, ut intubus, & lactuca. Item coriandru, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasia, mala austera, pira fragilia, caro elixa, præcipueq; acetu, siue abus ex eo, siue potio assumitur.

Quæ res intus facile vitiantur, uel minime corrumpuntur.

### Caput. XXVII.

**F**acile autem intus corrumpuntur panis fermentatus, & quisquis alius, quam ex tritico est: lac, mel, ideoq; lactantia, atq; omne pistoriu opus, teneri pisces, ostrea, olera, caesus & recens, & uetus, crassa uel tenera caro, uinu dulce, mulsum, defrutum, passum, quicquid deinde uel iurulentum est, uel nimis dulce, uel nimis tenue. At minime intus vitiantur, panis sine fermento, aues, et eæ potius duriores, aurati pisces, neq; solu aurata pura, aut scærus, sed etiã lolligo, locusta, polypus. Item bubula, omnisq; dura caro, eademq; aptior est si macra, si salsa est. omniaq; salsamenta, cochleæ, murices, purpuræ, uinum austerum, uel resinatam.

Quæ res aluum mouent. Caput. XXVIII.

**T**alium mouent panis fermentatus, magisq; si cibarius, uel hordeaceus est. brassica, si subcruda est lactuca, anethum, nasturcium, ocymum, urtica, portulaca, radícula, capparis, allium, cepa, malua, lapatium, beta, asparagus, cucurbita, cerasia, mora, una, omnia mitia, ficus etiam arida, sed magis uiridis, unæ recentes pingues, minutæ aues, cochleæ, garum, salsamenta, ostrea, pelorides, echini, muscoli, & omnes ferè conchule, maximeq; ius earu, saxatiles, & omnes teneri pisces, sepiaru atramentum: si qua caro assumitur pinguis, eadem uel iurulenta, uel elixa: aues quæ natant, mel crudu, lac, lactantia omnia, mulsum, uinum dulce, uel salsum, aqua, tenera omnia tepida, dulcia, pingua, elixa iurulenta, salsa, diluta.

Quæ res aluum astringant. Caput. XXIX.

**C**ontra astringunt panis ex siligine, uel ex simila, magis si sine fermento est: magis etiam si ustus est: intenditurq; uis eius et si bis coquitur. pulticula uel ex halica, uel ex panico, uel ex milio. itemq; ex hisdem sorbitio, & magis



si hæc ante fricta sunt. lenticula, cui uel beta, uel intubus, uel ambubeia, uel plantago adiecta est, magisq; et si illa ante fricta est: per se etiam intubus uel ex plantagine, uel ambubeia fricta: minuta olera, brassica bis decocta, dura oua, magisq; si assa sunt: minuta aues, merula, palumbus, magisq; si in posca decoctus est: graues quoq; aues, quæ magis currunt, quàm uolant: lepus, caprea, iecur ex his, quæ seuius habent, maximeq; bubulum, ac seuium ipsum, caseus: qui uehementior uetustate fit, uel ea mutatione quam in caseo transmarino uidemus: aut si recens est ex melle, mulso uel decoctus. Itē mulcoctum, pira immatura, sorba, magisq; ea: quæ torminalia uocantur, mala cydonia, et punica, oleæ uel albæ, uel permaturæ, myrta, palmulæ purpuræ, murices, uinū resinatum uel asperū: item meracum, acetum mulsum quod inferbuit: item defrutū, passum, aqua uel tepida, uel præfrigida dura, idest ea quæ tarde putrescit, ideoq; pluuia potissimum: omnia dura, macra, austera, aspera, tosta, et in eadē carne: assa potius, quàm elixa.

Quæ res urinam mouent. Caput. XXX.

Urinam autē mouent quæcunq; in horto nascentia boni odoris sunt, ut apium, ruta, anethū, ocymum, menta, hyssopum, anethum, coriandru, nasturciu, crucca, fœniculū. Præter hæc asparagus, capparis, nepeta, thymum, satureia, lapsanū, pastinaca, magisq; agrestis, radícula, sifer, cepa. Ex uenatione maxime lepus, uinum tenue, piper et rotundum, et longum, sinapi, absinthium, nuclei pinei.

Quæ res somnum mouent, aut sensus excitant. Caput. XXXI.

Omno uero aptum est papauer, lactuca, maximeq; aestiua, cuius cauliculus iam lacte repletus est: morum, porrum. Sensus excitāt nepeta, thymum, satureia, hyssopum, præcipueq; puleium, ruta, & cepa.

Quæ res corpus aut erodant, aut reprimant, aut refrigerent, aut calefaciant, aut durent, aut emolliant. Caput. XXXII.

Vocare uero materiam multa admodum possunt. sed ea quæ ex peregrinis medicamentis maxime cōstant: alijsq; magis, quàm quibus ratione uictus succurritur, opitulatur: in præsentia differam. Ponam ea uero quæ præpta, & his morbis de quibus protinus dicturus sum, apta: corpus erodunt:

d iij



Et sic eo quod mali est, extrahunt. Habent autē hanc facultatem se-  
 mina cruce, nasturcij, radicle præcipue tamē omnium sinapi Salis  
 quoq; Et fici eadem vis est. leniter uero simul Et reprimunt, Et  
 molliunt lana succida uel aceto, uel uino: quo oleum adiectum est.  
 contrita palmulæ: furfures in salsa aqua, uel aceto decoctæ. At si-  
 mul reprimunt Et refrigerant herba muralis, parthenium uel perdi-  
 cium appellant: serpillum, puleium, ocymum, herba sanguinalis, quam  
 græca πολυρόριον uocant: portulaca, papaueris folia, capreoliq; uitiū,  
 coriandri folia, hyoscyamū, muscus, sifer, apiū, solanum, quā σποχρον  
 græca uocant: brassicæ folia, intubus, plantago, fœniculi semē, contrita  
 pira uel mala, præcipueq; cydonia, lenticula, aqua frigida maximeq;  
 pluuialis, uinum, acetum, Et ex horum aliquo magis, madens uel pa-  
 nis, uel farina, uel spongia, uel cinis, uel lana succida, uel etiam linte-  
 lum, creta cimolia, gypsum, melinum, myrteum, rosa, acerbum oleum,  
 uerbenarū confusa cum teneris caulibus folia: cuius generis sunt olea,  
 cupressus, myrtus, lentiscus, tamaris, ligustrum, rosa, rubus, laurus, he-  
 dera, punicum malum. Sine frigore autem reprimunt cocta mala cy-  
 donia, malicoriū, aqua calida, in qua uerbenæ coctæ sunt, quas supra  
 proposui: puluis uel ex fecē uini, uel ex myrti folijs, amaræ nuce. Ca-  
 lesfacit uero ex qualibet farina cataplasma, siue ex tritici, siue ex far-  
 ris, siue hordei, siue erui, uel lolij, uel milij, uel panici, uel lenticulæ, uel  
 fabæ, uel lupini, uel lini, uel fœni græci, ubi ea deferbuit, calidaq; im-  
 posita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quā ex  
 aqua cocta. Præterea cyprinum, irinum, medulla, adeps ex felle iun-  
 cta oleo, magisq; si uetus est: sal nigrum, gut, piper, quinq; folium, fe-  
 req; quæ uehementer Et reprimunt, Et refrigerant. Durant quæ ca-  
 lesfaunt, Et digerunt, Et emolliunt. Præcipueq; ad emolliendum po-  
 test cataplasma ex lini, uel fœni græci semine. His autem omnibus Et  
 simplicibus, Et permixtis uarie medici utuntur: ut magis quid quisq;  
 persuaferit sibi appareat: quā quid euidenter compererit.



## LIBER TERTIVS.

## De morborum generibus. Caput. I.

Ronis omnibus, quæ pertinent ad uniuersa  
 genera morborum, ad singulorū curationes ue-  
 niam. Hos autem in duas species græci diuise-  
 runt: aliosq; ex his acutos, alios longos esse di-  
 xerunt. Idq; quoniam nō semper eodem mo-  
 do respondebant: eosdem aliq; inter acutos, aliq;  
 inter longos retulerunt. Ex quo plura eorū ge-  
 nera esse manifestum est. Quidam enim breues utiq; sunt, qui cito uel  
 tollunt hominem: uel ipsi cito finiuntur. Quidam longi, sub q;bus neq;  
 sanitas in propinquo, neq; exitium est. Tertiumq; genus eorum est, qui  
 modo acuti, modo longi sunt. idq; non in febribus tantummodo, in  
 quibus frequentissimum est: sed in alijs quoq; fit. Atq; etiam præter  
 hos quartum est, quod neq; acutum dici potest, quia non perimit: neq;  
 utiq; longum, quia si occurrat, facile sanatur. Ego cum de singulis di-  
 cam: qui cuiusq; generis sit indicabo. diuidam autem omnes in eos, q;  
 in totis corporibus consistere uidentur: & eos qui oriuntur in parti-  
 bus. incipiam à prioribus pauca præfatus de omnibus. In nullo quidē  
 morbo minus fortuna sibi uendicare: quā ars potest: ut pote cum re-  
 pugnantē fortuna nihil medicina proficiat. magis tamen ignoscendū  
 medico est parum proficienti in acutis morbis, quā in longis. Hic  
 enim breue spatium est: intra quod, si quod auxilium non profuit:  
 æger extinguitur. ibi & deliberationi, & mutationi remediorū tem-  
 pus patet: adeo ut raro, si inter initia medicus accessit: obsequens æger  
 sine illius uitio pereat. Longus tamen morbus cū penitus insedit: quod  
 ad difficultatem pertinet: acuto par est. & acutus quidē quo uetustior  
 est: longus autem quo recentior: eo facilius curatur. Alterū illud ignora-  
 ri non oportet: quod non omnibus ægris eadem auxilia conueniunt.  
 ex quo incidunt, ut alia, atq; alia summi authores quasi sola uendica-  
 rint: prout cuiq; æsserant. Oportet itaq; ubi aliquid non respondit,  
 non tanti putare authorē, quanti ægrū: & experiri aliud, atq; aliud:  
 sic tamen, ut in acutis morbis cito mutetur, quod nihil prodest: in lon-  
 gis, quos tempus ut facit, sic etiam soluit: non statim condemnatur, si  
 quid non statim profuit. minus uero remoueatur, si quid paulum sal-  
 tem iuuat: quia profectus tempore expletur.



## LIBER

Quomodo morbi cognoscantur: Et an increscant, an consistant, an minuantur: Et qua ratione ab initio qui languere incipit, curari debeat, Caput. II.

Rotinus at inter initia scire facile est, quod acutus morbus, quis longus sit: non in his solis, in quibus semper ita se habet: sed in his quoque in quibus variat. Nam ubi sine intermissionibus accessiones, et dolores graues urgent: acutus morbus est. Vbi lenti dolores, lentæ uel febres sunt: et spacia inter accessiones porriguntur: acceduntque ea signa, quæ in priore uolumine exposita sunt: longum hunc futurum esse manifestum est. Videndum est est morbus an increscat, an consistat, an minuat: quia quædam remedia increscentibus morbis, plura inclinantibus conueniunt. eaque quæ decrecentibus apta sunt, ubi acutus increscens urget: in remissionibus potius experienda sunt. Increscit autem morbus dum grauioribus dolores, accessionesque ueniunt: hæcque et antequam proxime reuertitur: et postea desinunt. Atque in longis quoque morbis etiam tales notæ non habentibus, scire licet increscere: si somnus incertus est, si deterior concoctio, si foediores deiectiones, si tardior sensus, si pigrior mens, si percurrit corpus frigus, aut calor, si idem magis palleat. ea uero quæ contraria his sunt: decedentis eius notæ sunt. Præter hæc in acutis morbis serius æger alendus est: nec nisi iam inclinat, ut primo dempta materia, impetum frangat. in longis maturius, ut sustinere spatium aduenturi mali possit. Ac si quando is non in toto corpore, sed in parte est: magis tamen ad rem pertinet uim totius corporis molliri, quam proprie partes ægre sanentur. Multum etiam interest ab initio, quis recte curatus sit, an perperam. quia curatio minus his prodest: in quibus assidue frustra fuit. si quis, temere habitus adhuc integris uiribus uiuit: admota curatione momento restituitur. Sed cum ab his cæperim, quæ notas quasdam futuræ aduersæ ualitudinis exhibent: curationum quoque principium ab animaduersione eiusdem temporis faciam. Igitur si quid ex his, quæ proposita sunt incidit: omnium optima sunt quies, et abstinentia. Si quid bibendum, aqua idque interdum uno die fieri satis est. Interdum si terrentia manent, bido, proximèque abstinentiâ sumendus est cibus exiguus: bibenda aqua: postera die, etiam uinum. deinde inuicem alternis diebus, modo aqua, modo uinum, donec omnis causæ metus finiatur. Per hæc non sæpe instans grauis morbus discutitur: plurimique falluntur, dum se primo die protinus sublaturus languorē aut exercitatione, aut balneo, aut coacta deiectione, aut uomitu, aut sudationibus, aut uirgo sperant. non quo non



interdum id incidat, aut non decipiat: sed quo sepius fallat, solaq; abstinentia sine ullo periculo medeatur. cū præsertim et pro modo terro-  
ris moderari liceat, et si leuiora inditia fuerint: satis sit à uino et  
atium abstinere: quod subtractū plusquam, si cibo quid dematur: ad-  
iunat. si paulo grauiora, satis sit non aquam tantū bibere, sed etiā  
cibo carnem subtrahere. interdū panis quoq; minus, quā pro consue-  
tudine assumere: humidoq; cibo esse contentum, et olere potissimum. sa-  
tisq; sit, tum ex toto à cibo, à uino, ab omni motu corporis abstinere: cū  
uehementer notæ terruerunt. Neq; dubium est, quin uix quisquam, qui  
non dissimulauit, sed per hæc mature morbo occurrat: ægrotet.

De febrium generibus, Caput. III.

Tq; hæc quidem sanis facienda sunt tantū causam me-  
tuentibus. sequitur uero curatio febriū: quod et in toto  
corpore, et uulgarè maxime morbi genus est. Ex his una  
cotidiana, altera tertiana, altera quartana est. Interdum  
etiam longiore circuitu quædā redeunt. sed id raro euenit. In prio-  
ribus et morbi sunt, et medicinæ. At quartanæ quidē simplices  
sunt: incipiunt ferè ab horrore, deinde calor erumpit: finitaq; febre  
biduum integrum est. ita quarto die reuertitur. Tertianarū uero duo  
genera sunt: alterū eodem modo, quo quartana et incipiens, et des-  
cens, illo tantum interposito discrimine, quod unum diem præstat in-  
tegrum: tertio redit. Alterum longe perniciosius, quod tertio quidem  
die reuertitur: ex octo autem, et quadraginta horis ferè, sex, et tri-  
ginta per accessionem occupat: interdum etiā uel minus, uel plus. neq;  
ex toto in remissione desistit: sed tantum leuius est. id genus pleriq; mo-  
dici in uisitatione appellant. cotidianæ uero uariæ sunt, et multiplices.  
Aliæ enim protinus à calore incipiunt, aliæ à frigore, aliæ ab horro-  
re. Frigus uero ubi extremæ partes membrorū inalgescunt: horrorē ubi  
totū corpus intremit. Rursus aliæ sic desinunt, ut ex toto sequatur in-  
tegritas. aliæ sic, ut aliquantū quidem minuat ex febre: nihilomi-  
nus tamen quædā reliquæ remaneant, donec altera accessio accedat:  
ac sepe aliæ uix quicquā aut nihil remittant: sed ita ut continuent.  
Deinde aliæ feruorē ingentem habent, aliæ tollerabilem: aliæ cotidie  
pares fiunt, aliæ impares. atq; inuicem altero die leniores, altero ue-  
hementiores: aliæ tempore eodem postridie reuertuntur. aliæ uel se-  
rius, uel celerius: aliæ diem, noctemq; accessionem, et decessionem  
implent: aliæ minus, aliæ plus: aliæ cum decedunt sudorem mo-  
uent: aliæ non mouent. atque aliàs per sudorem ad integritatem



## LIBER

uenitur: aliis corpus tantum imbecillius redditur. Accessiones etiam modo singula singulis diebus fiunt: modo binæ, plures uel concurrunt. ex quo sæpe euenit ut cotidie plures accessiones, remissionesq; sint: sic tamen ut una quæq; alicui priori respondeat. Interdum uero accessiones quoq; confunduntur sic, ut neq; notari tempora earum, neq; spacia possint. Neq; uerum est quod dicitur à quibusdam, nullam febrem inordinatam esse, nisi aut ex uomica, aut ex inflammatione, aut ex ulcere. facilius enim semper curatio foret: si hoc uerum esset. Sed quod euidentes causæ faciunt: facere etiam abditæ possunt. neq; de re, sed de uerbo controuersiam mouent. qui cum aliter, aliterq; in eodem morbo febres accedant: non easdē inordinate redire: sed alias, aliasq; subinde oriri dicunt. quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret: etiā si uere diceretur. Tempora quoq; remissionum modo liberalia, modo uix ulla sunt.

## De curationum diuersis generibus, Caput. IIII.

T febrium quidem ratio maxime talis est. Curationum uero diuersa genera sunt: prout authores aliqui habent. Aselepiades officium esse medici dicit, ut tuto, ut celeriter, ut iocunde curet. id notum est: sed ferè periculosa esse nimium et festinatio, et uoluptas solet. qua uero moderatione utendū sit: ut quantum fieri potest, omnia ista cōtingant: prima semper habita salute in ipsis partibus curationum considerandū erit. et ante omnia quæritur, primis diebus aeger qua ratione continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis, concoctionem moliebantur: eo quod cruditatē maxime horrebant, deinde eam materiam, quæ lædere uidebatur: ducendo sæpius aluum subtrahebant. Aselepiades medicamentā sustulit: aluum non toties, sed ferè tamen in omni morbo subduxit. febre uero ipsa præcipue se ad eius remediū uti professus est. Conuellēdas enim uires agri putauit, luce, uigilia, siti ingenti, sic, ut ne os quidem primis diebus elui sineret. Quo magis fallūtur qui per omnia iocundam eius disciplinam esse contendunt: et is enim ulterioribus quodam diebus cubantis etiam luxuriæ subscripsit: primis uero tortoris uicem exhibuit. Ego autem medicamentorum dari potiones, et aluū duci non nisi raro debere concedo. et id non ideo tamen agendum, ut agri uires conuellantur existimo: quoniam ex imbecillitate summum periculum est. minui ergo tantum materiam superantem oportet, quæ naturaliter digeritur: ubi nihil noui accedit. Itaq; abstinendus à cibo primis diebus est: in luce habendus aeger, nisi infirmus interdū est. quo-



niam corpus ista quoque digerit: usque cubare quam maximo concludi debet. Quod ad sitim uero somnumque pertinet: moderandum est, ut interdiu uigilet: noctu, si potest, conquiescat. ac neque potest: neque nimium siti crucietur. Os etiam eius elui potest, ubi et siatum est, et ipsi foetet: quanuis id tempus aptum potioni non est. Commodeque Erasistratus dixit saepe inferiore parte humorem non requirente, os, et fauces requirere: neque ad rem male haberi aegrum pertinere. Ac primo quidem sic tenendus est. Optimum uero medicamentum est, opportune cibibus datus: qui quando primum dari debeat: quaeritur. Plerique ex antiquis tarde dabant: saepe quinto die, saepe sexto. Et id fortasse uel in Asia, uel in Aegypto caeli ratio patitur. Asclepiades ubi aegrum tri-duo per omnia fatigarat: quarto die cibo destitabat. At Themison uis per non quando coepisset febris: sed quando desisset, aut certe leuata esset, considerabat: et ab illo tempore expectato die tertio, si non accesserat febris, statim: si accesserat, ubi ea uel desierat: uel si assidue inhaerebat: si certe se inclinauerat, cibum dabat. Nihil autem horum utique perpetuum est. Nam potest primo die primus cibus datus esse: potest secundo: potest tertio: potest non nisi quarto: aut quinto: potest post unam accessionem: potest post duas: potest post plures. Refert enim qualis morbus sit: quale corpus: quale caelum: quae aetas: quod tempus, anni minimeque in rebus nullum inter se differetibus quod intermit-tendum non est. perpetuum esse preceptum temporis potest. In morbo, qui plus uirium aufert: celerius cibus dandus est. itemque eo caelo, quo magis digerit. Ob quam causam in Africa nullo die aeger abstinere recte uidetur. Maturius est puero, quam iuueni: aestate, quam hyeme dari debet. Unum illud est, quod semper ubique seruandum est: ut aegri uires subinde assidens medicus inspiciat: et quandiu supererunt, abstinentia pugnet: si imbecillitatem uereri coeperit, cibo subue-niat. Id enim eius officium est, ut aegrum neque supernuacua materia one-ret: neque imbecillitatem fami prodat. Idque apud Erasistratum quoque inuenio: qui quanuis parum docuit quando uenter, quando corpus ip-sum exinaniretur, dicendo tamen haec esse uisenda: et tum cibum dan-dum, cum corpori deberetur: satis ostendit dum uires superessent, dari non oportere: ne deficerent: consulendum esse. Ex his autem intelligi po-dest ab uno medico multos non posse curari: cumque, si artifex est: ido-neum esse, qui non multum ab aegro recedit, sed qui quaestui serui-unt, quoniam is maior ex populo est, libenter amplectuntur ea pre-cepta: quae sedulitatem non exigunt: ut in hac ipsa re. Facile est enim dies uel accessiones numerare his quoque, qui aegrum raro uident. ille assideat necesse est: qui, quod solum opus est, misurus est: quando nimis



imbecillus futurus sit, nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad initium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit. Est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio, quoniam antiqui potissimum impares sequebantur: eosque, tanquam tunc de ægris indicaretur, proprios uos nominabant. Hi erant dies tertius, quintus, septimus, quartusdecimus, uigesimus primus: ita ut summa potentia septimo, deinde quartodecimo, deinde uni & uigesimo daretur. Igitur sic ægros nutriebant: ut dierum imparium accessiones expectarent. deinde postea cibum quasi leuioribus accessionibus instantibus darent: adeo ut Hippocrates si alio die febris desisset: recidivam timere sit solitus. Id Asclepiades iure ut uanum repudiavit. neque in ullo die quæ par, imparue esset: his uel maius, uel minus periculum esse dixit. Interdum enim peiores dies pares fiunt: & oportunius post eorum accessiones abus datur. Nonnunquam etiam in ipso morbo dierum ratio mutatur: fitque grauior, qui remissior esse consueuerat. atque ipse quartusdecimus par est: in quo esse magnam uiam antiqui fatebantur. Qui cum octauum primi naturam habere contenderent, ut ab eo secundus septenarius numerus inciperet: ipsi sibi repugnabant non octauum, neque decimum, neque duodecimum diem sumendum, quasi potentior. Plus enim tribuebant nono, et undecimo. Quod cum fecissent sine ulla probabili ratione: ab undecimo non ad tertium decimum, sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam apud Hippocratem ei, quem septimus dies liberaturus sit: quartum esse grauissimum. Ita illo quoque authore in die pari et grauior febris esse potest: & certa futuri nota. Atque idem alio loco quartum quengue diem, ut in utrumque efficacissimum apprehendit: id est quartum, septimum, undecimum, quartumdecimum, decimum septimum, in quo & ab impari ad paris rationem transit. & ne hoc quidem propositum conseruauit, cum à septimo die undecimus non quartus sed quintus sit. adeo apparet quacunque ratione ad numerum respeximus: nihil rationis sub illo quidem authore reperiri. Verum in his quidem antiquos tunc celebres ad modum pythagorici numeri sefellerunt: cum hic quoque medicus non numerare dies debeat: sed ipsas accessiones intueri: et ex his coniectare quando dandus cibus sit. Illud autem magis ad rem pertinet scire: num oporteat dari cum iam bene uenæ conquieuerunt: aut etiam num manentibus reliquis febris. Antiqui enim quam integerrimis corporibus alimentum offerebant. Asclepiades inclinata quidem febre, sed adhuc tamen inherente. in quo unam rationem secutus est: non quo non sit interdum materius abus dandus, si mature timetur altera accessio: sed quo scilicet quam sanissimo dari debeat. Minus enim corrumpitur quod integro corpori infertur. Neque tamen uanum est



quod Themisoni uidebatur, si duabus horis integer futurus esset aeger: satius esse tunc dare: ut ab integro corpore potissimum diduceretur. Nam si diduci tam celeriter posset: id esset optimum. Sed cum hoc breue tempus non praestet: satius esse principia a bi a decedente febre, quam reliquias ab incipiente excipi. ita si longius tempus secundum est, quam integerrimo datus est: si breue, etiam antequam ex toto integer fiat. Quo loco uero integritas est, eodem est remissio: si qua maxime in febre continua potest esse. Atque hic quoque queritur utrum tot horae expectandae sint, quot febrem habuerunt: an satis sit primam partem earum praeteriri, ut aegris iocundius insidat, quibus interdum non ualet. Tutissimum est autem ante totius accessionis tempus praeterire. quamuis ubi longa febris fuit: potest indulgeri aegro maturius: dum tamen ante minime pars dimidia praetereatur. Idque non in ea sola febre, de qua proxime dictum est: sed in omnibus ita seruandum est.

De febrium speciebus, et singularum curationibus, et primo quando abus febricitantibus dandus sit. Caput. V.

Aec magis per omnia genera febrium perpetua sunt: nunc ad singulas earum species descendam. igitur si semel tantum accessit, deinde desinit: eaque uel ex inguine, uel ex lassitudine, uel ex aestu, aliaue simili re fuit sic, ut interior nulla causa metum fecerit: postero die cum tempus accessionis ita transijt, ut nihil mouerit: abus dari potest. At si ex alto calor uenit: et grauitas uel capitis, uel praecordiorum secuta est: neque apparet quid corpus confuderit, quamuis unam accessionem secuta integritas est: tamen quia tertiana timeri potest, expectandus est dies tertius: et ubi accessionis tempus praeterijt, abus dandus est, sed exiguus, quia quartana quoque timeri potest. Et die quarto demum: si corpus integrum est: eo cum fiducia utendum. Si uero postero, tertio uel, aut quarto die secuta febris est: scire licet morbum esse. Sed tertianarum, quartanarumque, quarum et certus circuitus est: et finis integer: et quia liberaliter quiescentia tempora sunt: expeditior ratio est. De quibus suo loco dicam. Nunc uero eas explicabo, quae cotidie urgent. igitur tertio quoque die abus aegro commodissime datur: ut alter febrem minuat: alter uiribus subueniat. Sed his dari debet si quotidiana febris est, quae ex toto desinat: simul atque corpus integrum factum est: si, quamuis non accessiones, febres tamen iunguntur: et cotidie quidem incrementum: sed sine integritate tamen remittunt: cum corpus ita se habet, ut maior



remissio non expectetur. Si altero die grauior: altero leuior accessio est post grauiorem. ferè uero grauiorem accessionem leuior nox sequitur. quo fit ut grauiorem accessionem nox quoq; tristior antecedit. At si continuatur febris: neq; leuior unquam fit: Et dari cibum necesse est: quando dari debeat, magna quidem dissensio est. Quidam, quia fere remissius matutinum tempus agris est: tunc putant dandū. quod si respondet, non quia mane est: sed quia remissior est aeger: dari dabet. Si uero ne tunc quidem ulla requies agris est: hoc ipso peius id tempus est: quod cum sua natura melius esse debeat: morbi initio non est. simulq; insequitur tempus meridiani: à quo cum omnis aeger ferè peior fiat: timeri potest ne ille magis etiam quàm ex consuetudine urgeatur. Igitur alij uespere tali agro cibum dant. sed cum eo tempore ferè pessimi sint, qui agrotant: uerendum est, ne si quid tunc mouerimus: fiat aliquid asperius. Ob hæc ad mediam noctem decurro: idest finito iam grauissimo tempore, eodemq; longissime distante: secuturus uero ante lucanis horis, quibus omnes ferè maxime dormiunt: deinde matutino tempore, quod natura sua leuissimum est. Si uero febres uagæ sunt: quia uerendum est: ne cibum statim subsequantur: quandoq; quis ex accessione leuatus est: hunc debet assu mere. At si plures accessiones eodem die ueniunt: considerare oportet, pares ne per omnia sint: quod uix fieri potest: an impares. Si per omnia pares sunt: post eam potius accessionem cibus dari debet: quæ non inter meridiem, et uesperum desinit. Si impares sunt: considerandum est quo distent. Nam si altera grauior, altera leuior est: post grauiorem dari debet. si altera longior, altera breuior: post longiorem. si altera grauior, altera longior est: considerandum est utra magis affligat: illa uero, an hæc tempore: et post eam dandus est. Sed plane plurimum interest: quantæ: qualesq; inter eas remissiones sint. Nā si post alteram febrem motio manet: post alteram integrum corpus est: integro corpore cibo tempus aptius est. Si semper febricula manet: sed alterum tamen longius tempus remissionis est: id potius eligendum est: adeo ut ubi accessiones continuantur, protinus inclinata priore dādus cibus sit. Et enim perpetuū est, ad quod omne cōsiliū dirigi potest: cibum quàm maxime semper ab accessione futura reducere: et hoc saluo dare quàm integerrimo corpori: quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones seruabitur. Sed cū sit aptissimū tertio quoq; die cibum dare: tamē si corpus infirmum est, cotidie dandus est: multoq; magis si continentes febres sine remissione sunt: quanto magis corpus affligunt: aut si duæ, plures uel accessiones eodē die ueniunt. Quæ res efficit, ut et à primo die protinus



die protinus cibus dari cotidie debeat. Si protinus uenæ conderunt: & sæpius eodem die, si inter plures accessiones subinde uis corpori deest. Illud tamen in his seruandū est: ut post eas febres minus cibi detur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum uero febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat, aut finiatur: scire licet optimum cibo tempus esse febre finitæ. deinde cum decessio eius consistit. tertium si necesse est, quandoque decedit, cætera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas urget, satius esse consistere iam incremento febris aliquid offerre: quàm increscente. Satius esse instante, quàm incipiente: cum eo tamen ut nullo tempore is qui deficit, non sit sustinendus. Neque hercule satis est ipsas tantum febres medicum intueri: sed etiam totius corporis habitum: & ad eum dirigere curationem, seu supersunt uires, seu desunt: seu quidā mali affectus interueniunt. Cum uero semper aegros securos agere conueniat, ut corpore tantum, non etiam animo laborent: tum præcipue ubi cibum sumpserunt. Itaque si qua sunt quæ exasperatura eorum animos sunt: optimum est eadem ægrotantium noticiæ subtrahere. si id fieri non potest: sustinere tamen post cibum usque somni tempus, & cum experrecti sunt, tunc exponere.

Quando potiones febricitantibus dari expediat. Caput. VI.

Ed de cibo facilior quidem cum aegris ratio est: quorum sepe stomachus hunc respuit: et si mens concupiscit. De potione uero ingens pugna est: eoque magis, quo maior febris est. Hæc enim sitim accendit: & tum maxime aqua exigit, cum illa periculosissima est. Sed docendus aeger est ubi febris conuenierit, protinus sitim quoque quieturam: longioremque accessione fore, si quod ei datum fuerit alimentum. ita celerius eum desinere sitire qui non bibit. Necesse est tamen quanto facilius etiam sani famem, quàm sitim sustinent: tanto magis aegris in potione, quàm in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet: nisi subito sic uenæ conderunt, ut cibus quoque dari debeat. Secundo uero, ceterisque: etiam quibus cibus non dabitur: tamen si magna sitis urgebit, potio dari potest. Ac ne illud quidē ab Heraclide Tarantino dictum ratione cæret: ubi aut bilis ægrum, aut cruditas male habet: expedire quoque per modicas potiones misceri nouam materiam corruptæ. illud uidendum est, ut qualia tempora cibo leguntur: talia potioni quoque, ubi sine illo datur, delignantur: aut cum ægrum dormire cupiemus. quod ferè sitis prohibet. Satis autem conuenit, cum omnibus febricitantibus

Aurelij Cor.

e



nimius humor alienus sit: tum præcipue esse foeminis, quæ ex partu  
 in febres inciderunt. Sed cū tempora cibo, potioni, febris et remissio-  
 nis ratio det: non est expeditissimū scire, quādo æger febricitet: quan-  
 do melior sit: quando deficiat: sine quibus dispensari illa non possunt.  
 Venis enim maxime credimus fallacissimæ rei: quia sæpe istæ lenio-  
 res, celeriores uel sunt et ætate, et sexu, et corporū natura. Et ple-  
 runq; satis sano corpore si stomachus infirmus est: nonnunquam et  
 incipiente febre subeunt, et quiescunt: ut imbecillus is uideri possit,  
 cui facile laturo grauis instat accessio. Contra sæpe eas concitat, et re-  
 soluit sol, balneum, et exercitatio, et metus, et ira, et quilibet alius  
 animi affectus: adeo ut cum primum medicus uenit, sollicitudo ægri  
 dubitantis quomodo ille se habere uideatur: eas moueat. ob quam cau-  
 sam periti medici est, non protinus ut uenit apprehendere manu bra-  
 chium. sed primum residere hilari uultu: percontariq; quemadmo-  
 dum se habeat: et si quis eius metus est, eum probabili sermone leui-  
 re. tum deinde eius corpori manum admouere. quas uenas autem  
 cōspectus medici mouet: quā facile mille res turbant. Altera res est,  
 cui credimus: calor æque fallax. nā hic quoq; excitatur aestu, labore,  
 somno, metu, sollicitudine. igitur intueri quidē omnia etiam ista opor-  
 tet. sed his non omnia credere: ac protinus quidem scire non febrici-  
 tare eum, cuius uenæ naturaliter ordinatæ sunt: teporq; talis est, qua-  
 lis esse sanis solet. Non protinus autem sub calore, motuq; febrem se se  
 concipere: sed ita si summa quoq; arida inæqualiter cutis est: si calor  
 et in fronte est: et ex imis præcordijs oritur. si spiritus ex naribus  
 cum feruore prorumpit: si color aut rubore, aut pallore nouo muta-  
 tus est: si oculi graues, et aut persici, aut subhumidi sunt: si sudor cū  
 fit, inæqualis est: si uenæ non æquis internallis mouentur. Ob quam  
 causam medicus neq; in tenebris, neq; à capite ægri debet residere: sed  
 illustri loco aduersus eum, ut omneis notis ex uultu quoq; cubantis  
 perspicat. Vbi uero febris fuit, atq; decreuit: expectari oportet num  
 tempora, partes uel corporis aliæ paulum madescant: quæ sudorē uen-  
 turum esse testentur. ac si qua nota est, tunc demum dare potui cali-  
 dam aquam: cuius salubris effectus est, si sudorē per omnia membra  
 diffundit. Huius autem rei causa continere æger sub ueste satis multæ  
 manus debet: eademq; crura, pedesq; contegere: qua male pleriq;  
 ægros in ipso impetu febris, pessimèq; ubi ardens ea est, male habent.  
 si sudare corpus coepit, linteam tepescere oportet: paulatimq; singu-  
 la membra detergere. At ubi sudor omnis finitus est: aut si is non ue-  
 nit: ubi quāmaxime potuit: idoneus esse cibo æger uidetur: sub ueste  
 leniter ungendus est: tum detergendus: deinde ei cibus dandus. Cibus



autem febricitantius humidus est aptissimus, aut humori certe q̄ pro-  
ximus: utiq; ex materia quā leuissima, maximēq; sorbitio. eaq; si  
magnæ febres fuerunt, quā tenuissima esse debet. Mel quoq; despu-  
matum huic recte adiçitur: quo corpus magis nutriatur: sed id, si sto-  
machum offendit, supernacū est: sicut ipsa quoq; sorbitio. Dari uero  
in uicem eius potest, uel intrita ex aqua calida, uel alicui elota. Si fir-  
mus est stomachus, & compressa aluus: ex aqua mulsā si uel ille lan-  
guet, uel hæc profluit, ex poscat. Et primo quidē cibo id satis est. secūdo  
uero aliquid adiçī potest: ex eodem tamen genere materie, uel olus,  
uel conchilium, uel pomum. Et dum febres quidē increscant, hic solus  
idoneus cibus est. Vbi uero aut desinunt, aut leuantur: semper quidē  
incipiendum est ab aliquo ex materia leuissima: adiçiendū uero ali-  
quid ex media, ratione habita subinde & uirium hominis, & morbi.  
Ponendi uero agro uarij cibi sicut Asclepiades præcepit: tum de-  
mum sunt, ubi fistidius urgetur: neq; satis uires sufficiunt, ut paulum ex  
singulis degustando famē uitet. At si neq; uis, neq; cupiditas deest, nul-  
la uarietate sollicitandus æger est: ne plus assumat, quā concoquat.  
Neq; uerum est, quod ab eo dicitur: facilius concoqui cibos uarios. edū-  
tur enim facilius: ad concoctionem aut materie genus, & modus per-  
tinent. Neq; inter magnos dolores, ut neq; increscente morbo tutū est,  
agrū cibo impleri: sed ubi inclinata iam in melius ualetudo est. Sunt  
aliæ quoq; observationes in febris necessariæ. atq; id quoq; uidendū  
est, quod quidam solum præcipiunt: an astrictum corpus sit: an pro-  
fluat. quorum alterum strangulat quod continet: alterum digerit.  
nam si astrictum est, ducenda aluus est: mouenda urina, eliciendus  
omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiam misisse,  
concussisse uehementibus gestationibus, corpus in lumine habuisse, im-  
perasse famem, sitim, uigiliam prodest. Vtile est etiam ducere in bal-  
neum: prius demittere in solium: tum ungere: iterum ad solium redi-  
re: multaq; aqua fouere inguina: interdum etiam oleum in solio cum  
aqua calida miscere: uti cibo rarius, & serius tenui, simplici, molli, ca-  
lido, exiguo, maximēq; oleribus, qualia sunt, lapatium, urtica, malua,  
uel iure etiam concharum, musculorum uel, aut locustarum: neq; danda  
caro nisi elixa est. At potio esse debet magis liberalis & ante cibum,  
& post hunc: & cum hoc ultra quā sitis cogit. Poteritq; à balneo et  
pinguius, aut dulcius dari uinum. poterit semel, aut bis interponi græ-  
cum salsum. Contra uero si corpus profluat, sudor coercendus: quies  
adhibenda erit tenebris: somnoq; quādoq; uolet, utendum. non  
nisi leui gestatione corpus agitandum: & pro genere mali subuenien-  
dum. Nam si uenter fluit: aut si stomachus non continet, ubi febris



decreuit, liberaliter oportet aquam tepidā potui dare, & uomere co-  
gere: nisi aut fauces, aut præcordia, aut latus dolet: aut uetus morbus  
est. Si uero sudor exercet, duranda cutis est uel nitro, uel sale: quæ cū  
oleo miscentur. At si leuius id uitium est, oleo corpus unguendum est. si  
uehementius, rosa, uel melino, uel myrteo: cui uinum austerum sit adie-  
ctum. Quisquis autem fluore æger est: cum uenit in balneum, prius  
ungendus: deinde in solium demittendus est. Si in cute uitium est: fri-  
gida quoq; quā calida aqua melius utetur. Vbi ad cibum uentum  
est: dari debet is ualens, frigidus, siccus simplex, qui quam minime  
corrumpi possit: panis tostus, atro assa, uinum asperum, uel certe subau-  
sterum: si uenter prostruit, calidum: si sudores nocent, uomitusq; sunt,  
frigidum.

Quomodo pestilentes febres curari debeant. Caput. VII.

Esiderat etiam propriam animaduersionem in febribus  
d pestilentiae casus. In hac minime utile est, aut fame, aut me-  
dicamentis uti: aut ducere aluum. Si uires sinunt, sangui-  
nem mittere optimum est: præcipueq; si cum dolore fe-  
bris est. Si id parum tutum est, ubi febris aut tenuata est, aut leuata  
est: uomitu pectus purgare. Sed in hoc maturius, quā in alijs mor-  
bis ducere in balneum opus est: uinum calidum, & meracius dare,  
& omnia glutinosa inter quæ quoq; carnem generis eiusdem. Nam  
quo celerius eiusmodi tempestates corripunt: eo maturius auxilia, etiā  
cum quadam temeritate rapienda sunt. Quod si puer est, qui labo-  
rat: neq; tantum robur eius est, ut sanguis mitti possit: siti ei utendum  
est: ducenda aluus, uel aqua, uel ptisanæ cremores: tum demum is leui-  
bus cibis nutriendus. Et ex toto non sic pueri ut uiri curari debent.  
Ergo, ut in alio quoq; genere morborum parcius in his agendum est.  
Non facile sanguinem mittere, non facile ducere aluum, non cruciare  
uigilia, fame uel, aut nimia siti, conuenit. Vomitus post febrem elicien-  
dus est: deinde dandus cibus ex lenissimis: tum is dormiat: postero  
quoq; die si febris manet, abstineatur. Tertio ad similem cibum re-  
deat. Dandaq; opera est quantum fieri potest, ut inter oportunam ab-  
stinentiam cibosq; oportunos, omisissis cæteris, nutriatur. Si uero ardens  
febris extorret: nulla medicamenti danda potio est: sed in ipsis acce-  
sionibus oleo, & aqua refrigerandus est: quæ miscenda manu sunt, do-  
nec albescant: & conclauī tenendus, quo multum, & purum aërem  
trahere possit: neq; multis uestimentis strangulandus, sed admodum le-  
uibus tantum uelandus est. Possunt etiam super stomachum imponi  
folia uitis



folia uitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia vexandus est. alendus maturius est: idest à die tertio, & ante cibū. isdē perungendus. Si pituita in stomacho coijt: inclinata iam accessione uomere cogendus est: & tunc dandum frigidum olus: aut pomum ex his, quæ stomacho conueniunt. Si siccus manet stomachus, protinus uel prisa-næ, uel alicæ, uel orizæ cremor dandus est: cū quo recens adeps cocta sit. Cum uero in summo incremento morbus est: utiq; non ante diem quartum magna siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat et ultra satietatem: & cū iam uenter, & præcordia ultra modū repleta, satisq; refrigerata sunt: uomere debet. Quidā ne uomitū qdem exigunt: sed ipsa aqua frigida, tantū ad satietatem data, pro medicamento utuntur. Vbi utrumlibet factum est: multa ueste operiendus est: & collocandus ut dormiat. Ferēq; post longam sitim, & uigiliā, post multam satietatem, post infractum calorē, plenus somnus uenit, per quem ingens sudor effunditur: idq; præsentissimum auxilium est. Sed in his tamen, in quibus præter ardorem nulli dolores, nullus præcordiorum tumor, nihil prohibēs uel in thorace, uel in pulmone, uel in faucibus, non ulcus, non deiectio, non profluvium alui fuit. Si quis autem in eiusmodi febre leuiter tussit, is neq; uehementi siti conflictatur: neq; bibere aquam frigidam debet: sed eo modo curandus est quo in cæteris febribus præcipitur.

Curatio semitertianæ febris quæ hemitritæos dicitur. Caput. VIII.

T ubi id genus tertianæ est, quod ἡμῆρι τριταῖος media appellant: magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerunq; frequentiores accessiones, decessionesq; ut aliud morbi genus uideri possit: porrigitq; febris inter horas uiginti quatuor et triginta sex, ut quod idem est: non idem esse uideatur. Et magnopere necessarium est, neq; dari cibum, nisi in ea remissione, quæ uera est: & ubi ea uenit, protinus dari: plurimiq; sub altero tro curantis errore subito moriuntur. ac nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet: tum dari cibum, qui neq; incitet febrem: & tamen longum eius spatium sustineat.

Curatio lentarum febrium. Caput. IX.

Nonnunquam etiam lentæ febres sine ulla remissione corpus tenent: ac neq; cibo, neq; ulli remedio locus est. In hoc casu medicata cura esse debet, ut morbū mutet. Fortasse enim curationi

Aurelij Cor.

e iij



## LIBER

oportunior fiet. Sæpe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adiectum, corpus eius per tractandum est. quoniam interdum sic euenit, ut horror oriatur: et fiat initium quoddam noui motus: exq; eo cum magis corpus intaluit: sequatur et remissio. In his frictio quoq; ex oleo, et sale salubris uidetur. at si diu frigus est et torpor, et iactatio corporis, non alienum est in ipsa febre dare mulsi tres, aut quatuor cyathos: uel cum cibo uinum bene dilutum. Intenditur enim sæpe ex eo febris, et maior ortus calor, simul et priora mala tolli: et spem remissionis in ea curatione ostendit. Neq; hercule ista curatio noua est: qua nunc quidam traditos sibi ægros, qui sub cautiore medicis traherantur: interdum contrarijs remedijs sanant. si quidem apud antiquos quoq; ante Erophilum, et Erasistratum, maximeq; post Hippocratem fuit Petro quidam qui febricitantem hominem ubi acceperat, multis uestimentis operiebat: ut simul calorem ingentem, sitimq; excitaret. Deinde ubi paulum remitti coeperat febris, aquam frigidam potui dabat: ac si mouerat sudorem, explicuisse se ægrum iudicabat. si non mouerat, plus etiam aquæ frigidae ingererebat: et tum uomere cogebat. Si alterutro modo febre liberauerat: protinus suillam assam, et uinum homini dabat. Si non liberauerat: decoquebat aquam sale adiecto, eamq; bibere cogebat, ut mouendo uentrem purgaret. et intra hæc omnis eius medicina erat. eaq; non minus grata fuit his: quos Hippocratis successores non refecerant: quam nunc est his, quos Erophi, uel Erasistrati æmuli diu tractos non expedierunt. Neq; ideo tamen non est temeraria ista medicina: quia plures, si protinus a principijs exæpit: intererunt. Sed cum eadē omnibus conuenire non possint: ferè quos ratio nõ restituit: temeritas adiunat. Ideoq; eiusmodi medicameliu alienos ægros, quam suos nutriunt. Sed est circumspecti quoq; hominis et nouare interdum: et augere morbum: et febres accendere: quæ curatione, ubi id quod est, nõ recipit: potest recipere id, quod futurum est.

Remedia in febribus ad capitis dolorem, et præcordiorum inflammationem, et ariditatem, et scabritiem lingue. Caput. X.

Considerandum etiam est. febres ne solæ sint: an alia his quoq; mala accedant. id est num caput doleat: num lingua aspera: num præcordia intumescant. Si capitis dolores sunt, rosam cum aceto miscere oportet, et in id ingerere: deinde habere duo pittacia, quæ latitudinē frontis, longitudinēq; æquēt. Ex his inuicem alterum in aceto et rosa habere, alterum in fronte: aut intinctam hisdem lanam succidam imponere. Si acetum offendit, pura



rosa utendum est. Si rosa ipsa lædit, oleo acerbato. si ista parum inuant: teri pōt uel iris arida, uel nuxes amarae, uel qualibet herba ex refrigerantibus. Quorū quidlibet ex aceto impositum dolorē minuit: sed magis aliud in alio. Iuuat et panis cum papauere iniectus, uel cum rosa, cerussa, spuma uel argenti. Olfacere quoq; uel serpillum, uel anethum non alienum est. At si in præcordiis inflammatio, et dolor est: primo super imponenda sunt cataplasmata reprimentia, ne si calidiora fuerint: plus eō materiae concurrat. Deinde ubi prima inflammatio se remisit: tunc demum ad calida, et humida ueniendū est: ut ea quæ remanserint, discutiant. Notæ uero inflammationis sunt quatuor: rubor, et tumor cum calore, et dolore. Quo magis errauit Erasistratus, qui febrem nullam sine hac esse dixit. Ergo si sine inflammatione dolor est: nihil imponendum est. Hunc enim statim ipsa febris soluit. At si neq; inflammatio, neq; febris, sed tantum præcordiorum dolor est: protinus calidis, et sicis fomentis uti licet. Si uero lingua siccata est, et scabra: detergenda primum penicillo est ex aqua calida: deinde ungenda mixtis inter se rosa, et melle. Mel purgat: rosa reprimi: simulq; siccācere non sinit. At si scabra non est, sed arida, ubi penicillo deterisa est: ungi rosa debet: cui ceræ sit paulum adiectum.

Remedia contra frigus, quod febrem præcedit. Caput. XI.

Olet et ante febres esse frigus, idq; uel molestissimū morbi genus est. Vbi id expectatur, omni potione prohibendus æger est. hæc enim paulo ante data multum malū adiicit. Item maturius ueste multa tegendus est. admonenda partibus his, pro quibus metuimus, siccata et calida fomenta, sic, ne statim uehementissimi calores incipiant: sed paulatim accrescant. Perfricandæ quoq; eæ partes manibus unctis ex uetere oleo sunt: eiq; adiiciendum aliquid ex calefacientibus. Contentiq; medici quidam una frictione et ex quolibet oleo sunt. In harū febriū remissionibus nonnulli tres, aut quatuor sorbitionis cyathos etiam num ultra manente febre dant: deinde ea bene finita reficiunt stomachum cibo frigido, et leni. Ego tum hoc puto tentandum, cum parū cibis semel et post febrem datus prodest. sed curiose perspiciendū est, ne tempus remissionis decipiat. Sæpe enim in hoc quoq; genere ualetudinis iam minui febris uidetur: et rursus intenditur. itaq; ei remissioni credendum est: quæ etiam immoratur: et iactationem, factoremq; quendam oris, quem oleræ græci uocant, minuit. Illud satis conuenit, si cotidie pares accessiones sunt: cotidie paruum cibum dandum. si impares, post grauiorem cibum: post leniorem, aquam mulsam.



ORROR autem eas fere febres antecedit: quæ certū habent  
 h circuitum, & ex toto remittuntur. Ideoq; tutissimæ sunt,  
 maximeq; curationes admittunt. Nam ubi incerta tem-  
 pora sunt: neq; alui ductio, neq; balneum, neq; vinum, neq;  
 medicamentum aliud recte datur. incertū est enim quando febris ven-  
 turæ sit: ita fieri potest, ut si subito venerit, summa in eo pernicies  
 sit: quod auxilij causa sit inuentū. Nihilq; aliud fieri pot, quam ut pri-  
 mis diebus bene abstineatur æger. deinde sub decessu febris eius, quæ  
 grauissima est: cibūumat. at ubi certus circuitus est: facilius oīa illa  
 tentantur: quia facilius proponere nobis et accessiōnū, & decessiōnū vi-  
 ces possumus. In his autem cum ueterauerunt: utilis famis non est. Pri-  
 mis tantummodo diebus ea pugnandum est: deinde diuidenda cura-  
 tio est: & ante horror, tum febris discutienda. Igitur cum primum  
 aliquis inhorruit, & ex horrore incaluit: dare ei oportet potui tepi-  
 dam aquam subsalsam, & uomere eum cogere. nam fere talis horror  
 ab his oritur, quæ biliosa in stomacho resederunt: idem faciendū est,  
 si proximo quoq; circuitu æque cessit: sæpe enim sic discutitur. iamq;  
 quod genus febris sit, scire licet: itaq; sub expectatione proxime ac-  
 cessiōis, quæ instare tertia potest: deducendus in balneum est: dādāq;  
 opera est, ut per tempus horroꝝ in solio sit. si ibi quoq; senserit: ni-  
 hilominus idem sub expectatione accessiōis quartæ faciat. si quidem  
 eo quoq; modo sæpe id discutitur. si nec balneū quidem profuit: ante  
 accessiōem allium edat: aut bibat calidā aquam cum pipere: si qui-  
 dem ea quoq; assumpta calorem mouent, qui horrorem nō admittit.  
 Deinde eo modo quo in frigore præceptū est: anteq̃ inhorrescere pos-  
 sit, opiatur. Fomentisq; protinus validioribus totum corpus circunda-  
 re conuenit, maximeq; inuolutis extinctis testis, & titiōibus. Si nihilo-  
 minus horror pertruxerit, multo oleo calefacto inter ipsa uestimenta  
 perfundatur: cui æque ex calefacientibus aliquid sit adiectum. adhi-  
 beaturq; frictio quantam is sustinere poterit, maximeq; in manibus,  
 & pedibus: & spiritum ipse contineat. neq; desistendum est etiam si  
 horror est. Sæpe enim pertinacia iuuantis malum corporis uincit. Si  
 quid euomuit, danda aqua tepida: iterumq; uomere cogendus est: uten-  
 dumq; eisdē est, donec horror finiatur. Sed præter hæc, ducenda aliū  
 est, si tardius horror quiescit: si quidem id quoq; exonerato corpori  
 prodest. Vltima quoq; post hæc auxilia sunt gestatio, & frictio. Cibus  
 autem in eiusmodi morbo maxime dandus est: qui mollem alui præ-  
 stet. Caro glutinosa, vinum cum dabitur, austerum.

Curatio



## Curatio cotidiane febris. Caput. XIII.

**H**æc ad omnes circuitus febrium pertinent. discernendæ tñ singulæ sunt: sicut ratione habent dissimilem. si cotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet: tum cibis altero quoque die uti. Si res inueterauerit, post febrem experiri balneum, et uinum, magisque si horrore sublato hæc superest.

## Curatio tertianæ febris. Caput. XIII.

**I** tertiana uero, quæ ex toto intermittit, aut quartana est: medijs diebus et ambulationibus uti oportet, alijsque exercitationibus, et unctionibus. quidam ex antiquioribus medicis Cleophrantus in hoc genere morborum multo ante accessionem caput ægri multa calida aqua perfundebat: deinde uinum dabat. quod quauis plerique eius uiri præcepta secutus est Asclepiades, recte tamen præterijt. Est enim anceps ipse, si tertiana febris est: tertio die post accessionem dicit aluum duci oportere. quinto post horrorem uomitum elicere. deinde post febrem, sicuti illi mos erat, adhuc calidis dare cibum, et uinum. sexto die in lectulo detineri. sic enim fore ne septimo die febris accedat. Id sæpe fieri posse uerisimile est. Tutius tamen est, ut hoc ipso ordine utamur tria remedia, uomitus, alui ductionis, uini potus per triduum: id est die tertio, et quinto, et septimo tentare. nec uinum nisi post accessionem die septimo bibat. Si uero primis diebus discussus morbus non est: incidi quoque in uetustatem, quo die febris expectabitur: in lectulo se contineat: post febrem perfricetur: tum cibo assumpto bibat aquam. postero die, quo cibo uacat, et ab exercitatione, unctioneque aqua tantum contentus conquiescat. Et id quidem optimum est. Si uero imbecillitas urgebit: et post febrem uinum, et medio die paulum cibi debebit assumere.

## Curatio quartanæ febris. Caput. XV.

**A**d eam in quartana facienda sunt. sed cum hæc tarde ad modum finiatur, nisi primis diebus discussa est: diligentius ab initio præcipiendum est, quid in ea debeat fieri. Igitur si cui cum horrore febris accessit, eaque desijt: eodem die, et postero, tertioque continere se debet: et aquam tantummodo calidam primo die post febrem sumere: biduo proximo quantum fieri poterit hanc quidem. si quarto die cum horrore febris reuertitur, uomere



sicut ante præceptum est: deinde post febrem modicū cibum sumere, vini quadrantem. Postero, tertioq; die abstinere: aqua tantummodo calida, si sitiet, assumpta: septimo die balneo frigus præuenire: abstinere, continere se debet: & aqua tantummodo calida si sitiet: ac tum ita nono die balneo frigus præuenire: si febris redierit, ducere aluum. ubi ex eo corpus conquieuerit, in unctione uehementer perfricari: eodem modo sumere cibum & uinum: biduo proximo se abstinere frictione seruata. decimo die rursus balneum experiri: & si postea febris accessit, æque perfricari. uinum copiosius bibere. ac si proximum est. quies tot dierum, ut abstinentia cum ceteris quæ præcipiuntur, febrem tollant. Si uero nihilominus remanet: aliud ex toto sequendum est curationis genus: idq; agendum, ut quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quo minus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet: qui primis diebus ducendā aluum: deinde abstinendū usq; in septimum diem dixit. Quod ut sustinere aliquis possit: tamen etiā febre liberatus, uix refectiōi ualebit. adeo si febris sæpius accesserit: concidet. Igitur si tertio decimo die morbus remanebit: balneum neq; ante febrem, neq; post eam tentandum erit: nisi interdū iam horrore discusso. Horror ipse per eadē quæ supra præscripta sunt expugnandus. Deinde post febrem oportebit ungi: & uehementer perfricari: cibum & ualidum, & fortiter assumere. uino uti quantum libebit. postero die cum satis quieuerit, ambulare, exercei, ungi, perfricari fortiter: cibum accipere sine uino: tertio die abstinere. quo die uero febrem expectabit: ante surgere, & exerceri, dareq; operam non oportet, ut in ipsam exercitationē tempus febris incurrat. sic. n. sepe illa discutitur. At si in opere occupauit: tum denuum se recipere. In eiusmodi ualitudine medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibus, uinum. Si uenter astrictus est, soluendus est. sed hæc facile ualidiores faciunt. si imbecillitas occupauit: pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem sustinet: adhibenda tamen frictio est. si hæc quoq; uehemens onerat: intra quietem, & unctionem, & cibum sistendū est: dandaq; opera est, ne qua cruditas in cotidianam id malum uertat. Nam quartana neminem ingulat. sed si ex ea facta cotidiana est: in malis aeger est. Quod tamen nisi culpa uel ægri, uel curantis nunquam fit.

Curatio duarum quartanarum. Caput. XVI.

Si si duæ quartanæ sint: neq; hæ, quas proposui, exercitationes adhiberi possunt: aut ex toto quiescere opus est: aut si id difficile est, leniter ambulare: considerare diligenter inno-



litis pedibus, & capite. Quoties febris accessit, & desit, cibum modi-  
cum sumere, & vinum in reliquo tempore nisi imbecillitas urget: absti-  
nere. Aut si duæ febres penè iunguntur, post utraq; cibum sumere. de-  
inde uacuo tempore & moveri aliquid, & post unctionem cibo uti.  
Cum uero uetus quartana raro, nisi uere soluat: utiq; eo tempore  
attendendum est ne quid fiat, quod ualitudinem impediat. Prodestq;  
in uetere quartana mutare subinde uictus genus: à uino ad aquam: ab  
aqua ad uinum: à lenibus cibis ad acres: ab acribus ad lenes transi-  
re: esse radicem: deinde uomere: iure uel pulli gallinacei uentrem resol-  
uere: oleum ad frictiones: adijcere: calefacientia ante accessionem sorbe-  
re, uel acetum cyathos duos, uel unum sinapis cum tribus græci uini salis,  
uel mixta paribus portionibus, & in aqua diluta, piper, castoreum, la-  
ser, myrram. per hæc enim similiaq; corpus agendum est, ut mouea-  
tur ex eo statu quo detinetur. Si febris quiescit, diu meminisse eius diei  
cōuenit: eoque uitare frigus, calorem, cruditatē, lassitudinē. Facile enim  
reuertitur: nisi à sano quoq; aliquandiu timeatur.

Curatio cotidiane febris, quæ ex quartana facta sit. Caput. XVII.

T si ex quartana cotidiana facta est: cum id uicio incide-  
rit, per biduum abstinere oportet. frictione uti: aquam tan-  
tummodo uesperis potui dare. tertio die sæpe fit ne febris  
accedat. sed siue fuit, siue non fuit, cibus post accessionis  
tempus est dandus. at si manet: per biduum abstinentia, quanta ma-  
xime imperari corpori potest: frictione cotidie utendum est.

De tribus insanie generibus: & primo de eius curatione, quæ à græ-  
cis phrenitis dicitur. Caput. XVIII.

T februm quidem ratio exposita est. supersunt uero aliq;  
corporis affectus: qui huic superueniunt. ex quibus eos,  
qui certis partibus assignari non possunt: protinus iun-  
gam. Incipiam ab insania: primamq; huius ipsius partē  
agrediar: quæ et acuta, et in febre est: græci *ῥέβρις* appellant. Illud  
ante omnia scire oportet, interdum in accessione ægros desipere: et loqui  
aliena. Quod nō quidē leue est: neq; incidere potest, nisi in febre ue-  
hementi: non tamen æque pestiferum est. Nam plerumq; breue esse  
consuevit: leuatoq; accessionis impetu protinus mens redit. Neq; id ge-  
nus morbi remedium aliud desiderat: quàm quod in curanda febre  
præceptum est. Phrenitis uero tum demum est: cum continua demētia  
esse incipit: aut cum æger quamuis adhuc sapiat: tamen quasdā na-



## LIBER

nas imagines accipit. perfecta est ubi mens illis imaginibus addicta est. Eius autem plura genera sunt: si quidem ex phreniticis alij hilares, alij tristes sunt: alij facilius continentur, et intra uerba desipiunt. alij consurgunt, & uiolenter quaedam manu faciunt. atq; ex his ipsis alij nihil nisi impetu peccant: alij etiam artes adhibent: summamq; spem sanitatis in captandis maiorum operum occasionibus praebent: sed exitu deprehenduntur. Ex his autem eos qui intra uerba desipiunt, aut leniter etiam manu peccant: onerare asperioribus coercionibus supernacuum est. Eos uero qui uiolentius se gerunt, uincire. o uenit: ne uel alteri, uel sibi noceant. Neq; credendum est si uinctus aliquis dum leuari uinculis cupit: sanum iam se fingat, quamuis prudenter & miserabiliter loquatur: quoniam is dolus insaniens est. Fere uero antiqui tales aegros in tenebris habebant: eo quod eis contrarium esse exterreri: & ad quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid iudicabant. At Asclepiades tanquam tenebris ipsis terrentibus in lumine habendos esse dixit neutrum tamen perpetuum est: alium enim lux, alium tenebrae magis turbant. reperiunturq; in quibus nullum discrimen deprehendi uel hoc, uel illo modo possit. Optimum itaq; est utrumq; experiri: & habere eum, qui tenebras horret, in luce: eum q; lucem, in tenebris. At ubi nullum tale discrimen est, aeger si uires habet, loco lucido: si non habet, obscuro continendus est. Remedia uero adhibere ubi maxime furor urget, supernacuum est. simul enim febris quoq; increscit. itaq; tu nihil nisi continendus aeger est. Vbi uero res patitur, festinanter subueniendum est. Asclepiades perinde esse dixit his sanguinem mitti, ac si trucidentur: rationem hanc secutus, quod neq; insania esset, nisi febre intenta: neq; sanguis nisi in remissione eius recte mitteretur. Sed ipse in his somnum multa frictione quaesivit, cum & intentio febris somnum impediat: & frictio non nisi in remissione eius utilis sit. Itaq; hoc quoq; auxilium debuit praeterire. Quid igitur est? Multa in praecipiti periculo recte fiunt alias omittenda. & continuata quoq; febris habet tempora: quibus & si non remittit, non tamen crescit. Estq; hoc ut non optimum, sic tamen secundum remedij tempus. Quod si uires aegri patiuntur, sanguis quoq; mitti debet. Nec minus deliberari potest an alius ducenda sit. tum interposito die conuenit caput ad cutem tondere: deinde aqua fouere. in aqua uerbena aliqua decocta sint, uel ex reprimuntibus: aut prius fouere: deinde tondere: & iterum fouere: ac nouissime rosa caput, naresq; implere: offerre etiam naribus rutam ex aceto contritam: mouere sternutamenta medicamentis in id efficacibus. Quae tamen facienda sunt in his, quibus uires non desunt. Si uero imbecillitas est,



rosa tantum caput adiecto serpillo, similiq; aliquo madefaciendū est. Vtiles etiam in quibuscunq; viribus herbae duae sunt, solanum, & muralis: simul ex utraq; succo expresso caput impleatur. cum se febris remiserit, frictione utendum est. partius tamen in his qui nimis hilares, quam in his qui nimis tristes sunt. Aduersus omnium aut sic insanientium animos, gerere se pro cuiusq; natura necessarium est. Quorundam enim uani metus leuandi sunt: sicut in homine praediuite fame timente incidit: cui subinde falsae hereditates nunciabatur. Quorundam autem adacia coercenda est: sicut in his fit, in quibus continēdis plagae quoq; adhibentur. Quorundam etiā intempestuus risus & obiurgatione, & minis prohibendus est. Quorundam discutiendae tristes cogitationes: ad quod symphoniae, & cymbala, strepitusq; proficiunt. saepius tamen assentiendum, quam repugnandū est. paulatimq; & non euidenter ab his, quae stulte dicuntur, ad meliora mens eius abducenda est. Interdum etiā elicienda ipsius intentio, ut fit in hominibus studiosis literarum quibus liber legitur: aut recte si delectantur: aut perperam, si id ipsum eos offendit. emendando enim conuertere animum incipiunt. Quin etiam recitare si qua meminerunt cogendi sunt. Ad cibum quoq; quosdam non desiderantes reduxerunt hi, qui inter epulantes eos collocauerunt. Omnibus uero sic affectis somnus & difficilis, & praecipue necessarius est. sub hoc enim pleriq; sanescunt. Prodest ad id, atq; etiam ad mentem ipsam componendam crocinum uinguentum cum irino in caput datum. si nihilominus uigilant hi, quidam somnum moluntur potui dando aquam, in qua papauer, aut uoskuos decocta sit: alij mandragorae mala puluino subiiciunt: alij uel amomum, uel sicamini lachrymam fronti inducunt. hoc nomen apud medicos reperio. Sed cum graeci morū σινάμυον appellant: mori nulla lacrima est. sic uero significatur lachryma arboris in Aegypto nascētis: quā ibi μωπόσυνον appellat. plurimi decoctis papaueris corticibus, ex ea aqua subinde spongia os, & caput fouent. Asclepiades ea superuacua esse dixit, quoniam in Leithargum saepe cōpellerent. Praecipit aut ut primo die a cibo, potione, somno abstinere: uespere ei daretur potui aqua: tunc frictio admoneretur lenis, ita ut ne manum quidem qui fricaret, uehementer imprimeret. postero deinde die hisde omnibus factis, uespere ei daretur sorbitio, et aqua: rursusq; frictio adhiberetur. Per hanc enim nos consecuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, & quidem adeo, ut illo confitente nimis a frictio etiam leithargi periculum afferat. Sed si sic somnus non accessit, tum demum illis medicamentis accersendus est, habita scilicet eadem moderatione, quae hic quoq; necessaria est: ne quem obdormire uolumus:



excitare postea non possimus. Confert etiam aliquid ad somnum sila-  
 nus iuxta cadens: uel gestatio post cibum & noctu, maximeq; suspen-  
 si lecti motus. Neque alienum est, si neque sanguis ante missus est:  
 neque mens constat: neque somnus accedit: occipitio inciso cucurbitu-  
 lam admoerere. quæ quia leuat morbum, potest etiam somnum fa-  
 cere. Moderatio autem in cibo quoq; adhibenda est. Nam neq; imple-  
 nus aeger est, ne insaniat. neq; ieiunio utiq; uexandus est, ne imbecilli-  
 tate in cardiacum incidat. Opus est autem cibo infirmo, maximeq;  
 sorbitione, potionem aquæ mulse: cuius ternos cyathos bis hyeme: quater  
 æstate dedisse satis est. Alterum genus insanie est: quod spatium lon-  
 gius recipit: quia ferè sine febre incipit: leues deinde febriculas exci-  
 tat: & consistit in tristitia, quam uidetur bilis atra contrahere. in hac  
 utilis detractio sanguinis est. Si quid hanc prohibet, prima est absti-  
 nentia: secunda per album uer atrum, uomitumq; purgatio. post utrū-  
 libet adhibenda bis die frictio est. si magis ualet, frequens etiā exer-  
 citatio. In ieiunio uomitus: cibus sine uino dandus ex media materia  
 est. Quam quotiens posuero, scire licet etiam ex infirmissima dari  
 posse: dum ne ea sola quis utatur: ualentissima tantummodo esse remo-  
 uenda. præter hæc seruanda aliud est quàm tenerrima. remouendi  
 terrores, & potius bona spes afferenda. quærenda delectatio ex fabu-  
 lis, ludisq; quibus maxime capi sanus assueuerat. Laudanda si qua  
 sunt ipsius opera: & ante oculos eius ponenda. Leuiter obiurganda  
 uana tristitia. subinde admonendus in his ipsis rebus, quæ solatiunt:  
 cur non potius letitia, q̃ solitudinis causa sit. Si febris quoq; accessit,  
 sicut aliæ febres curanda est. Tertium insanie genus est ex his lon-  
 gissimum, adeo ut uitam ipsam non impediat: quod robusti corporis  
 esse consuevit. huius autem ipsius species duæ sunt. Nam quidam ima-  
 ginibus, non mente falluntur: qualem insanientem Aiace, uel Ore-  
 stem poetarum fabulæ ferunt. quidam animo desipiunt. Si imagines  
 fallunt: ante omnia uidendum est, tristes, an hilares sint. In tristitia ni-  
 grum uer atrum deiectionis causa: in hilaritate album ad uomitum  
 excitandum dari debet. idq; si in potionem non accipit: pani adijcen-  
 dum est, quo facilius fallat. nam si bene se purgauerit: ex magna par-  
 te morbum leuabit. Ergo etiam si semel datum uer atrum parum pro-  
 fecerit: interposito tempore iterum dari debet. Neq; ignorare oportet, le-  
 uiorem esse morbum cum risu, quàm serio insanientium. Illud quoq;  
 perpetuum est in omnibus morbis: ubi ab inferiore parte purgandus  
 aliquis est, uentrem eius ante soluendum esse: ubi à superiore, compri-  
 mendum. Si uero consilium insanientem fallit: tormentis quibusdam  
 optime curatur. Vbi perperam aliquid dixit, aut fecit, fame, uinctu-



lis, plagis coercendus est. Cogendus est et attendere, et ediscere aliquid, et meminisse. sic enim fiet ut paulatim metu cogatur considerare quid faciat. subito etiam terreri, et expauescere in hoc morbo prodest. Et ferè quicquid animum uehementèr perturbat. Potest enim quædam fieri mutatio: cum ab eo statu mens in quo fuerat, abducta est. Interest etiam si ipse sine causa subinde rideat: an mestus, demissusq; sit. nam demens hilaritas terroribus his, de quibus supra dixi: melius curatur. si nimia tristitia est: prodest lenis, sed multa bis die frictio. Itè per caput aqua frigida infusa: demissumq; corpus in aqua, et oleum. Illa communia sunt, insanientes uehementèr exerceri debere: multa frictione uti: neq; pinguem carnè, neq; uinum assumere: abis uti post purgationem ex leui materia quàm leuissimis. non oportere esse uel solos, uel inter ignotos, uel inter eos quos aut contemnunt: aut negligant. mutare debere regiones: et si mens redit, annua peregrinatione esse iactandos. Raro, sed aliquando tamen ex metu delirium nascitur. Quod genus insanientium specie, similiq; uictus genere curandum est: præterquam quod in hoc insanie genere solo recte uinum datur.

Cardiaci morbi curatio. Caput. XIX.

hic morbo præcipue contrarium est id genus, quod *ναρμανία* à grecis nominatur: quæ sæpe ad eum phrenitici transeunt. Si quidem mens in illis labat: in hoc constat. Id autem nihil aliud est, quàm nimia imbecillitas corporis: quod stomacho languente immo dia sudore digeritur. Licetq; protinus scire id esse, ubi uenarum exigui, imbecilliq; pulsus sunt. Sudor autem supra cōsuetudinem et modo, et tempore ex toto thorace, et ceruicibus, atq; etiam capite prorūpit: pedibus tantummodo et cruribus siccioribus, atq; frigentibus. At ubi id morbi genus est: curatio prima ē, supra præcordia imponere quæ reprimant cataplasmata. secunda, sudorē prohibere. id præstat acerbum oleū, uel rosa, uel melinū, aut myrteū. quorū aliquo corpus leuiter perungendū: ceratūq; ex aliquo horum tum imponendum est. Si sudor uinat, delinendus homo est uel gypso, uel argenti spuma, uel cimolia creta: uel etiam subinde horum puluere respergendus. Idem præstat puluis ex contritis aridi myrti, uel rubi folijs: aut ex austeri, et boni uini arida fece. Pluraq; similia sunt: quæ si desunt, satis utilis est quilibet ex uia puluis iniectus. Sup hæc uero quo minus corpus insudet: leui ueste debet esse cōtectus, loco nō calido, fenestris patentibus



sic, ut per flatus quoque aliquis accedat. Tertium auxilium est imbecillitati iacentis uino, ciboque succurrere. Cibus non multus quidem, sed saepe tamen nocte, ac die dandus est, ut nutriat: neque oneret. is esse debet ex infirmissima materia: et stomacho aptus. nisi autem necesse est, ad uinum festinare non oportet. si uerendum est ne deficiat, tum et in trita ex hoc, et hoc ipsum austerum quidem, sed tamen tenue miraculum. Egelidum subinde et liberaliter dandum est adiecta polenta: si modo is aeger parum cibi assumit. idque uinum esse debet neque nullarum uirium, neque ingentium: recteque tota die, ac nocte uel treis heminas aeger bibet. si uastius corpus est: plus etiam. Si cibum non accipit, perunctum ante perfundere aqua frigida conuenit: et tum dare. Quod si stomachus resolutus parum continet, et ante cibum, et post eum: sponte uomere oportet: rursumque post uomitum cibum sumere. si ne id quidem manserit, sorbere uini cyathum: interpositaque hora sumere alterum. si id quoque stomachus reddiderit: totum corpus bulbis contritis super illinendum est. qui ubi inaruerunt, efficiunt, ut uinum in stomacho contineatur: ex quo totum corpori calor, uenisque uis redeat. Vltimum auxilium est, in aluum ptisanæ, uel alicæ cremorem ex inferioribus partibus iniicere, si quidem id quoque uires tuetur. Neque alienum est naribus quoque estuantis admonere quod reficiat: id est rosam, et uinum. Et si qua in extremis partibus frigent: unctis, et calidis manibus fouere. per quæ si consequi potuimus, ut et sudoris impetus minuiatur: et uita prorogetur: incipit iam tempus ipsum esse præsidio. Vbi in tuto esse uidetur: uerendum est tamen ne ad eandem imbecillitatem cito recadat. Itaque uino tantum remoto, cotidie ualidiorum cibum debet assumere: donec satis uirium corpori redeat.

## De lethargo, et eius curatione. Caput. XX.

Alter quoque morbus est aliter phrenitico contrarius. In illo difficilis somnus, prompta ad omnem audaciam mens est. At in hoc marcor et inexpugnabilis penè dormiendi necessitas, auctorum prope greci nominant. atque id quoque genus acutum est: et nisi succurratur, celeriter ingulat. Hos agros quidam subinde excitare nituntur admotis his, quæ per sternutamenta euocantur: et his, quæ odore foedo mouent, qualis est pix cruda, lana succida, piper, ueratrum, castoreum, acetum, allium, cepa, iuxta etiam galbanum incendunt, aut pilos, aut cornu ceruinum. si id non est, quodlibet aliud. Hæc enim cum comburuntur, odorem foedum mouent. Tharriarum uero quidam accessione esse id malum dixit: leuarique cum ea decessit. Itaque



cessit. Itaq; eos qui subinde excitant, sine usu male habere. Interest aut in decessione expergisatur aeger: an cum febris non leuetur: aut leuata quoq; ea somnus urgeat. Nam si expergisatur, adhibere ei ut sopito superuacuum est. neq; enim uigilando melior fit: sed per se, si melior est: uigilat. Si uero continens ei somnus est: utiq; excitandus est. sed his temporibus quibus febris leuissima est, ut et excernat aliquid, et sumat. Excitat aut ualidissime repente aqua frigida infusa post remissionem. Itaq; perunctum oleo multo corpus tribus, aut quatuor amphoris totum per caput perfundendum est. Sed hoc utemur, si equalis aegro spiritus erit: si mollia praecordia. Sin aliter haec erunt: ea potiora, quae supra comprehensa sunt. Et quod ad somnum quidem pertinet, commodissima haec ratio est. Medendi autem causa caput radendum: deinde postea fouendum est aqua: in qua laurus, aut ruta decocta sit. Altero die imponendum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, aut lauri baccae, aut hederæ cum rosa, et aceto. Praecipueq; proficit, et ad excitandum hominem naribus admotum, et ad morbum ipsum depellendum capiti, fronti uel impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest, maximeq; oportune cibis datus: id est in remissione quanta maxima inueniri poterit: aptissima autem sorbitio est, donec morbus decrescere incipiat: sic ut si cotidie grauis accessio est: haec cotidie detur. Si alternis, post grauiorem, sorbitio: post leuiorem, mulsæ aqua. Vinum quoq; cum tempestuo cibo datum, non mediocriter adiuuat. quod si post longas febres eiusmodi torpor corpori accessit: cetera eadem seruanda sunt. Ante accessionem aut tribus, quatuor uel horis castoreum, si uenter astrictus est: mixtum cum samonea: si non est, per se ipsum cum aqua dandum est. Si praecordia mollia sunt, cibis utendum est plenioribus. Si dura, in hisdem sorbitionibus subsistendum: imponendūq; est praecordiis, quod sinul et reprimat, et emolliat.

De aqua inter cutem, hoc est hydropico morbo. Caput. XXI.

Ed hic quidem acutus est morbus. Longus uero fieri potest eorum, quos aqua inter cutem male habet: nisi primis diebus discussus est: ὅπου τὰ γὰρ ἄνθρωποι καὶ νοσήσιν. Atq; eius tres species sunt. Nam modo uentre uehementer intento creber intus ex motu spiritus sonus est. modo corpus inaequale est: tumoribus aliter, aliterq; per totam id orientibus. modo intus in unum aqua contrahitur: et moto corpore ita mouetur, ut impetus eius conspici possit. Primum τιμπαίνειν, secundum ἀνωορλεγματίαν, uel ὑπόσφυα, tertium ἀσκήτιν γὰρ ἄνθρωποι καὶ νοσήσιν. Communis in omnium est humo-

Aurelij Cor.

f



ris nimia abundantia: ob quam ne ulcera quidē in his aegris facile sa-  
 nescent. Sæpe uero hoc malū per se incipit. Sæpe alteri uetusto mor-  
 bo, maximeq; quartanæ superuenit. Facilius in seruis, quā in li-  
 beris tollitur. quia cum desideret famem, sitim, mille alia tedia, lon-  
 gamq; patientiam: promptius his succurritur, qui facile coguntur: quā  
 quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt: si ex  
 toto sibi temperare non possunt: ad salutem perducuntur. Ideoq; non  
 ignobilis medicus Chryssippi discipulus apud Antigonom regem am-  
 cum quendam eius notæ intemperantiæ mediocriter eo morbo impli-  
 citum, negauit posse sanari. Cumq; alter medicus epirotes Philippus se  
 sanaturum polliceretur: respondit illum ad morbum ægri respicere: se  
 ad animum. neq; eum res fecellit. Ille. n. cum summa diligentia non  
 medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur: tamen malagmata  
 sua deuorando, bibendoq; suam urinam, in exitium se præcipitauit.  
 Inter initia tamen non difficillima curatio est: si imperata sunt corpo-  
 ri quies, sitis, inedia. At si malum inueterauerit: non sine magna mo-  
 lesta discutitur. Metrodorum tamen Epicuri discipulum referunt: cum  
 hoc morbo tentaretur, neq; æquo animo ferret necessariam sitim: ubi  
 diu abstinerat: bibere solitum, deinde euomere. Quod si redditur  
 qui quid receptum est: multum tedio demit. si à stomacho retentum  
 est, morbum auget. Ideoq; in quolibet tentandum nō est. Sed si febris  
 quoq; est: hæc in primis submouenda est per eas rationes: per quas  
 huic succurri posse propositum est. Si sine febre æger est: tum demū ad  
 ea ueniendum est, quæ ipsi morbo mederi solent. atq; hic quæq; quæ-  
 cunq; species est, si nondum nimis occupauit: hisdem auxilijs opus est.  
 multum ambulandum. currendum aliquid est. superiores maxime  
 partes sic perficiendæ, ut spiritum ipse contineat. euocandus est su-  
 dor non exercitatione tantummodo, sed etiam in harena calida, uel laco-  
 nico, uel clibano, similibusq; alijs: maximeq; utiles naturales, et siccæ  
 sudationes sunt: quales super baias habemus in myrtetis. balneū, atq;  
 omnis humor alienus est. Ieiuno recte catapotia dantur facta ex ab-  
 sinthij duabus, myrrhe uel tertia parte. Cibus esse debet ex media qui-  
 dem materia: sed tamen generis durioris. Potio non ultra danda est,  
 quā ut uitam sustineat. optimaq; est, quæ urinā mouet. Sed id ipsum  
 tamen molliri cibo, quā medicamento melius est. Si tamen res coget ut  
 ex his aliquid detur: præstanter id decoquendū, eaq; aqua potui dan-  
 da. Videntur autem hanc facultatem habere, iris, nardum, crocum, cin-  
 namum, amomum, cassia, myrra, balsamum, galbanum, ladanum, oe-  
 nante, panace, cardamomum, hebenus, cupressi semen, una timinia, quā  
 τρυγίδα ἀρπύριον græci nomināt: abrotanum, rosæ folia, acorum, ama-



re nuces, tragoriganum, storax, costum, iunci quadrati & rotundi semen: illud  $\kappa\upsilon\tau\upsilon\rho\omicron\nu, \chi\omicron\iota\varsigma\omicron\nu$  hoc graeci vocant. Quae quotiens posuero, non quae hic nascuntur, sed quae inter aromata afferuntur, significabo. Primo tamen quae leuissima ex his sunt: idest rosae folia, uel nardi spica tentanda sunt. Vinum quoque utile est, & austerum: sed quum tenuissimum. Commodum est etiam lino cotidie uentrem metiri: & qua comprehendit aluum, notam imponere. postero die uidere si plenius corpus sit: an extenuetur. Id enim quod tenuatur, medicinam sentit. Neque alienum est metiri & potionem eius, et urinam. Nam si plus humoris excernitur, quam assumitur: ita demum secundae ualitudinis spes est. Asclepiades in eo qui ex quartana in hydropa deciderat: se abstinentia bidui & frictione usum. tertio die iam et febre, & aqua liberato cibum, & uinum dedisse, memorie praedit. Hactenus communiter de omni specie dici potest. Si uehementius malum est, diducenda ratio curandi est. Ergo si inflammatio, et ex ea dolor creber est: utilis quotidianus aut alterno quoque die post cibum, uomitus est. Fomentis siccis, calidisque utendum est. si per haec dolor non finitur, necessariae sunt sine ferro cucurbitulae. Si ne per has quidem tormentum tollitur: incidenda cutis est: & tum his utendum. Vltimum auxilium est: si cucurbitulae nihil profuerunt: per aluum infundere copiose aquam calidam, eamque recipere. Quin etiam cotidie ter, quaterue opus est uti frictione uehementi cum oleo, & quibusdam calefacientibus. sed in hac frictione a uentre abstinendum est. Imponendum uero in eum crebrius sinapi, donec cutem erodat: ferramentisque cadentibus pluribus locis uenter exulcerandus est: & seruanda ulcera diutius. Utiliter etiam scylla cocta delimitur cutis: sed diu post has inflammationes abstinendum est ab omnibus instantibus. At si id uitium est, cui  $\alpha\nu\kappa\omicron\pi\lambda\epsilon\tau\mu\alpha\tau\iota\alpha$  nomen est: eas partes quae tumunt, subijcere soli oportet: sed non nimium, ne febricula incadat: si is uehementior est, caput uelandum est: utendumque frictione madefactis tantum manibus aqua: cui sal, & nitrum, & olei paulum sit adiectum sic, ut aut pueriles, aut muliebres manus adhibeantur: quo molior earum tactus sit. Idque si uires patiuntur, ante meridiem tota hora: post meridiem semi hora fieri oportet. Utilia etiam sunt cataplasmata quae reprimunt: maximeque si corpora teneriora sunt. Incidendum quoque est super talum quattuor fere digitis ex parte interiore: qua per aliquot dies frequens humor feratur: atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet. Concutiendumque multa gestatione corpus est: atque ubi induitae uulneribus cicatrices sunt, adiucendum & exercitationibus est, & cibus, donec corpus ad primum habitum reuertatur. Cibus ualens esse debet, & glutinosus, maximeque



## LIBER

caro. Vinum, si per stomachum licet: dulcius. sed ita ut inuicē biduo, triduo uel modo aqua, modo id bibatur. Prodest et lactuca marinæ quæ grandis iuxta mare nascitur, semen cum aqua potui datum. Si ualens est qui id accipit: ei scylla cocta sicut supra dixi, delinatur. Anthoresq; multi sunt: inflatis uescis pulsandos tumores esse. Si uero id morbi genus est, quo in uterum multa aqua contrahitur: ambulare, sed magis modice oportet. malagma quod digerat impositum habere: idq; ipsum super imposito triplici panno fascia, non nimium tamen uehementer astringere. quod a Tharria profectum, seruatum esse à pluribus uideo. Si iecur aut lienem affectum esse manifestum est: ficum pinguem contusam adiecto melle superponere. Si per talia auxilia uenter non siccatur: sed humor nihilominus abundat: celeriore uia succurrere, ut is per uentrē ipsum emittatur. Neq; ignoro Erasistrato displicuisse hanc curandi uiam. Morbum enim hunc iocineris putauit. Ideoq; ita illum esse sanandum: frustra q; aquam emitti: quæ uitiato illo subinde nascatur. Sed primum non huius uisceris unius hoc uitium est. Nam splene affecto, et in totius corporis malo habitu fit: deinde ut inde coeperit: tamen aqua nisi emittitur, quæ contra naturam ibi subsistit: et iocineri, et cæteris interioribus partibus nocet. conuenitq; corpus nihilominus esse curandum. neq; enim sanat emissus humor: sed medicinæ locum facit, quam intus inclusus impedit. Ac ne illud quidem in controuersiam uenit: quin non omnes in hoc morbo sic curari possint: sed iuuenes robusti, qui uel ex toto carent febre: uel certe satis liberales intermissiones habent. Nam quorum stomachus corruptus est, qui uel ex atra bile huc deciderūt: quiq; malum corporis habitum habent: idonei huic curationi non sunt. Cibus autē quo die primum humor emissus est, superuacuuus est: nisi si uires defuerint. Insequentibus diebus et his uinum meracius quidem, sed non ita multum dari debet, paulatimq; euocandus æger est ad exercitationes, frictiones, solem, sudationes, navigationes, et idoneos cibos: donec ex toto conualescat. Balneum rarum res amat: frequentiore in ieiunio uomitum. Si æstas est, in mare natare commodum est. ubi conualuit aliquis, diu tamen alienus ei ueneris usus est.

De tabe, et eius speciebus, et curationibus. Caput. XXII.

Intius sepe et periculosius tabes eos male habet, quos in uasit. Atq; huius quoq; plures species sunt. Vna est qua corpus non alitur: et naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis uero in eorū locum subeuntibus,

summa



summa macies oritur: & nisi occurratur, tollit. ἀνοσι' av hanc græci  
 vocant. Ea duabus ferè de causis incidere consuevit. aut enim nimio  
 timore aliquis minus, aut aviditate nimia plusquam debet: assumit. ita  
 vel quod deest, infirmat: vel quod superat, corrumpitur. Altera spe-  
 cies est, quam græci καχεξία appellat: ubi malus corporis habitus  
 est. ideoq; omnia alimenta corrumpuntur. quod ferè fit, cum longo  
 morbo vitata corpora, etiam si illo vacent: refectioem tamen nõ acci-  
 piunt: aut cum malis medicamentis corpus affectum est, aut cum diu  
 necessaria defuerunt, aut cum inusitatos & inutiles cibos aliquis as-  
 sumpsit, aliquidne simile incidit. Huic præter tabem illud quoq; nõ-  
 nunq; accidere solet, ut per assiduas pustulas, aut ulcera, summa cutis  
 exasperetur: vel aliquæ corporis partes intumescant. Tertia est, lon-  
 gèq; periculosissima species, quam græci φθίσις nominaverunt. Ori-  
 tur ferè à capite: inde in pulmonem desillat: huic exulceratio accedit.  
 ex hac febricula levis fit: quæ etiam cum quieuit, tamen & repetit.  
 Frequens tussis est: pus excreatur: interdum cruentum aliquid. Quic-  
 quid excreatum est, si in ignem impositum est: mali odoris est. Itaq;  
 qui de morbo dubitant, hac nota utuntur. Cum hæc genera tabis sint,  
 animaduertere primum oportet, quid sit in quo laboratur. deinde  
 si tantummodo non ali corpus apparet: causam eius attendere: & si  
 cibi minus aliquis quàm debet, assumit: adijcere, sed paulatim: ne si  
 corpus insuetum subita multitudine oneraverit: concoctionem impe-  
 diat. Si uero plus iusto quis assumere solitus est: abstinere uno die, de-  
 inde ab exiguo cibo incipere: cotidie adijcere donec ad iustum modum  
 perveniat. Præter hæc convenit ambulare locis quàm minime frigi-  
 dis sole vitato: p manus quoq; exerceri. Si infirmior est, gestari, ungi,  
 perfricari si potest maxime per se ipsum sæpius eodem die, & ante  
 cibum, & post eum sic, ut interdum oleo quædam adijciantur calefa-  
 ciencia, donec insudet. Prodestq; ieiunio prehendere per multas partes  
 cutem: & attrahere ut relaxetur: aut imposita resina, & abducta  
 subinde idem facere. Vtile est etiam interdum balneum: sed post ci-  
 bum exiguum. Atq; in ipso solio recte cibi aliquid assumitur: aut si  
 sine hoc frictio fuit, post eam protinus. Cibi uero esse debent ex his,  
 qui facile concoquuntur: qui maxime alunt. Ergo vini quoq; sed au-  
 steri necessarius usus est. mouenda urina. at si malus corporis habi-  
 tus est, primum abstinendum est: deinde aluus ducenda. tum paula-  
 tim cibi dandi adiectis exercitationibus, unctionibus, frictionibus. Vti-  
 lius his frequens balneum est: sed ieiunis etiam usq; sudorem. Cibis  
 uero opus est copiosis, varijs, boni succi: quiq; etiam minus facile cor-  
 rumpantur: vino austero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mitten-

Aurelij Cor.

f iij



dus est, sed paulatim cotidieq; pluribus diebus cū eo, ut cætera quoq;  
 eodem modo seruetur. Quod si mali plus est, et uera p̄bris est: in=  
 ter initia protinus occurrere necessarium est. neq; enim facile is mor=  
 bus cum inueterauerit, euincitur. Opus est si uires patiuntur longa na=  
 uigatione, cœli mutatione sic, ut densius quàm id est, ex quo discedit  
 æger: petatur. Ideoq; aptissime Alexandriam ex Italia itur. Ferèq; id  
 posse inter principia corpus pati debet: cum hic morbus ætate firmis=  
 sima maxime oriatur: id est ab anno duodecimo, ad annum quintū,  
 et trigessimū. Si id imbecillitas non finit, naue in non longe gestari  
 comodissimum est. Si nauigationē aliqua res prohibet: lectica uel alio  
 modo corpus dimouendum est. Tum a negocijs abstinendum est: omni=  
 busq; rebus, quæ sollicitare animum possunt. somno indulgendum: ca=  
 uendæ defillationes, ne si quid cura letarit: exasperetur. Et ob id ui=  
 tanda cruditas: simulq; sol, et frigus. Os obtegendum: fauces uelandæ:  
 tussicula suis remedijs finienda. et quandiu quidem febricula incur=  
 sat, huic interdum abstinentia, interdum etiam tempestiuis cibis meden=  
 dum. Eoq; tempore bibenda aqua. Lac quoq;, quod in capitis dolori=  
 bus, et in acutis febribus, et per eas facta nimia sitis, siue præcor=  
 dia tument, siue biliosa urina est, siue sanguis fluxit, pro ueneno est.  
 in phthisi tamen sicut in omnibus longis, difficilibusq; febriculis recte  
 dari potest. Quod si febris aut nondum incurSAT, aut iam remisit:  
 decurrendum est ad modicas exercitationes, maximeq; ambulationes:  
 item lenes frictiones. Balneum alienū est. Cibus esse debet primo acer,  
 ut alliu, porrum, idq; ipsum ex aceto. uel ex eodē intubus, ocymum, la=  
 ctuca. Deīn lenis ut sorbitio ex ptisana, uel ex alia, uel ex amylo la=  
 cte adiecto. Idem oriza quoq;, et si nihil aliud est: far præstat. Tū in=  
 uicem modo his cibis, modo illis utendum est. adiiciendaq; quedam ex  
 media materia, præcipueq; uel ex apruna, cerebellū, uel pisciculus, et  
 his similia. Farina ē cum seuo ouillo, caprino uel mixta, deīde inco=  
 cta pro medicamēto est. uinum assumi debet lene, austerum. Hactenus  
 non magna mole pugnatur. Si uehementior noxa est, ac neq; febricu=  
 la, neq; tussis quiescit: tenuariq; corpus apparet: ualidioribus auxilijs  
 opus est. Exulcerandus est ferro candenti uno loco sub mento, altero in  
 gutture: duobus ad mammas utraq; item sub imis ossibus scapula=  
 rum, quas ὠμοπλάτας græci uocant: sic ne sanescere ultra sinamus, nisi  
 tussi finita: cui per se quoq; medendum esse manifestū est. Tunc ter,  
 quaterq; die uehementer extremæ partes perfricandæ. thorax leui  
 manu pertractandus. post cibum intermittenda hora: et perfricanda  
 crura, brachiaq;. Interpositis denis diebus demittendus est æger in so=  
 lium: in quo sit aqua calida, et oleum. cæteris diebus bibenda aqua:



tum & uinum: si tussis non est, potui frigidum dandum: si aestas est, egelidum. Vtile est etiam cibos in remissionibus cotidie dari: frictiones, gestationesq; similiter adhiberi. eadem acris quarto, aut quinto die sumere: interdum herbam sanguinalem ex aceto, uel plantaginem esse. Medicamentum etiam est uel plantaginis succus per se, uel marrubium ex melle concoctum, ita ut illius cyathus sorbillo sumatur: huius cochleare plenum paulatim delingatur: uel inter se mixta, & incocta resinae terebinthinae pars dimidia: butyri, et mellis pars altera. Præcipua tamen ex his omnibus sunt uictus, uehiculum, & nauis, & sorbitio. Alius cita utiq; uitanda est. Vomitus in hoc morbo si frequens est, perniciosus est, maximèq; sanguinis. Qui meliusculus esse cœpit, addicere debet exercitationes, frictiones, cibos: deinde ipse se suppresso spiritu perfricare: diu abstinere à uino, balneo, uenere.

## De comitialis morbi curationibus. Caput. XXIII.

Inter notissimos morbos est et is, qui comitialis, uel maior nominatur. Homo subito concidit: ex ore spumæ mouentur: deinde interposito tempore ad se redit: & per se ipsum confurgit. Id genus sæpius uiros quàm foeminas occupat. ac solet quidem et longum esse, usq; ad mortis diem: & uitæ non periculosum: interdum tamen cum recens est hominem consumit: & sæpe cum si remedia non sustulerunt, in pueris ueneris, in puelis menstruum initium tollit. modo cum distentione membrorum, aut nervorum prolabitur aliquis: modo sine illa quidem. Hos quoq; hisdem quibus lethargicos excitare conantur, quod admodum superuacuum est: & quia ne lethargicos quidem ipsi sanantur: & quia cum possit ille nunquàm expergisci, acq; ita fame interire: hic ad se utiq; reuertitur. Vbi concidit aliquis, si nulla nervorum distentio accessit, utiq; sanguis mitti debet: si accessit, non utiq; mittendus est, nisi alia quoq; hortantur. necessarium autem est ducere aluum: uel nigro ueratro purgare: uel iurung; facere si uires patiuntur. tunc caput tondere: oleoq; & aceto pun gere: cibum post diem tertium simul cum transit hora, qua cecidit, dare. Neq; sorbitiones autem his, aliq; molles, & faciles cibi, neq; caro, minimeq; suilla conuenit: sed mediæ materiæ. Nam et uiribus opus est: & cruditates cauendæ sunt, cum quibus fugere oportet solem: balneum, ignem, omniaq; calefacientia. item frigus, uinum, uenerem, loci præcipitis conspectum, omniumq; terrentium, uomitum, lassitudinem, solitudines, negocia omnia. Vbi tertio die alius datus est, intermittere quartum, & inuicem alterum quenq; eadem hora cibi seruata: donec quatuordecim dies transeant. quos ubi morbus excoisset: acuti uirum



## LIBER

deposuit. at si manet, curandus iam ut longus est. Quod si non quo die primum id incidit, medicus accessit: sed is qui cadere consuevit, ei traditus est: protinus eo genere uictus dabitur: qui supra comprehensus est: expectandus est dies, quo prolabatur: utendumq; tum uel sanguinis missione, uel ductione alui, uel nigro ueratro: sicut præceptum est. In sequentibus deinde diebus per eos cibos quos proposui: uitatis omnibus quæ cauenda dixi: nutriendus. Si per hæc morbus finitus non fuerit: confugendum erit ad album ueratrum: ac ter quoq; aut quater eo utendum: non ita multis interpositis diebus, sic tamen ne iterum unquam sumat, nisi conciderit. Medijs autem diebus uires eius erunt nutriendæ, quibusdā præter ea quæ scripta sunt, adiectis. Vbi mane expectatus est, corpus eius leuiter ex oleo uetere, cū capite, excepto uentre, permulceatur. tum ambulatione quā maxime longa, & recta utatur. post ambulationem loco tepido uehementer & diu, ac non minus ducenties, nisi infirmus erit, perfricetur: deinde per caput multa aqua frigida perfundatur. paulum abi assumat: conqueat: rursus ante noctem ambulatione utatur: iterum uehementer perfricetur sic, ut neq; uenter, neq; caput contingatur: post hæc coenet: interpositisq; tribus, aut quattuor diebus, uno aut altero acria assumat. Si ne per hæc quidem fuerit liberatus, caput radat: ungatur oleo uetere, adiecto aceto, & nitro: perfundatur aqua salsa: bibat ieiunus ex aqua castorei: nulla aqua nisi decocta potionis causa utatur. Quidam ingulati gladiatori calido sanguine epota, tali morbo se se liberarunt: apud quos miserū auxilium, tolerabile miserius malum fecit. Quod ad medicū uero pertinet, ultimū est iuxta talū ex utroq; crure paulum sanguinis mittere: occipitium incidere: & cucurbitulas admoovere ferro candente: in occipitio quoq; & infra, qua summa uertebra cum capite committitur, adurere duobus locis, ut per ea perniciosus humor euadat. quibus si finitum malum non fuerit, propè est, ut perpetuum sit. Ad leuandum id tantummodo utendum erit exercitatione, multa frictione, cibisq; his, qui supra comprehensi sunt. præcipueq; uitanda omnia, quæ ne fierent, excepimus.

## De regij morbi curatione. Caput. XXIIII.

Equè notus est morbus, quem interdum arquatū, interdum regium nominant: quem Hippocrates ait: si post septimum diem febricitante agro superuenit, tutum esse mollibus tantūmodo præcordijs substantibus. Diocles ex toto si post febrem oritur, et prodesse. si post hunc febris, occidere. Color autem



lor autem cum morbum detegit maxime oculorum: in quibus quod album esse debet, fit luteum. Soletq; accedere et sitis, et dolor capitis, et frequens singultus, et præcordiorum dextra parte durities: et ubi corporis uehemens motus est, spiritus difficultas, membrorumq; resolutio. atq; ubi diutius manet morbus, totum corpus cum pallore quodam inalescit. Primo die abstinere ægrum oportet: secundo ducere aluum: tum si febris est, eam uictus genere discutere. si non est, satimoneam potui dare: uel cum aqua betam albam contritam, uel cum aqua mulsâ nuces amaras, absinthium, anesum sic, ut pars huius minima sit. Asclepiades aquam quoq; salsam, et quidem per biduum purgationis causa bibere cogeat ijs, quæ urinam mouent: reiectis. Quidam superioribus omissis, per hæc et per eos cibos, qui extenuant: idem se consequi dicunt. Ego ubiq; si satis uirum est, ualidiora: si parum, imbecillia auxilia præfero. Si purgatio fuit, post eam triduo: primo modice cibum oportet assumere ex media materia: et uinum bibere græcum salsum, ut resolutio uentris maneat. tum altero triduo ualidiores cibos, et carnis quoq; aliquid esse. intra aquâ manere. deinde ad superius genus uictus reuerti cum eo, ut magis satietur omissis græco uino bibere integrum austerum: atq; ita per hæc uariare, ut interdum acres quoq; cibos interponat: interdum ad salsum uinum redeat. Per omne uero tempus utendum est exercitatione, frictione: si hyems est, balneo: si æstas, frigidis natationibus: lecto et, et conclauis cultiore. clauso loco uti ludis, lasciuia: per quæ mens exhilaretur. ob quæ regius morbus dictus uidetur. Malagma quoq; quod digerat, super præcordia datum, prodest: uel arida ibi fixa imposita, si iecur, aut lienis affectus est.

De elephantia curatione. Caput. XXV.

i Quotus autem penè in italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem *ἐλεφαντία* græci uocant: isq; longis annumeretur. Totum corpus afficitur, ita ut ossa quoq; uitiari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas, crebrosq; tumores habet. Rubor harum paulatim in atrum colorem conuertitur. Summa cutis inæqualiter crassa, tenuis, dura, mollisq; quasi squamis quibusdam exasperatur: corpus emacrescit: os furæ: pedes intumescunt. Vbi uetus morbus est, digiti in manibus, pedibusq; sub tumore conduntur: febricula oritur, quæ facile tot malis obrutum hominem consumit. protinus ergo inter initia sanguis per biduum mitti debet: aut nigro ueratro uenter solui: adhibenda tamen quanta sustineri potest, inedia est. paulum deinde uires reficiendæ: et



ducenda aluus. post hæc, ubi corpus lenatum est, utendum est exercitio, præcipueq; cursu. sudor primum labore ipsius corporis, deinde etiam siccis sudationibus euocandus. frictio adhibenda: moderatimq; inter hæc, ut vires conseruentur: balneum rarum esse debet. Cibus sine pinguibus, sine glutinosis, sine instantibus. Vinum, præterquam primis diebus, recte datur. Corpus contrita plantago, & illita ueri optime uidetur.

De attonitis, & eorum curatione. Caput. XXVI.

*a* Ttonitos quoq; raro uidemus: quorum & corpus, & mens stupet. Fit interdum ictu fulminis: interdum morbo: ἀποπληξίαν hūc græci appellant. Huius sanguis mittendus est. ueratro quoq; albo, uel alui ductione utendum. Tum adhibendæ frictiones: & ex media materia minime pingues cibi. quidam et acres: & a uino abstinendum.

De resolutione nervorum: quæ apoplexia, uel paralysis dicitur. Caput. XXVII.

*a* T resolutione nervorum frequens ubiq; morbus est. Sed interdum tota corpora, interdum partes infestat. Veteres authores illud ἀποπληξίαν, hoc παραλύσις nominauerunt. Nunc utrunq; paralyseos appellari uideo. Solent autem qui per omnia membra uehementer resoluti sunt, celeriter rapi. ac si correcti non sunt, diutius quidem uiuunt: sed raro tamē ad sanitatem perueniunt: & plerumq; miserum spiritum trahunt, memoria quoq; amissa. In partibus uero nunquam acutus, sæpe longus, ferè sanabilis morbus est. Si omnia membra uehementer resoluta sunt, sanguinis detractio uel occidit, uel liberat. Aliud curationis genus uix unquam sanitatem restituit: sæpe mortem. tantum differt uitam: interim infestat. Post sanguinis missionem si non redit & motus, & mens: nihil spei superest. Si rediit: sanitas quoq; prospicitur. At ubi pars resoluta est, prouidet malo corporis, uel sanguis missus, uel aluus ducta. Cætera eadem in utroq; casu facienda sunt. Si quidem uitare præcipue conuenit frigus: paulatimq; ad exercitationes reuertendum est sic, ut ingrediatur ipse protinus, si potest. Si id crurum imbecillitas prohibet: uel gestetur, uel motu lecti concutatur: tum id membrum quod deficiet si potest, per se, si minus, per alium moneatur: & ui quadam ad consuetudinem suam redeat. Prodest et torpentibus mēbris summa



cutem exasperasse, uel urticis caesam, uel imposito sinapi sic, ut ubi rubere coeperit corpus: hæc remoueantur. Scylla quoque contrita, bulbiq; contriti cum thure recte imponuntur. Neque alienum est resina cutem tertio quoque die diutius uellere: pluribus et locis aliquando sine ferro cucurbitulas admonere. Vnctioni uero aptissimum est uetus oleum, uel nitrum aceto, et oleo mixtum. Quin etiam fouere aqua calida marina: uel si ea non est, tamen salsa, magnopere necessarium est. At si quo loco uel naturales, uel etiam manu factæ tales natationes sunt, ijs potissimum utendum est: præcipueq; in his agitata membra, quæ maxime deficiunt. Si id non est, balneum tamen prodest. Cibus esse debet ex media materia, maximeq; ex uenatione. potio sine uino aqua calida. Si tamen uetus morbus est, interponi quarto, uel quinto die purgationis causa uinum græcum salsum prodest. Post coenam utilis uomitus est. Interdum uero etiam nervorum dolor oriri solet. In hoc casu non oportet uomere: non medicamentis urinam mouere: non sine exercitatione sudores, ut quidam præcipiunt, expedit. Bibenda aqua est bis die. in lectulo leniter satis diu corpus perfricandum est. deinde retento spiritu ab ipsa exercitatione potius superiores partes mouendæ. balneo raro utendum: multo admodum subinde peregrinationibus cælum. Si dolor est, ea ipsa pars sine oleo nitro ex aqua perungenda est: deinde inuoluenda, et subiicienda pruna lenis, et sulphur. atque ita id suffumigandum: idq; aliquandiu faciendum. Sed ieiunio cum bene iam concoxerit, cucurbitula quoque sæpe dolenti parti ad mouendæ sunt: pulsandusq; leniter inflatis uescis bubulis is locus est. Vtile est et seum miscere cum uosnuæus, et urticae contritis siminibus sic, ut omnium par modus sit: idq; imponere: fouere aqua, in qua sulphur decoctum sit. Vtriculi quoque recte imponuntur aqua calida repleti: aut bitumen cum ordeacea farina mixtum: atque in ipso potissimum dolore utendum gestatione uehementi est. quod in alijs doloribus pessimum est. Tremor aut nervorum æque uomitu, medicamentisq; urinam mouentibus impeditur. Inimici etiam habet balnea, assasq; sudationes. bibenda aqua est. acris ambulatione utendum. item unctionibus, frictionibusq; maxime per seipsum. pila, similibusq; superiores partes dimouendæ. cibo quolibet utendum, dum modo concoctioni utiq; studeatur. secundum cibum curis abstinendum. rarissima uenere utendum est. si quando quis in eam prolapsus est: tum oleo leniter, diuq; in lectulo perfricari manibus puerilibus, potius quam uirilibus debet. suppurationes autem quæ in aliqua interiori parte oriuntur, ubi notæ fuerint: primum id agere oportet per ea cataplasmata, quæ reprimunt: ne coitus inutilis materiæ fiat. deinde si hæc uicta sunt, per ea malagmata quæ digerunt: diffi-



## LIBER. III.

pentur. Quod si consecuti non sumus, sequitur, ut euocetur: deinde ut  
 maturescat: omnis tunc uomica finis est, ut rumpatur. Inditumq; est,  
 pus uel aluo, uel ore redditum. sed nihil facere oportet quo minus  
 quicquid est puris, excedat. Vitandum maxime sorbitionibus est: et  
 aqua calida: ubi pus ferri desit, transeundum ad faciles quidem, sed  
 tamen validiores, et frigidos cibos, frigidamq; aquam sic, ut ab egeli-  
 dis tamen initium fiat. primoq; cum melle quaedam edenda, ut nu-  
 clei pinei, uel græcæ nuges, uel auellanae. Postea submouendum id ip-  
 sum, quo maturius induci cicatrix possit. Medicamentum eo tempore  
 ulcери est, sucus assumptus uel porri, uel marrubij: et omni cibo por-  
 rum ipsum adiectum. Oportebit autem uti in his partibus quæ non  
 afficiuntur, frictionibus: item ambulationibus lenibus. Vitandumq;  
 erit, ne uel luctando, uel currendo, uel alia ratione sanescientia ulcera  
 exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoq; omnimodo ca-  
 uendus sanguinis uomitus est.



## De humani corporis interioribus sedibus. Caput. I.

h

Actenus reperiuntur ea genera morborū: quæ in totis corporibus ita sunt, ut ijs certæ sedes assignari non possint. Nunc de his dicam, quæ sunt in partibus. Facilius autem omnium interiorum morbi, curationesq; in noticiam uenient: si prius eorum sedes breuiter ostendero.

Caput igitur, eaq; quæ in ore sunt, non lingua tantummodo, palatoq; terminantur: sed etiam quatenus oculis nostris exposita sunt. In dextra, sinistraq; circa guttur uenæ grandes, quæ *οφθαλμικαὶ* nominantur: itemq; arteriæ, quas *αρτηριαὶ* uocant: sursum procedentes ultra aures feruntur. atq; in ipsis cernicibus glandulæ posita sunt: quæ interdum cum dolore intumescunt. Deinde duo itinera incipiunt. alterum asperam arteriam nominant: alterum stomachum. arteria exterior ad pulmonem: stomachus interior ad uentriculum fertur: illa spiritum, hic cibum recipit: quibus cum diuersæ uia sint: quæ cunctæ exigua in arteria sub ipsis faucibus lingua est. quæ cū spiramus, attollitur: cum cibum, potionemq; assumimus, arteriam claudit. Ipsa autem arteria dura, & cartilaginosa in gutture assurgit: cæteris partibus residet. Constat ex arcibus quibusdam compositis ad imaginem earū uertebraarum, quæ in spina sunt: ita in, ut ex parte exteriorē aspera, ex interiorē stomachi modo leuis sit. eaq; descendens ad præcordia, cum pulmone committitur. Is spongiosus, ideoq; spiritus capax, et à tergo spinæ ipsi iunctus in duas fibras ungulæ bubulæ modo diuiditur. huic cor annexū est natura musculosum, in pectore sub sinistro mēbra situm: duosq; quasi uentriculos habet. at sub corde, atq; pulmone transuersum, ex ualida membrana septum est: quod à præcordijs utrum diducit æque neruosum. Multis etiam uenis per id discurrentibus à superiore parte non solum intestina, sed iecur quoq; lienemq; discernit. Hæc uiscera proxima: sed infra tamē posita dextra, sinistraq; sunt. Iecur à dextra parte sub præcordijs ab ipso septo ortum intrinsecus cauum: extrinsecus gibbum: quod prominens leuiter uentriculo insidet: & in quattuor fiores diuiditur. Ex inferiore uero parte ei fel inheret. at lienis sinistra non eidē septo, sed intestino innexus est: natura mollis, & rarus longitudo, crassitudoq; modica: isq; paulum à costarum regione in utrum excedens, ex maxima parte sub his conditur. atq; hæc quidem



## LIBER

iuncta sunt. Renes uero diuersi, qui lumbis sub imis costis inhaerent à parte earum resimi, ab altera rotundi: qui & uenosi sunt: & uentriculos habent: & tunicis super continguntur: ac uiscerum quidem haec sedes sunt. Stomachus uero qui intestinorum principium est, nervosus à septimae spinæ uertebra incipit: ac circa præcordia cum uentriculo committitur. Venter autem qui receptaculum cibi est: constat ex duobus tergoribus. isq; inter lienem, & iecur positus est: utroq; ex his paulum super eum ingrediente. Suntq; etiam membranulae tenues, per quas inter se omnia ista connectuntur: iungunturq; ei septo, quod transversum esse supra posui. Inde ima uentriculi pars paulum in dexteriolem partem conuersa, in summum intestinum coartatur. Hanc iuncturam πύλου πορ græci uocant: quoniam portæ modo in inferiores partes ea quæ excretari sumus, emit. ab ea ieiunum intestinum incipit non ita implicitum, cui tale uocabulum est: quia nunquam quod accipit, continet: sed protinus in inferiores partes transmittit. Inde tenue intestinum est in sinus uehementer implicitum. Orbes uero eius per membranas singuli cum inferioribus connectuntur, qui in dexteriolem partem conuersi, & e regione dexteriolem coxæ finiti, superiores tamen partes magis complent. Deinde id intestinum cum crassiore altero transversum committitur: quod à dextra parte incipiens, in sinistro peruium, & longum est: in dexteriolem non est. ideoq; cæcum nominatur. At id quod peruium est, late fusum, atq; sinuatum: minusq; quam superiora intestina nervosum: ab utraq; parte huc, atq; illuc uolutum: magis tamen sinistro, inferioresq; partes tenens: contingit iecur, atq; uenter. Deinde cum quibusdam membranulis à sinistro rene uenientibus iungitur: atq; hinc dextra recuruat in imo dirigitur, qua excremit. ideoq; id ibi rectum intestinum nominatur. Contigit uero uniuersa hæc omentum ex interiore parte læue, & strictum: ex superiore mollius. Cui adeps quoq; innascitur: quæ sensu sicut cerebrum quoq; & medulla caret. At à renibus singulae uenæ calore albæ ad uesicam feruntur: ouerū par græci uocant: quod per eas inde descendente urinam in uesicam distillare concipiunt. Vesica autem in ipso sinu nervosa, & duplex ceruicæ plena, atq; carnosissima iungitur per uenas cum intestino, eoq; ossi, quod pubi subest. Ipsa soluta, atque liberior est: aliter in uiris, atq; in foeminis posita. Nam in uiris iuxta rectum intestinum est, potius in sinistra partem inclinata. In foeminis super genitale earum posita est: superq; elapsa ab ipsa uulua susinetur. Tum in masculis iter urinæ spaciosius, & compressius à ceruicæ huius descendit ad colen. In foeminis breuius, & plenius super uuluae ceruicam



se ostendit. Vulua autem in uirginibus quidem admodum exigua est. In mulieribus uero nisi ubi grauidæ sunt, non multo maior: quam ut manus comprehendatur. Ea recta continuatq; ceruicæ, quæ canalem uocant: contra mediam alium orsa: inde paulum ad dexteriores coxam cōuertitur: deinde super rectum intestinum progressa, ilij foeminae latera sua innectit. Ipsa autem ilia inter coxas, & pubem imouentre posita sunt: à quibus ac pube abdomen sursum uersus ad præcordia peruenit: ab exteriori parte euidenti cute, ab interiori leui membrana inclusum: quæ omento iungitur: περιτόνειος autem à grecis nominatur.

De curationibus morborum, qui nascuntur à capite: & primo de eius dolore: deinde de morbo qui circa faciem nascitur: tum de linguae resolutione: postremo de destillatione, ac grauedine. Caput. II.

Is ueluti in conspectum quendam quatenus scire curanti necessarium est adductis, remedia singularū laborantium partium exequar, orsus à capite. sub quo nomine nunc significo eam partem, quæ capillo tegitur. Nam oculorum, aurium, dentium dolor, & si quis similis est: alijs erit explicandus. In capite autem interdū acutus, & pestifer morbus est: quem *νεφελία* greci uocant. Cuius notæ sunt horror calidus, nervorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, uomatibus: sic ut uox supprimatur, uel sanguis ex naribus cursus: sic ut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis maxime circa tempora, uel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas: sed neq; grauis, neq; periculosa per hominis ætatem est. Interdum grauior dolor, sed breuis, neq; tamen mortiferus: qui uel uino, uel cruditate uel frigore, uel igne, aut sole contrahitur. Hiq; omnes dolores modo in febre, modo sine hac sunt: modo in toto capite, modo in parte interdum, sic ut oris quoq; proximam partem excrucient. Præter hæc est unum inuenitur genus, quod potest longum esse. ubi humor cutē inflat, eaq; intumescit, et prementi digito cedit, *ὀφθαλμική* greci appellant. Ex his, id quod secundo loco positum est, dum leue est: quæ sit ratione curandum, dixi: cum persequer ea, quæ sani homines in imbecillitate partis alicuius facere deberent. Quæ uero auxilia sunt capitis, ubi cum febre dolor est: eo loco explicatū est, quo februm curatio expōita est. Nunc de cæteris dicendum: ex quibus id quod acutum est, et id quod supra consuetudinem intenditur: idq; quod ex subita causa, & si non pestiferum, tamen uehemens est: primā curationem



## LIBER

habet, qua sanguis mittatur. sed id, nisi intolerabilis est dolor, super uacuū est. satiusq; est abstinere à cibo: si fieri potest, etiam à potione: si non potest, aquam bibere. si postero die dolor remanet, alium ducere: sternutamenta euocare: nihil assumere, nisi aquā. sæpe enim dies unus, aut alter totum dolorē hac ratione discit. utiq; si ex uino, uel cruditate origo est. si uero in his auxiliū parum est: tondere oportet ad cutem. deinde considerandū est: quæ causa dolorem excitauit. si calor, aqua frigida multa perfundere caput expedit: spongiā concinā imponere. subinde in aqua frigida expressam: ungere rosa, & aceto, uel potius his tinctam lanam succidam imponere: aliaq; refrigerantia cataplasmata. At si frigus nocuit: caput oportet perfundere aqua calida marina, uel certe salsa, aut in qua laurus decocta sit: tum caput uehementer perfricare: deinde calido oleo implere: ueste uelare. quidam et id deuincunt. Alij cervicalibus uestimentisq; onerant: et sic lenantur. alios calida cataplasmata adiunant. Ergo et ubi causa incognita est, uidere oportet refrigerantia magis, an calefacientia leniant: & his uti, quæ experimentum approbarit. At si parum causa discernitur: perfundere caput primū aqua calida, sicut supra præceptum est: uel salsa, uel ex lauro decocta. tum frigida posca. Illa in omni uetusto capitis dolore communia sunt: sternutamenta excitare, inferiores partes uehementer perfricare: gargarizare his, quæ salinam mouent: cucurbitulas temporibus & capitis ad mouere: sanguinem ex naribus detrahere: resina subinde tempora peruellere: et imposito sinapi exulcerare ea, quæ male habent, ante linteo subiecto, ne uehementer arrodant: candentibus feramentis ubi dolor est, ulcera excitare: cibū per modicum cum aqua sumere. ubi leuatus est dolor, in balneum ire: ibi multa aqua prius calida, deinde frigida per caput perfundi. si discussus ex toto dolor est, etiam ad uinum reuerti: sed postea semper antequam quicquam aliud, aquam bibere. dissimile est id genus quod humorem in caput contrahit. In hoc tondere ad cutem necessarium est. deinde imponere sinapi, sic ut exulceret. si id parū profuit: scalpello utendum est. Illa cum hydropicis communia sunt, ut exerceatur: insudet: uehementer perfricatur: abis, potionibusq; utatur, urinā præcipue mouentibus.

De morbo, qui circa faciem nascitur: quem græci cynicum spasmodum uocant.

Ira faciem uero morbus innascitur: quem græci κνινδὸν σπασμὸν nominant. Is cum acuta ferè febre oritur. Os cum motu



motu quodam peruertitur. ideoq; nihil aliud est, quàm distentio oris. Accedit crebra coloris in facie, totoq; corpore mutatio. somnus in promptu est. in hoc sanguinem mittere optimum est. Si finitum eo malum non est: ducere alium. si ne sic quidem discussum est: albo ueratro uoluntum mouere. præter hæc necessarium est uitare solem, lassitudinē, uinum. sed si discussum his non est: utendum est cursu, frictione in eo quod læsum est leni, & multa in reliquis partibus breuiore, sed uehementi. prodest etiam mouere sternutamenta: caput radere: idq; perfundere aqua calida, uel marina, uel certe salsa sic, ut ei quoq; sulphur adiiciatur. post perfusionem iterum perfricari: sinapi manducare: eodemq; tempore affectis oris partibus ceratum: integris idem sinapi, donec arrodant, imponere. Cibus aptissimus ex media materia est.

## De resolutione linguae.

**T** si lingua resoluta est: quod interdum per se, interdum ex morbo aliquo fit sic, ut sermo hominis non explicatur: oportet gargarizare ex aqua: in qua uel thymum, uel hyssopum, uel nepeta decocta sit: aquam bibere: caput, et os, & ea quae submento sunt, & ceruicem uehementer perfricare: laesae linguam ipsam: linere: manducare quae sunt acerrima, idest sinapi, allium, cepam: magna ui luctari, ut uerba exprimantur: exerceri re tento spiritu: caput saepe aqua frigida perfundere: nonnunquam multam esse radiculam: deinde uomere.

## De destillatione, ac grauedine.

**D**estillat autem humor ex capite interdum in nares: quod leue est. interdum in fauces: quod peius est. interdum et in pulmonem: quod pessimum est. Si in nares destillat: tenuis per has pituita profluit: caput leniter dolet: grauitas eius sentitur: frequentia sternutamenta sunt. Si in fauces: has exasperat: tussiculam mouet: si in pulmonem: præter sternutamenta, & tussim, est etiam capitis grauitas, lassitudo, sitis, aestus, biliosa urina. Aliud autem quantum non multum distans malum grauedo est. Hæc nares claudit: uocem obtundit: tussim siatam mouet: sub eadem salsa est salina: sonant aures: uenæ mouentur in capite: turbida urina est. Hæc omnia uox Hippocrates nominat. Nunc uideo apud graecos in grauedine hoc nomen seruari: destillationem uatastæuous appellari. Hæc autem & breuius, & si neglecta sunt, longa esse consue-

Aurelij Cor.



runt. Nihil pestiferum est: nisi quod pulmonem exulcerauit. Vbi ali-  
 quid eiusmodi sensimus: protinus abstinere à sole, balneo, uino, uenere  
 debemus. Inter quæ unctione, & assueto cibo nihilominus uti licet. am-  
 bulatione tantum acris: sed tecta utendum est: & post eam caput, atq;  
 os supra quinquages perfricandum. Raròq; fit, ut si biduo, uel certe  
 triduo nobis temperauimus: id uitium non leuetur. Quo leuato, si in  
 destillatione crassa facta pituita est: uel in grauedine nares magis  
 patent: balneo utendum est: multaq; aqua prius calida, post egelida fo-  
 uendum os, caputq;. deinde cum cibo pleniore uinum bibendum. At si  
 æque tenuis die quarto pituita est: uel nares æque clausæ uidentur:  
 assumendum est uinum amineu austerum: deinde rursus biduo aqua:  
 post quæ ad balneum, & ad consuetudinem reuertendum est. Neq;  
 tamen illis ipsis diebus, quibus aliqua omittenda sunt: expedit tan-  
 quam egros agere. sed cætera omnia quasi sanis facienda sunt: præ-  
 terquam si diutius aliquem, & uehementius ista sollicitare consuerunt.  
 Huic enim quædam curiosior obseruatio necessaria est. Igitur huic si  
 in nares, uel in fauces destillauit: præterea quæ supra retuli: protinus  
 primis diebus multum ambulandum est: perfricandæ uehementer in-  
 feriores partes: leuior frictio adhibenda thoraci erit: leuior capiti. de-  
 menda assueto cibo pars dimidia: sumenda oua, amyllum: similiaq;  
 quæ pituitam faciunt crassiores. Siti quanta maxime sustineri potest,  
 pugnandum est. Vbi per hæc idoneus aliquis balneo factus, eoq; usus  
 est: adijciendus est cibo pisciculus, aut caro: sic tamen ne protinus in-  
 stus modus cibi sumatur. uino meraco copiosius utendum est. At si in  
 pulmonem quoq; destillat: multoq; magis & ambulatione, & frictio-  
 ne opus est. eademq; adhibita ratione in cibus, si non satis illi profi-  
 ciunt: acrioribus utendum est. magis somno indulgendum: abstinen-  
 dumq; à negocijs omnibus. aliquando sed serius & balneum tentan-  
 dum. In grauedine autem primo die quiescere: neq; esse: neq; bibere:  
 caput uelare: fauces lana circumdare. postero die surgere. diu abstinere  
 à potione, aut si res coegerit: non ultra heminam aquæ assumere. Ter-  
 tio die panis non tam multum ex parte interiore cum pisciculo, uel  
 leni carne sumere: aqua bibere. Si quis sibi temperare non potuerit,  
 quo minus pleniore uictu utatur: uomere. Vbi in balneum uentum  
 est, multa aqua calida caput, & os fouere usq; ad sudorem. tum ad ui-  
 num redire post quæ uix fieri potest, ut idem incommodum maneat:  
 sed si manserit, utendum erit cibus frigidis, aridis, leuibus, humore q̃  
 minimo: seruatis frictionibus, exercitationibusq;: quæ in omni tali ge-  
 nere ualitudinis necessariae sunt.



## De cernicis morbis, curationibusq; Caput. III.

Capite transitus ad cernicem est: quæ grauius admodum morbis obnoxia est. neq; tamen aliis importunior, acutiorq; morbus est: quam is qui quodam rigore nervorum, modo caput scapulis: modo mentum pectori annectit: modo rectam, et immobilē cernicem intendit. Priore græci ὀπίσθιος ὄτορος, insequentem ἑμπίσθιος ὄτορος, ultimū τέτατος appellant. quamvis minus subtiliter quidam indiscretis his nominibus utantur. Ea sæpe intra quartū diem tollunt. si hunc euaserunt: sine periculo sunt. Omnia eadem ratione curantur: idq; conuenit. Sed Asclepiades utiq; mittendum sanguinem credidit. Quod quidam uitandum esse dixerunt: eo quod maxime tum corpus calore egeret: isq; esset in sanguine. Verum hoc quidem falsum est. Neq; enim natura sanguinis est, ut utiq; caleat: sed ex his, quæ in homine sunt: hic calerrime uel calefacit: uel refrigescit. Mitti uero nec ne debeat, ex his intelligi potest: quæ de sanguinis missione præcepta sunt. Utq; autem recte datur castoreum: & cum hoc piper, uel laser. Deinde opus est fomento humido, & calido. Itaq; pleriq; aqua calida multa cernices subinde perfundunt. id in præsentia leuat. sed cportuniores nervos frigori reddit. quod utiq; uitandum est. Vtilius igitur est cerato liquido primum cernicem perungere: deinde admoenere uestias, bubulas, uel utriculos oleo calido repletos, uel ex farina calidum cataplasma, uel piper rotundum cum fico contusum. Vtilissimum tamen est humido sale fouere. quod quomodo fieret, iam ostendi. Vbi eorum aliquid factum est, admoenere ad ignem: uel si æstus est, in sole ægrum oportet, maximeq; oleo uetere: si id nō est, syriaco: si ne id quidem est, adipe quā uetustissima cernicem, & scapulas, & spinam perfricare. Frictio cum omnibus in homine uertebis utilis sit: cum is præcipue quæ in collo sunt. Ergo die, nocteq; interpositis tamen quibusdam temporibus hoc remedio utendum est. Dum id intermittitur, imponendum malagma aliquod ex calefactis. cauendum uero præcipue frigus. Idcoq; in eo conclauī, quo cubabit æger: ignis continuus esse debet: maximeq; tempore ante lucano: quo præcipue frigus intenditur. Neq; inutile erit caput attonsum habere: idq; irino, uel cyprino calido madefacere: & super imposito pilleo uelare. nonnunquam ē in calidum oleū totum descendere: uel in aquam calidam: in qua foenum græcum decoctum sit: & adiecta olei pars tertia. Alius quoq; ducta sæpe superiores partes resoluit. Si uero etiam uehementius dolor creuit: admoendæ cernicis uis carbitula sunt sic, ut cutis incidatur: eadem aut feramentis, aut



sinapi adurenda. Vbi leuatus est dolor, moueriq; cœuix cœpit, scire licet cedere remedijs morbum. Sed diu uitandus abus, quisquis mandendus est. Sorbitionibus utendum: itemq; ouis sorbilibus: aut à pullis mollibus ius aliquod assumendum. id si bene processerit: iamq; ex toto recte se habere ceruices uidebuntur: incipiendum erit à pulicula, uel intrita bene madida. Celerius tamen etiā panis mandendus, quā uinum gustandum. si quidem huius usus præcipue periculosus: ideoq; in longum tempus differendus est.

De faucium morbis, ac curationibus: Et primum de angina, deinde de difficultate spirandi: ultimo de tussi. Caput. IIII.

T hoc autem morbi genus circa totam tœuicem, sic alterū æque pestiferum, acutumq; in faucibus esse consuevit: nō siri anginam uocant. apud græcos nomen prout species est. Interdū enim neq; rubor, neq; tumor ullus apparet: sed corpus aridum est: uix spiritus erahitur: membra soluuntur. id ουράχιν uocant. Interdum lingua, faucesq; cum rubore intumescunt: uox nihil significat. oculi uertuntur. facies pallet. singultusq; ē: id ουράχιν uocatur. Illa communia sunt, æger non cibum deuorare: nō potionem potest: spiritus eius includitur. Lenius est ubi tumor tantummodo et rubor est: cætera non sequuntur: id παραουράχιν appellant. Quicquid est, si uires patiuntur, sanguis mittendus est. si non abundat: secundum est ducere aluum. Cucurbitula quoq; recte sub mento, et circa fauces admoetur: ut id quod strangulat, euocet. Opus est deinde fomentis humidis. nam sicā spiritum elidunt. Ergo admonere spongas oportet: quæ melius in calidum oleum: quā in calidam aquam subinde demittuntur. Efficacissimusq; est hic quoq; salis calidi succus. Tum commodum est hyssopum, uel nepeta, uel thymum, uel absinthiū, uel etiam fursures, aut ficus aridas, aut mulsam aquam decoquere: eaq; gargarizare. post hæc palatum ungere uel felle taurino, uel eo medicamento, quod ex moris est. polline etiam piperis id recte respergitur. si per hæc parum proficitur, ultimum est incidere satis altis plagis sub ipsis maxillis supra collum, et in palato citra uiam uel eas uenas, quæ sub lingua sunt: ut per ea uulnera morbus erumpat. quibus si non fuerit æger adiutus: scire licet malo uictum esse. si uero his morbus leuatus est: iamq; fauces, et cibum, et spiritum capiunt: facilis ad bonā ualeitudinē recursus est. Atq; interdum natura quoq; adiunat: si ex angustiore sede uitium transit in latiorē. itaq; rubore, et tumore in præcordijs orto, scire licet fauces liberari.

Quicquid





Quicquid autem eas leuabit, incipiendum est ab humidis, maximeq; aqua mulsā decocta: deinde assumendi molles, et nō acres cibi sunt: do nec fauces ad pristinū habitum reuertantur. Vulgo audio si quis pulum hirundinis ederit: angina toto anno non periclitari. seruatumq; eum ex sale cum is morbus urget: comburi, carbonemq; eius contritū in aquam mulsam: quæ potui datur: infricari, et prodesse. Id cum ido neos auctores ex populo habeat: neq; habere quicquam periculi possit, quanuis in monumentis medicorum non legerim: tamen inserendum huic operi meo credidi.

## De difficultate spirandi.

St etiā circa fauces malum, quod apud græcos aliud, atq; aliud nomen habet: prout se intendit. Omne in difficultate spirandi cōsistit. Sed hæc dum modica est, neq; ex toto strangulat: *σπασμὸς* appellatur. Cum uehementior est, ut spirare æger sine sono, et anelatione non possit, *σπασμὸς*. Cū accessit id quoq; ne nisi recta cervice spiritus trahatur, *σπασμὸς*. Ex quibus id, quod primum est, potest diutius trahi. Duo in se quæntia acuta esse consuerunt. His communia sunt, quod propter angustias, per quas spiritus euadit: sibilum elidit: dolor in pectore, præcordijsq; est: interdum etiam scapulis: isq; modo decedit: modo reuertitur. ad hæc tussicula accedit. Auxilium est, nisi aliquid prohibet: in sanguinis detractiōe. Neq; id satis est: sed lacte quoq; ueter soluendus est. Liquanda aluus: interdum etiā ducenda. quibus extenuatum corpus incipit spiritum trahere commodius. Caput autem et in lecto sublime habendum est. thorax fomentis, cataplasmatibusq; calidis, aut siccis, aut etiam humidis ad inuandus est: et postea uel malagma super imponendū: uel certe ceratum ex cyprino, uel irino unguento. Sumenda deinde ieiuno potui mulsā aqua: cum qua uel hyssopus cocta, uel contrita capparis radix sit. Datur et utiliter aut nitrum, aut nasturciū, frictum alliu, deinde contritū, et cum melle mixtum: simulq; coquatur mel, galbanū, resina terebinthina: et ubi coierunt ex his quod fabæ magnitudinē habet, cotidie sub lingua liquatur. aut sulphuris ignem nō experti, pondo et quadrans abrotani pondo in uini cyatho teruntur: idq; tepesfactum sorbetur. Est et non uana opinio uulpinū iecur, ubi sicum et aridum factum est: contundi oportere: polentamq; ex eo potioni aspergi: uel eiusdem pulmonē quā recentissimum assum, sed sine ferro coctum, edendū esse. Præter hæc sorbitionibus, et lenibus cibis utendū est. interdum uino tenui austero: nonnunquā uomitu. Profunt et quæcunq;

Aurelij Cor.

§ iij



# LIBER

urinam augent. sed nihil magis quam ambulatio lenta penè usq; ad lassitudinem, frictio multa præcipue inferiorum partium uel in sole, uel ad ignem, & per se ipsum, & per alios usq; ad sudorem. In interiore uero faucium parte interdum exulceratio esse consuevit. In hac pleriq; extrinsecus cataplasmatibus calidis, fomentisq; humidis utuntur. Volunt etiam uaporem calidum ore recipi: per quæ molliores alij partes eas fieri dicunt: oportunioresq; uitio iam hærenti. Sed si bene scuitari morbus potest: tuta illa præsidia. si metus eius est, superuacua sunt. Vtiq; autem perficere fauces periculosum est. exulcerat enim. neq; utilia sunt quæ urinæ mouendæ sunt apta: quia possunt, dum transeunt, ibi quoq; pituitam extenuare: quam suppressi melius est. Asclepiades multarum rerum, quas ipsi quoq; secuti sumus: author bonus, acetum ait quàm acerrimum esse sorbendum. Hoc enim sine ulla noxa comprimit ulcera sed id suppressere sanguinem potest: ulcera ipsa sanare non potest. Melius huic rei licium est: quod idem quoq; æque probat, uel porri, uel marrubij succus, uel nucis græcæ cum trachanto contritæ, & cum passo mixtæ, uel lini semen contritum, & cum dulci uino mixtum. exercitatio quoq; ambulandi, currendiq; necessaria est. Frictio à pectore uehemens toti inferiori parti adhibenda. Cibi uero esse debent neq; nimium acres, neq; asperi: mel, lenticula, tragum, lac, ptisana, pinguis quoq; caro, præcipueq; porrum, et quicquid cum hoc mixtum est. Potions quàm minimum esse conuenit. A qua dari potest, uel pura, uel in qua malum cydoneum, palmulæ uel decoctæ sunt. Gargarizationes quoq; lenes. sin hæ parum proficiunt, reprimentes utiles sunt. Hoc genus neq; acutum est: & potest esse non longum. curationem tamen maturam, ne uehementer, & diu lædat: desiderat.

## De tussi.

Vssis uero ferè propter faucium exulcerationem molesta est: quæ multis modis contrahitur. Itaq; illis restitutis ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoq; male habere: & uix cum uetus facta est, eliditur. ac modo arida est: modo pituitam citat. Oportet hyssopum altero quoq; die bibere. spiritum retento currere: sed minime in puluere, ac lectione uti uehementi. quæ primo impeditur à tussi, post eam uincat. tum ambulare: deinde per manus quoq; exerceri: & pectus diu perficere. Post hæc quàm pinguius si quis uncias tres supra prunas inactas esse. Præter hæc si humida est, prosunt frictiones ualidæ cum quibusdam calefacientibus sic, ut caput quoq; siatum uehementer perfricetur. Item cu-



curbitulae pectori admotæ. sinapi ex parte exteriori faucibus impositum: donec leuiter exulceret. potio ex menta, nucibusq; græcis, & amylo: primoq; assumptus panis aridus: deinde aliquis cibus lenis. At si sicca tussis est, cum ea uehementissime urget: adiunat uini austeri cyathus assumptus: dum ne amplius id interposito tempore aliquo, quam ter, aut quater fiat. Item laseris quàm optimi paulum deuorare opus est: porri, uel marrubij succum assumere: scyllâ delingere: acetum ex ea uel certe acre sorbere: aut cum spica allij contriti duos uini cyathos. Vtilis etiam in omni tussi est peregrinatio, nauigatio longa, loca maritima, natationes. Cibus interdum mollis, ut malua, ut urtica: interdum acer, ut lac cum allio coctum. sorbitiones quibus laser sit adiectum: aut in quibus porrum incoctum tabuerit: ouum sorbile sulphure adiecto: potui primum aqua calida, deinde inuicem alijs diebus hæc, alijs uinû. Magis terreri potest aliquis cum sanguinẽ ex puit. sed id modo minus, modo plus periculi habet. Exit enim modo ex ginguis, modo ex ore. & quidem ex hoc interdum etiam copiose, sed sine tussi, sine ulcere sine gingivarum ullo uitio: ita ut nihil excreetur. Verum ut ex naribus, sic ex ore aliquando prorumpit. Atq; interdum sanguis profluit: interdum simile aquæ quiddam, in qua caro recens lota est. Nonnunquam autem is à summis faucibus fertur: modo exulcerata ea pte, modo nõ exulcerata: sed aut ore uenæ alicuius ad aperto, aut tuberculis quibusdam natis ex his sanguine erumpente. quod ubi incidit, neq; lædit potio aut cibus: neq; quicquam aut ex ulcere excreatur. aliquando gutture, & arterijs exulceratis, frequens tussis sanguinem quoq; exundit. Interdum etiam fieri solet, ut aut ex pulmone, aut ex pectore, aut ex latere, aut ex iocanere feratur. sæpe fæminæ quibus sanguis per menstrua non respondet: hunc expuunt: authoresq; medici fuerunt, uel ex esa parte aliqua sanguinem exire: uel rupta, uel ore alicuius uene patefacto. Primâ δὲ ἰσχυρὰ, secundam ἰσχυρὰ, tertiam ἀσθενή, quartam ἰσχυρὰ appellat. ultima minime nocet. prima grauissime. Ac sæpe quidem euenit, uti sanguinem pus sequatur. interdum autem qui sanguinem ipsum suppressit, satis ad ualitudinẽ profuit. Sed si secuta ulcera sunt: si pus, si tussis est, pro ut sedes ipsa est: ita uaria, et periculosa genera morborum sunt. Si uero sanguis tantum fluit: expeditius, & remedium, & finis est. Neq; ignorari oportet eis, quibus fluere sanguis solet, aut quibus spina dolet, coxæ uel, aut post cursum uehementem, uel ambulationem: dum felix absit: nõ esse inutile sanguinis mediocre profluvium. idq; per urinam redditum ipsam quoq; lassitudinem solucere. Ac ne in eo quidem terribile esse, qui ex superiore loco decedit. si tamen in eius urina nihil nonabit. Neq;



## LIBER

uomitum huius afferre periculum etiā cum repetit, si ante confir-  
 re & implere corpus licuit: & ex toto nullū nocere: qui in corpore  
 robusto neq; nimius est: neq; tussim, aut calorem mouet. Hæc pertinent  
 ad uniuersum. Nunc ad ea loca, quæ proposui, ueniam. Si ex ginguis  
 exit, portulacām manducasse satis est. si ex ore, continuasse eo merum  
 uinum. si parum id proficit, acetum. si inter hæc quoq; grauiter eru-  
 pit, quia consumere hominem potest: commodissimum est: impetum eius  
 admota occipitio cucurbitula sic, ut cutis quoq; incidatur: auertere. Si  
 id mulieri cui menstrua non feruntur, euenit: eandem cucurbitulam  
 inasis inguinibus eius admoere. At si ex faucibus, interioribus ue  
 partibus processit, & metus maior est: et cura maior adhibenda. san-  
 guis mittendus est: & si nihilominus ex ore processit, iterum, tertioq;  
 & cotidie paulum aliquid: protinus autem debet sorbere uel acetum,  
 uel etiam cum thure plantaginis, aut porri suauum. imponendaq; ex-  
 trinsecus supra id quod dolet, lana succida ex aceto est: & id spongia  
 subinde refrigerandum. Erasistratus horum crura quoq; et femora,  
 brachiaq; pluribus locis deligabat. Id Asclepiades adeo nō prodesse,  
 ut etiam inimicum esset: proposuit. Sed id sæpe commode respondere  
 experimenta testantur. Neq; tamen pluribus locis deligari necesse est.  
 sed sat est infra inguina, & super talos, summosq; humeros, etiam  
 brachia. Tum si febris urget, danda est sorbitio et potui aqua: in qua  
 aliquid ex his, quæ aluum astringunt: decoctum sit. at si abest febris,  
 uel elota alia, uel panis ex aqua frigida, & mole quoq; ouum dari  
 potest potui: uel idem quod supra scriptum est: uel uinum dulce, uel  
 aqua frigida: sed sic bibendum erit, ut sciamus huic morbo sitim pro-  
 desse. præter hæc necessaria sunt quies, securitas, silentium. Caput hu-  
 ius quoq; cubātis sublime esse debet: recteq; tondetur. Facies sæpe aqua  
 frigida fouenda est. At inimica sunt uinum, balneum, uenus. in cibo  
 oleum, acrida omnia. item calida fomenta. conclaue calidum, & inclu-  
 sum. multa uestimenta corpori iniecta. etiam fricationes ubi bene etiā  
 sanguis conquieuit. Tum uero incipiendum est à brachijs, cruribusq;  
 à thorace abstinendum. In hoc casu per hyemem locis maritimis, per  
 æstatem mediterraneis opus est.

## De stomachi morbis, &amp; curationibus. Caput. V.

f Aucibus subest stomachus: in quo plura longa uitia inci-  
 dere consueverunt. Nam modo ingens calor, modo inflatio  
 hunc, modo inflammatio, modo exulceratio afficit. Inter-  
 dum pituita, interdum bilis oritur. frequentissimumq;  
 est eius



est eius malum quo resoluitur: neq; ulla re magis aut afficitur: aut cor-  
pus afficit. Vt diuersa autem uitia eius, sic etia remedia sunt. Vbi ex-  
æstuat, aceto cū rosa extrinsecus subinde fouendus est. imponendusq;  
pulis cum oleo, & ea cataplasmata, quæ simul & reprimunt: &  
mollunt. Potui, nisi quid obstat: gelida aqua præstanda. Si inflatio est,  
profunt admotæ cucurbitulæ: neq; incidere autem necesse est. profunt  
siccæ, & calida fomenta, sed non uehementissima. Interponenda absta-  
nentia est. Vtilis in ieiunio potio est absinthij, aut hyssopi, aut rutæ.  
Exercitatio primo lenis, deinde maior adhibenda est: maximeq; quæ  
superiores partes moueat. quod genus in omnibus stomachi uitij  
aptissimum est. Post exercitationem opus est unctione, frictione: balneo  
quoq; nonnunquam, sed rarius: interdum alui ductione. Cibis deinde  
calidis, neq; inflatibus. eodemq; modo calidis potionibus: primo aquæ:  
post ubi resedit inflatio: uini austeri. Illud quoq; in omnibus stomachi  
uitij præcipiendum est, ut quo modo se quisq; æger refecerit: eo ut sa-  
nus utatur. Nam redit huic imbecillitas sua: nisi hisdem defendatur  
bona ualeudo, quibus reddita est. At si inflammatio aliqua est: quæ ferè  
tumor, & dolor sequitur: prima sunt quies, & abstinentia. lana sul-  
phurata circumdata: in ieiunio absinthium. si ardor stomachum ur-  
get, aceto cum rosa subinde fouendus est: deinde cibus quidem utendū  
est modicus. Imponenda uero extrinsecus quæ simul & reprimunt: et  
mollunt. deinde his detractis utendum calidis ex farina cataplasma-  
tis: quæ reliquas digerant. Interdum alui ducenda. Adhibenda exer-  
citatio, & cibus plenior. At si exulceratio stomachum infestat, eadem  
ferè facienda sunt, quæ in faucibus exulceratis præcepta sunt. Exer-  
citatio, frictio inferiorum partium adhibenda. Adhibendi leues, &  
glutinosi cibi, sed citra sacietatem. Omnia acria, atq; acida remouen-  
da. Vino, si febris nō est, dulci: aut si id inflat, certe leni utendum, sed  
neq; præfrigido, neq; nimis calido. si uero pituita stomachus impletur:  
necessarius modo in ieiunio, modo post abum uomitus est. Vtilis exer-  
citatio, gestatio, nauigatio, frictio. Nihil edendum, bibendumq; nisi cali-  
dum: uitatis tantum his, quæ pituitam contrahere consuerunt. Mole-  
stus est: si stomachus bile uitiosus est. Solent autem hi qui sic tentan-  
tur: interpositis quibusdam diebus hanc, & quidem quod pessimum  
est, atram mouere. His recte alui ducitur. potiones absinthio dan-  
tur. necessaria gestatio nauigatio est, si fieri potest ex nausea uomitus.  
uitanda cruditas. sumendi cibi faciles, & stomacho non alieni. uinū  
austum. Vulgatissimum uero, pessimumq; stomachi uitium est resolu-  
tio: id est cum cibi non tenax est: soletq; desinere ali corpus: ac sic tabe  
consumi. Huic generi inutilissimum balneum est. Lectiones exercita-



## LIBER

ionesq; supioris partis necessariae. Itē unctiones, frictionesq; his perfundi frigida, atq; in eadem nature: canalibus eiusdem subijcere etiam stomachū ipsum, & magis etiam à scapulis, id quod contra stomachū est. Consistere in frigidis, medijs capitisq; fontibus quales cutiliarū, symbruinarumq; sunt: salutare est. Cibi quoq; assumendi sunt frigidi: qui potius difficulter coquantur: quàm facile uariantur. Ergo pleriq; qui nihil aliud concoquere possunt: bubulam coquant. Ex quo colligi potest, neq; auem, neq; uenationem, neq; piscem dari debere: nisi generis durioris. Potui quidem aptissimum est uinum frigidum, uel arte bene calidum meracum: potissimum rheticum, uel allobrogicum: aliud uel, quod & austerum, & resina conditum est. si id non est: quàm asperum, maximūq; signinum. Si cibus non continetur, danda aqua: & eliciendus plenior uomitus est: iterumq; dandus cibus, & tam ad mouendam duobus intra stomachum digitis cucurbitula: ibiq; duabus, aut tribus horis continendae sunt. Si simul & uomitus, & dolor est, imponenda supra stomachum est lana succida, uel sponsa ex aceto, uel cataplasma, quod refrigeret. Perfricanda uero non diu, sed uehementer brachia, & crura: & calefacienda. Si plus doloris est, infra praecordia quatuor digitis cucurbitula utendum est: protinus dandus panis ex posca frigida. Si non continuit: post uomitum lene aliquid ex his, quae non aliena stomacho sint. Si ne id quidem tenuit: singuli cyathi uini, singulis interpositis horis, donec stomachus consistat. Valens etiam medicamentum est radiculæ suauis, ualencius acidi punia mali compari modo suci, qui ex dulci punice malo est: adiecto etiam intubi succo, & menta: sed huius minima parte: quibus tantundem quantum in his omnibus est aquae frigidae, quàm optime miscetur. Id enim plus quàm uinum ad comprimendum stomachum potest. suppressendus autem uomitus est, qui per se uenit sic, si nausea est. Sed si coacuit intus, cibus aut computruit: quorum utrumlibet ructus ostendit: eijcendus est: protinusq; cibus assumptis hisdem, quos proxime posui: stomachus restituendus. Vbi sublatus est praesens metus, ad ea redeundum est: quae supra praecipta sunt.

## De laterum doloribus. Caput. VI.

Stomachus lateribus cingitur: atq; in his quoq; uehementiores dolores esse consueverunt. & initium uel ex frigore, uel ex ictu, uel ex nimio cursu, uel ex morbo est. Sed interdū ne malum intra dolorem est: usq; modo tarde, modo celeriter soluitur. interdum ad perniciem quoq; procedit. oriturq; ac-



tus morbus, qui *μαρπιτινός* à grecis nominatur. Huic dolori lateris febris, & tussis accedit. & per hanc excreatur: si tolerabilis morbus est: pituita si grauis sanguis. Interdum etiam siata tussis est: quæ nihil emollitur. idq; primo uitio grauius: secundo tolerabilius est. Remediū uero est magnū, & recentis doloris sanguis missus. At siue lenior, siue uetustior casus est: uel supernacuum, uel serum id auxilium est. confugiendūq; ad cucurbitulas est, ante summa cute inisa. Recte et sinapi ex aceto super pectus imponitur: donec ulcera, pustulasq; excitet: & tum medicamentum, quod humorem illuc citet. Præter hæc arcundare primum oportet latus absolantæ sulphuratæ. deinde cum paulum inflammatio se remisit: stans, & calidis fomentis uti. Ab his trāsitus ad malagmata est. Si uetustior dolor remanet: nouissime resina imposita discutitur. Utendum cibis, potionibusq; calidis. uitandum frigus. Inter hæc tamen non alienum & extremas partes oleo, & sulphure perficere. Si leuata tussis est: leni lectione uti. iamq; & acres cibos, & uinum meracius assumere. quæ à medicis præcipiuntur: ut tamen sine his rusticos nostros epota ex aqua herba trixago satis adiuuet. Hæc in omni lateris dolore communia sunt. plus negotij est, si acutus quoq; morbus is factus est. In hoc præter ea quæ supra posita sunt, hæc animaduertenda sunt, ut cibus sit quàm maxime tenuis, & lenis, præcipueq; sorbitio: eaq; ex ptisana potissimum, aut ius in quo porrus cum pullo gallinæ coctus sit. Idq; non nisi tertio quoq; die detur: si tamen per uires licebit. potui uero aquamulsa, in qua hyssopum, aut ruta decocta sit. quæ quibus temporibus danda sint: ex ratione uel adiectæ, uel leuata febris apparebit sic, ut in remissione quàm maxima dent: cum eo tamen, ut sciamus non esse eius generis tussi aridas fauces committendas. sæpe enim ubi nihil est quod excreatur: continetur, & strangulat. Ob quam causam dixi etiam prius id genus esse tussis: quod nihil, quàm quod pituitam moueret. Sed hic uinum sorbere, ut supra præcepimus: morbus ipse non patitur. inuicem eius cremor ptisanæ sumendus est. Ut his autem in ipso morbi feruore sustinendus aeger est: sic ubi paulum is se remisit: alimenta pleniora, & uini quoq; aliquid dari potest. dum nihil detur, quod aut refrigeret corpus, aut fauces asperet. Si in refectioe quoq; manserit tussis, intermittere oportebit uno die: posteroq; cum cibo uini paulo plus assumere. atq; incipiente quoq; tussi tum non erit alienum, ut supra quoq; positum est: uini cyathos sorbere. Sed in hoc genere ualitudinis dulce, uel certe lene commodius est. Si malum inueterauit, athletico uictus corpus firmandum est.



## LIBER.

De uiscerum morbis: Et primo de pulmone, deinde de iocinere, tum de liene, postremo de renibus. Caput. VII.

Compagne uero corporis ad uiscera transeundū est: Et  
 a in primis ad pulmonem ueniendum: ex quo uehemens  
 Et acutus morbus oritur, quem περιπνευμονιδὸν græci  
 uocant. eius hæc conditio est. Pulmo totus afficitur. hunc  
 eius casum subsequitur tussis: bilem, uel pus trahens: præcordiorū, to-  
 tiusq; pectoris grauitas: spiritus difficultas, magnæ febres, continua ui-  
 gilia, cibi fastidium, tabes. Id genus morbi plus periculi, quàm doloris  
 habet. Oportet si satis ualidæ uires sunt, sanguinem mittere: si mino-  
 res, cucurbitulas sine ferro præcordijs admoñere. Tum si satis ualet,  
 gestando ægrum digerere: si parum, intra domum tamen dimouere.  
 Potionem autem hyssopi dare, cui ficus arida sit incōcta: aut aquam  
 mulsam, in qua uel hyssopum, uel ruta deacta sit. Frictione uti diu-  
 tissime in scapulis: proxime ab his in brachijs, Et pedibus, Et cruri-  
 bus, leuiter contra pulmonem. idq; bis cotidie facere. Quod ad cibum  
 uero pertinet: huic nec salsis opus est, neq; acribus, neq; amaris, neq;  
 alium astringentibus: sed paulo lenioribus. Ergo primis diebus dan-  
 da est sorbitio ptisanæ, uel alicæ, uel orizæ: cum qua recens adeps co-  
 cta sit. Cū hac sorbile orum, nuclei pinei ex melle. panis, uel elota ali-  
 ci ex aqua mulsæ. potui deinde non solum pura aqua, sed etiam mul-  
 sa egelida, aut si æstas est, etiam frigida: nisi quid obstat. hæc autem  
 altero quoq; die incrementē morbo dare satis est. Vbi incremento  
 constitit quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est: præter-  
 quam aqua egelida. Si uires desunt, adiuuandæ sunt aqua mulsæ.  
 profuntq; aduersus dolores imposita calida fomenta, uel ea quæ si-  
 mul Et reprimunt, Et emolliunt. Prodest impositus super pectus sal  
 bene contritus, cum cerato mixtus, quia leuiter cutem erodit: eoq; im-  
 petum materiæ, quo pulmo uexatur: euocat. Vtile etiam aliquod ma-  
 lagma est ex his, quæ materiam trahunt. Neq; alienum est dum pre-  
 mit morbus, clausis fenestris ægrum continere. Vbi paulum leuatus  
 est, ter, aut quater die fenestris aliquanto apertis paruum aërem re-  
 cipere. Deinde in refectiōe pluribus diebus à uino al sinere. gestatio-  
 ne, frictione uti. sorbitionibus, Et prioribus cibis adijcere ex oleribus  
 porrum, ex carne ungulas, Et summa trunculorum, atq; pisciculos  
 sic, ut diu nihil molle, Et lene sumatur.



De iocineris morbo, & curatione. Caput. VIII.

**A**lterius quoque visceris morbus id est iocineris aequae modo longus, modo acutus esse consuevit: ἡ γὰρ τῆς ἰσχυρίας ἡ γὰρ τῆς ἰσχυρίας. Dextra parte sub praecordiis uehemens dolor est. idemque ad latus dextrum, & ad iugulum, humerumque partis eiusdem peruenit. nonnunquam manus quoque dextra torquetur. horror calidus est. Vbi male est, bilis euomitur. interdum singultus prope strangulat. & haec quidem acuti morbi sunt. Longioris uero ubi suppuratio in iocinere est: dolorque modo finitur: modo intenditur: dextra parte praecordia dura sunt: & tument. post cibum maior difficultas est. accedit maxillarum quaedam resolutio. ubi inueterauit malum, uenter et crura, pedesque intumescunt: pectus, atque humeri, circaque iugulum utrumque extenuatur. Initio sanguinem mittere optimum est. tum uenter soluedus est: si non potest aliter, per nigrum ueratrum imponenda extrinsecus cataplasinata, primum quae reprimant: deinde calida, quae deducant. quibus recte iris, uel absinthium adijciunt: post haec malagma. Dandae uero sorbitiones sunt: omnesque cibi, & calidi, & qui non multum alant: & ferè qui pulmonis quoque dolori conueniunt: praeterque eos, qui urinam mouent: potionesque ad id efficaces. Vtilia in hoc morbo sunt thymum, satyria, hyssopum, nepeta, amyllum, sisanum, lauri bacca, pini flos, herba sanguinalis, menta, ex malo cotoneo medium, columbae iecur recens, & crudum. Ex quibus quaedam per se esse, quaedam adijcere uel sorbitioni, uel potioni licet: sic tamen ut parca assumentur. Neque alienum est absinthium contritum ex melle, et pipere: eiusque catapotium cotidie deuorare. abstinendum utique est ab omnibus frigidis: neque enim res ulla magis iecur laedit. Frictionibus utendum in extremis partibus. uitandus omnis labor: omnis uehementior motus. ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pondus, ictus, cursus inimici sunt. Perfusio corporis multa prodest ex aqua: si hyems est, calida: si aestas, tepida. Item liberalis unctio: & in balneo sudor. Si uero iecur uomica laborat, eadem facienda sunt, quae in caeteris interioribus suppuracionibus. Quidam etiam contra id scilpello aperiunt: ipsam uomicam adurunt.

De lienis morbo, & curatione. Caput. IX.

**A** lienis ubi affectus est, intumescit: simulque cum eo pars sinistra, eaque dura est: & prementi renititur: uenter intentus est: aliquis etiam cruribus tumor est. Vlcera aut omnino non



sanesunt: aut certe cicatricem uix recipiunt. In intentā ambulatione, cursuq; dolor, & quaedam difficultas est. hoc uitium quies auget. Itaq; exercitatione, & labore opus est: habita tamen ratione ne febre mixta si numum procefferit, excitetur. Vnctiones, frictionesq; & sudores necessarij sunt. Dulcia omnia inimica sunt. item lac, & casus. Acida autem maxime conueniunt. Ergo acetum acre per se sorbere, & magis etiam quod scylla conditum est: expedit. Edenda sunt salsamenta, uel olea ex muria dura: tincta in aceto lactucae, intubiq; & betae ex eodem. ex sinapi asparagus, armoracia, pashnata, ungula, rostra, aues mariae, eiusdem generis uenatio. Potui uero ieiuno dari debet ab sinthium incoctum. at post cibum aqua à ferrario fabro: in qua candens ferrum subinde tinctum sit. Haec enim uel praecipue lienem cohercet: quod animaduersum est in his animalibus: quae apud hos fabros educata, exiguos lienes habent. potest etiam dari uinum tenue, austerrum: omniaq; in abis, & potionibus, quae urinae mouenda sunt: praecipueq; ad id ualet uel trifolij semem, uel cuminum, uel apium, uel serpillum, uel citrus, uel portulaca, uel nepeta, uel thymum, uel hyssopum, uel satureia. haec enim inde commodissime uidentur humorem deducere. Lienis quoq; bubulus utiliter esui datur: praecipueq; eruca, & nasturcium lienem extenuant. Imponenda quoq; extrinsecus sunt quae leuent. Fit ex unguento, & palmulis, quod μωροσάλας uel græci uocant. Fit ex lini, & nasturcij semine, quo uinum, & oleum adiungitur. fit ex cupresso uiride, & arida ficu. fit ex sinapi, cui seui hircini à renibus quarta pars ponderis adiungitur: teriturq; in sale, & protinus imponitur. Multisq; modis huic rei capparum aptum est. Nam & ipsum cum cibo assumere, & muriam eius cum aceto sorbere, commodum est. Quin et extrinsecus radicem contritam, uel corticem eius cum suffuribus, aut ipsum capparum cum melle contritum imponere expedit. Malagmata quoq; huic rei aptantur.

## De renum morbis, &amp; curationibus. Caput. X.

RENES ubi affecti sunt: diu male habent. Peius est si frequens biliosus uomitus accedit. Oportet conuiescere: cubare molliter: soluere aluum si aliter non respondet, etiam ducere. Saepè desiderare in aqua calida: neq; cibum, neq; potionem frigidam assumere. abstinere ab omnibus salsis, acerbis, acidis pomis: bibere liberaliter: adijcere modo cibo, modo potioni piper, porrum, ferulā, album papauer: quae maxime inde urinam mouere consueverunt. Auxilio quoq; his exulceratis sunt, si adhuc ulcera purgenda

canes libentes aqua  
à qua fabi tenam  
igniti ferru contrigunt  
habent liene paruum



sunt: cucumeris semina detractis corticibus sexaginta, nuclei ex pinis siluestri duodecim, anesi quod tribus digitis sumi possit: croci paulū, cōtrita et in duas mulsi potiones diuisa. Si uero dolor tantū leuādus est: eiusdē cucumeris semina triginta, ydē nuclei uiginti, nuces græce quiq; croci paululū, contrita, et cū lacte potui data. At sup quoq; recte quædā malagmata iniiciuntur: maximeq; ea quæ humori extrahendo sunt.

De intestinorum morbis, & primo de cholera. Caput. XI.

Visceribus ad intestina ueniēdum est: quæ sunt et acutis, & longis morbis obnoxia. Primo æque facienda mentio est cholerae: quia cōe id stomachi, atq; intestinorum uitiū uideri potest. Nam simul & deiectio, & uomitus est: præterq; hæc inflatio est: intestina torquentur: bilis supra, infraq; erumpit: primum aquæ similis: deinde ut in ea recens caro lota esse uideatur: interdum alba: non unquam nigra, uel uaria. Ergo eo nomine morbi hunc *Χόλερα* græci nominarunt. præter ea uero, quæ supra cōprehensa sunt: sepe et crura, manusq; contrahuntur: urget sitis: anima deficit: quibus concurrentibus non mirū est, si subito quis moritur: neq; tamen ulli morbo minori momento succurritur. Protinus ergo ubi ista cōperunt: aquæ tepidæ quā plurimum bibere oportet: et uomere. Vix unquam sine uomitu sequitur, sed et si non incidit: misuisse tamē nouam materiā corruptæ prodest: parsq; sanitatis est uomitum esse suppressum, si id incidit: protinus ab omni potione abstinendum est. Si uero tormina sunt: oportet frigidis, & humidis fomentis stomachum fouere: uel si ueter dolet: hisdem egelidis sic, ut uenter ipse mediocriter calentibus inueter. Quod si uehementer et uomitus, & deiectio, et sitis uexant: & adhuc subcruda sunt, quæ uomuntur: nondū uino maturum tempus est. Aqua, neq; ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est. admouendumq; naribus est puleiū ex aceto: uel polenta uino aspersa: uel menta secundū naturam est. At cū discussa cruditas est: tum magis uerendū est, ne anima deficit. Ergo tum confugendum est ad uinū. id esse oportet tenuē, odoratū, cū aqua frigida mixtum: uel polenta adiecta, uel melle quoq; assumere expedit: quotiensq; aliquid aut stomachus, aut uenter effudit: totiens p hæc uires restituere. Erasistratus primo tribus uini guttis, aut quibus aspergendā potionem esse dixit: deinde paulatim merū adiiciendū. Is si et ab initio uinū dedit: et merū cruditatis secutus est: non sine causa fecit. Si uehementē infirmitatē adiuuari posse tribus guttis putauit: errauit. At si inanis est homo: et crura eius cōtrahuntur: interponēda potio absintū est.



Si extremæ partes corporis frigent, unguenda sunt calido oleo: cui ceræ paulum sit adiectum: calidisq; fomentis nutrienda. Si ne sub his quidem quies facta est, extrinsecus contra uentriculum ipsum cucurbitula admoenda est: aut sinapi super imponendum. Vbi is constitit, dormire oportet. postero die utiq; à potione abstinere. die tertio in balneum ire. paulatim se cibo reficere: somno: quisquis facile acquiescit. itemq; lassitudine, & frigore. Si post suppressam choleram febricula manet, aluum duci necessarium est. tum cibus, uinoq; utendum est. sed hic quidem morbus & acutus est: & inter intestina, stomachumq; uersatur sic, ut cuius potissimum partis sit: non facile dici possit.

## De cæliaco uentriculi morbo. Caput. XII.

Nipsum uero uentriculi porta consistit is, qui & longus esse consuevit: νοιδιακός à græcis nominatur. Sub hoc uenter indurescit: dolorq; eius est. Aluus nihil reddit: ac ne spiritum quidem transmittit. extremæ partes frigescent. difficulter spiritus redditur. Commodissimum est inter initia calida cataplasmata toto uentri imponere, ut dolorem leniant. post cibum uomere: atq; ita uentrem exinanire. Proximis deinde diebus cucurbitulas sine ferro uentri, et coxis admoere. Ventrem ipsum liquare dato lacte, & uino salso, frigido. Si tempus anni patitur, etiam uiridibus ficis: sic tamen ne quis aut cibus, aut humor uniuersus detur: sed paulatim. Ergo per intervalla temporis sat est cyathos binos, ternos uel sumere: et cibum pro portione huius. commodèq; facit cyathos lactis, cyathus aquæ mixtus, et sic datus. Cibiq; instantes, & acres utiliores sunt: adeo ut lacti quoq; recte contritum allium adyiciatur. Procedente uero tempore opus est gestari: maximèq; nauigare: perfricari ter, aut quater die sic, ut nitrum oleo misceatur: perfundi aqua calida post cibum: deinde sinapi imponere per omnia membra excepto capite, donec arrodat: & rubeat: maximèq; si corpus durum, & uirile est. paulatim deinde faciendus est transitus ad ea, quæ uentrem comprimunt. Assa caro danda, ualens, & quæ non facile corrumpatur. potui uero pluuiæ aqua decocta: sed quæ per binos, ternos uel cyathos bibatur. Si uetus nitrum est, oportet laser quàm optimum ad piperis magnitudinem deuorare. altero quoq; die uinum, uel aquam bibere: interdum interposito cibo singulos uini cyathos sorbere: ex inferiori parte infundere pluuialem egelidam aquam: maximèq; si dolor in-  
imis partibus remanet.

De tenuioris



i Nter ipsa uero intestina consistunt duo morbi: quorum al-  
ter in tenuiore, alter in pleniore intestino est. Prior acutus  
est. insequens esse locus potest. Diocles Carystus tenuioris  
intestini morbum  $\chi\omicron\rho\sigma\alpha\tau\omicron\rho$ , plenioris  $\epsilon\iota\lambda\epsilon\omicron\rho$  nominauit.

A plerisque uideo nunc illū priorem  $\epsilon\iota\lambda\epsilon\omicron\rho$ , hūc  $\kappa\omega\lambda\iota\kappa\omicron\nu$  nominari. Sed  
prior modo supra umbilicum, modo sub umbilico dolorem mouet.  
Fit ex alterutro loco inflammatiō: nec aluus, nec spiritus infra trāsmi-  
titur. si superior pars affecta est, abus: si inferior sterqus per os reddi-  
tur. si utrunlibet uetus est, adiungitur periculo uomitus biliosus mali odo-  
ris, aut uariius, aut niger. Remedium est sanguinem mittere: uel cucur-  
bitulas pluribus locis admoenere, non ubiq; cute incisa. Id enim duobus,  
aut tribus locis satis est. Ex ceteris spiritum euocare abunde est. Tum  
animaduertere oportet, quo loco malum sit. solet enim contra id tu-  
mere. Et si supra umbilicum est, alui ductio utilis non est. Si infra est:  
aluū ducere, ut Erasistrato placuit: optimum est. Et sepe id auxi-  
lij satis est. Ducitur autem percolato ptisanæ cremore cum oleo, et  
melle sic, ut præter ea nihil adijciatur. Si nihil timet, duas manus im-  
ponere oportet supra summum uentrem: paulatimq; deducere. Inue-  
nietur enim mali locus, qui necesse est, renitatur: et ex eodem delibe-  
rari poterit ducenda nec ne aluus sit. Illa communia sunt, calida cat-  
aplasmata admoenere: eaq; imponere à mammis usq; ad inguina et  
spinam: ac sepe mutare: brachia, cruraq; perfricare: demittere totum  
hominem in calido oleo. Si dolor nō quiescat, etiam in aluum ex par-  
te inferiore tres, aut quattuor cyathos calidi olei dare. Vbi per hæc  
consecuti sumus ut iam ex inferiore parte spiritus transmittatur: offer-  
re potui mulsum tepidum non multum. nam ante magna cura uitan-  
dum est, ne quid bibat. si id commode assu: adijcere sorbitionem. Vbi  
dolor, et febricula quierunt: tum demum uti cibo pleniore: sed neq;  
instante, neq; duro, neq; ualido: ne intestina adhuc imbecilla lædan-  
tur. potui uero nihil præterquam puram aquam. nam siue quid ui-  
nolentum, siue acidū est: id huic morbo alienum est. Ac postea quoq;  
uitare oportet balneum, ambulationem, gestationem, ceterosq; corpo-  
ris motus. Nam facile id malum redire consuevit: et siue cum fri-  
gus subit: siue aliqua iactatio, nisi bene iam confirmatis intestinis, re-  
uertitur.

Aurelij Cor.

h



*S* autem morbus, qui in intestino plenior est: in ea maxi-  
 me parte est: quam certam esse proposui. Vehemens infla-  
 tio, uehementes dolores dextra magis parte, intestinum  
 quod uerti uidetur, propè spiritum elidit. In plerisque post  
 frigora, cruditatesque oritur: deinde quiescit: & per ætatem sæpe repe-  
 tens sic cruciat, ut uitæ spacio nihil demat. Vbi is dolor cœpit, admo-  
 uere sicut, & calida fomenta oportet: sed primo lenta, deinde uali-  
 diora: simulque frictiones. ad extremas partes id est crura, brachiaque  
 materiam reuocare. Si discussum non est: qua dolet cucurbitulas sine  
 ferro defigere. Est etiam medicamentum eius rei causa comparatum,  
 quod *κωκινόν* nominatur. id se repperisse Cassius gloriabatur. Ma-  
 gis prodest potui datum. sed impositum quoque extrinsecus digerendo  
 spiritum, dolorē leuat. nisi finito uero tormento, recte neque abusus, neque po-  
 tio assumitur. Quo uictu sit utendum qui hoc genere tentantur: iam  
 mihi dictum est. Confectio medicamenti, quod *κωκινόν* nominatur: ex  
 his constat. Costi, anesi, castorei singulorum Pondo denariorum trium. petro-  
 selini. P. denariorum. III. piperis longi, et rotundi singulorum. P. .II.  
 papaueris lachrymæ, iunci rotundi, myrræ, nardi singularium. P. VI.  
 quæ melle excipiuntur. id autem & deuorari potest: & ex aqua ca-  
 lida sumi.

## De torminibus, id est dysenteria. Caput. XV.

*P*roxima his inter intestinorum mala, tormina esse consue-  
 uerunt: *δυσεντερία* græce uocatur. intus intestina exul-  
 cerantur. ex his cruor manat. Isque modo cum stercore  
 aliquo semper liquido, modo cum quibusdam quasi muc-  
 cosis excernitur. interdum simul quedam carnosæ descendunt. Fre-  
 quens deiciendi cupiditas, dolorque in ano est. Cum eodem dolore exi-  
 guum aliquid emittitur. atque eo quoque tormentum intenditur. idque post  
 tempus aliquod leuatur. exiguaque requies est. somnus interpellatur. fe-  
 bricula oritur. longoque tempore id malum cum inueterauerit, aut tollit  
 hominem: aut etiam si finitur, excruciat. Oportet in primis conquie-  
 scere. si quidem omnis agitatio exulcerat. deinde ieiunium sorbere uini  
 cyathum: cui contrita radix quinque folij sit adiecta. imponere cata-  
 plasmata super uentrem, quæ reprimunt. quod in superioribus uen-  
 tris morbis non expedit. quotiensque desidit, subluere aqua calida: in  
 qua decoctæ uerbenæ sint. portulacam uel coctam, uel ex dura muria  
 edisse. cibos, potionesque eas, quæ astringunt aluum. Si uetustior morbus est,



ex inferioribus ptibus tepidū infundere uel ptisanæ cremorē, uel lac,  
uel adipem liquatam, uel medullā cernuinam, uel oleum, uel cum rosa  
buthirum, uel cum eadē album crudum ex ouis, uel aquam: in qua  
lini semen decoctum sit: uel si somnus non accedit, uitellos cum aqua,  
in qua rosæ floris folia cocta sint. Lenant enim dolorē hęc, & mitio  
ra ulcera efficiunt: maximēq; utilia sunt, si cibi quoq; secutū fastidiū  
est. Themijon muria dura quā asperrima sic utendū memorie prodi  
dit. Cibi uero esse debent, qui leniter uentrem destringant: & ea quæ  
urinam mouent. Si ea consecuta sunt, in aliā partem humorē auerten  
do prosunt. si non sunt cōsecuta, noxam augent. itaq; nisi in quibus  
prompte id facere consuerunt, non sunt adhibenda. Potui, si febricula  
est: aqua pura calida, uel ea, quæ ipsa quoq; astringat: dari debet. si  
non est: uinum lene austerū. Si pluribus diebus nihil remedia alia in  
uerunt, uetusq; iam uitium est: aquæ bene frigide potio assumptæ  
ulcera astringit: & initium secundæ ualeitudinis facit. sed ubi uenter  
suppressus est, protinus ad calidam potionem reuertendum est. Solet  
autem interdum etiam putris sanies, pessimiq; odoris descendere. solet  
purus sanguis profluere. si superius uitium est, aluus aqua mulsæ duci  
debet: tunc deinde eadem infundi, quæ supra cōprehensa sunt. Va  
lensq; est etiam aduersus ulcera intestinorum minij gleba, cum salis  
hemina contrita. si minus, mixta his aqua in aluum datur. Ac si san  
guis profluit, cibi, potionesq; esse debent, quæ astringant.

## De leuitate intestinorum. Caput. XVI.

X torminibus interdum intestinorū leuitas oritur: quæ conti  
nere nihil possunt: & quicquid assumptum est, imperfectū  
protinus reddunt. id interdum ægros trahit: interdum præ  
cipitat. In hoc utiq; adhibere oportet comprimentia: quo facilius tenen  
di aliquid intestinis uis sit. Ergo et super pectus ponetur sinapi: exul  
ceratq; cute malagma, quod humorē euocat: & ex uerbenis decoctis  
aqua desidat: & cibos, potionesq; assumat, quæ aluum astringunt: &  
frigidis utetur perfusionibus. Oportet tamen prospicere ne simul his  
omnibus admotis, uitium contrariū per immodicas inflationes oria  
tur. Iaculatim ergo firmari intestina debebunt, aliquibus cottidie adie  
ctis. Et cum in omni fluore uentris, tum in hoc præcipue necessariū  
est: non quoties libet desiderare, sed quotiens necesse est: ut hæc ipsa mora  
in consuetudinem ferendi oneris intestina deducat. Alterum quoq;  
quod æque ad omnes similes affectus ptinet, in hoc maxime seruan  
dū est, ut cum pleraq; utilia insuauia sint, qualis est plantago, et rubi,

Aurelij Cor.

h ij



## LIBER

et quicquid mali corio mixtum est: ea potissimum ex his dentur, quæ maxime æger uolet. Deinde si omnia ista fastidiet ad exatandam cibi cupiditatem, interponatur aliquid minus utile: sed magis gratum. Exercitationes, frictiones huic quoque morbo necessariae sunt: & cum his sol, ignis, balneum, uomitus ut Hippocrati uisum est: etiam albo ueratro, si cætera parum proficiunt: euocatus.

## De lumbricis aluum occupantibus. Caput. XVII.

Nonnunquam autem lumbrici quoque occupant aluum: hi quoque modo ex inferioribus partibus: modo fœdus ore redduntur. Atque interdum latos eos, qui peiores sunt: interdum teretes uidemus. si lati sunt, aqua potui dari debet: in qua lupinum, aut cortex mori decoctus sit: aut cui adiectum sit contritum uel hyssopum, uel piperis acetabulum, uel scamoneæ paulum. uel etiam pridie cum multum allium ediderit: uomat. Posteroque die mali punice tenues radicales colligat, quantum manu comprehendet: easque contusas, in aquæ tribus sextariis decoquat, donec tertia pars supersit. Huc adijciat nitri paulum, & ieiunus bibat. Interpositis deinde tribus horis, duas potiones sumat: aut aquæ, uel muriæ duræ sic adiectæ. tum desidet subiecta calida aqua in pelue. si uero teretes sunt, qui pueros maxime exercent: & eadem dari possunt, & quedam leniora, ut contritum semen urticæ, aut brassicæ, aut cumini cum aqua, uel menta cum eadem, uel absinthium decoctum, uel hyssopum ex aqua mulsa, uel nasturcij semen cum aceto contritum. Edisse etiam & lupinum, & allium prodest: uel in aluum oleum subter dedisse.

## De tenasmo intestinorum morbo. Caput. XVIII.

Est autem aliud lenius omnibus proximis, de quibus super dictum est: quod τενεσμος græci uocant. id neque acutis, neque longis morbis annumerari debet: cum & facile tollatur: neque unquam per se ingulet. in hoc æque, atque in torminibus frequens, desidendi cupiditas est: æque dolor ubi aliquid excernitur. descendunt autem pituitæ, mucosque similia: interdum etiam leniter subruentia. sed his interponuntur nonnunquam ex cibo quoque recte coacta. desiderare oportet in aqua calida: sæpiusque ipsum manu nutrire: cui plura medicamenta idonea sunt, butyrum cum rosa, aqua ex aceto liquata, emplastrum id, quod τεροπραγματὸς græci uocant: rosa liquatum, alumen lana circumdatum, & ita appositum: eademque ex inferiore



ex inferiore parte indita, quæ torminum auxilia sunt, eadem uerbena decoctæ, ut inferiores partes foveantur: alternis uero diebus aqua, alternis leue, & austerum uinum bibendum est. Potio esse debet egelida, & frigida. proprior ratio uictus talis, qualem in tormina supra præcipimus.

## De uentris fluxu, &amp; curatione. Caput. XIX.

Euior etiam dum recens deiectio est, ubi & liquida aluus, & sæpius, quam ex consuetudine fertur. atq; interdum tolerabilis dolor est: interdum grauissimus: idq; peius est. sed uno die fluere aluum sæpe pro ualetudine est, atq; etiam pluribus: dum febris absit, & intra septimum diem id conquiescat. purgatur enim corpus: & quod intus læsurum erat, utiliter effunditur. uerum spatium periculosum est. Interdum enim tormina, ac febriculas excitat: uiresq; consumit. primo die quiescere satis est: neq; impetum uentris prohibere: si per se desit, balneo uti: paulum cibi capere. si mansit, abstinere non solum à cibo, sed etiam à potione. Postero die, si nihilominus liquida aluus est, æque conquiescere: paulum astringentis cibi sumere: tertio die in balneum ire: uehementer omnia præter uentrem perfricare: ad ignem lumbos, scapulasq; admouere: cibi uti, sed uentrem contrahentibus: uino non multum meraco. Si postero quoq; die fluat, plus edisse: sed uomere etiam ex toto, donec conquiescat. Contra sitim, famem, uomitum niti. uix enim fieri potest ut post hanc animaduersionem aluus non contrahatur. Alia uia est, ubi uelis suppressere: cenare: deinde uomere: postero die in lecto conquiescere. uespere ungi sed leniter. deinde panis circa selibrâ ex uino amineo mero sumere. tum assu aliquid, maximeq; auem, & postea uinum idem bibere aqua pluuiali mixtum: idq; usq; quintum diem facere: iterumq; uomere. Frigidam autem assidue potione esse debere contra priores auctores Asclepiades affirmavit, & quidem q̄ frigidissimam. Ego experimentis quæq; in se credere debere existimo calida potius, an frigida utatur. Interdum autem euenit, ut id pluribus diebus neglectum, curari difficilius possit. à uomitu oportet incipere: deinde postero die uespere tepido oleo ungi. cibum modicum assumere: uinum meracum quam asperrium: impositâ super uentrem habere cum cerato rutam. In hoc aut affectu corporis neq; ambulatione, neq; frictione opus est. uehiculo sedisse, uel magis et equo prodest. neq; enim ulla res magis intestina confirmat. Si uero etiam medicamentis utendum est: apertissimum est id quod ex pomis fit. Vindemia tēpore in grande uas coniungenda sunt pira, atq;

Aurelij Cor.

h iij



mala siluestria. si ea non sunt, pira tarentina uiridia, uel signina, ma-  
 la scandiana uel amerina, myrapia: hisq; adicienda sunt cotonea, &  
 cum ipsis corticibus suis puniat, sorba: & quibus magis utimur etiā  
 torminalia sic, ut hæc tertiam ollæ partem teneant. tum deinde ea  
 musto implenda est: coquendumq; id donec omnia quæ indita sunt, li-  
 quata in unitatem quādam coeant. Id gustui non insuauē est: & quā-  
 docunq; opus est, assumptum leuiter sine ulla stomachi noxa uentrē  
 tenet. duo, aut tria cochlearia uno die sumpsisse satis est. Alterum ua-  
 lentius genus est, myrti bacas legere: ex his uinū exprimere: id deco-  
 quere ut decima pars remaneat: eiusq; cyathū sorbere. tertium quod  
 quādoq; fieri potest, malum punicum exacuare: exemptisq; omnibus  
 seminibus, membranas quæ inter ea fuerunt iterum coniungere. tū in-  
 fundere cruda oua, rudiculāq; miscere: deinde malum ipsum super  
 prunam imponere. quod dum humor intus est, non aduritur. Vbi sic=  
 cum esse cœpit, remouere oportet: extractumq; cochleari, quod intus  
 est, edisse, aliquibus adiectis maius momentum habet. Itaq; etiam in  
 piperatum coniicitur: misceturq; cum sale, & pipere. est quid ex his  
 edendum. est pulicula etiam, cum qua paulum est fauo uetere co-  
 ctum sit, & lenticula cū malicorio cocta, rubiq; acumina in aqua  
 decocta, & ex oleo, atq; aceto assumpta, efficacia sunt. atq; ea aqua,  
 in qua uel palmulæ, uel malum cotoneum, uel arida sorba, uel rubi  
 decocti sunt, potata. quod genus significo, quotiens potionē dandam  
 esse dico: quæ astringat. Tritici quoq; hemina in uino amineo austero  
 decoquitur: idq; triticū ieiuno, ac sitienti datur. superq; id, uinū id sor-  
 betur. quod iure ualentissimis medicamentis annumerari potest. atq; etiā  
 potui datur uinū signinum, uel resinatum austerū, uel quodlibet au-  
 sterum. Cōtunditurq; cum corticibus, seminibusq; suis punicū malum,  
 uinoq; tali miscetur. idq; uel merum sorbet aliquis, uel bibit mixtum.  
 sed medicamentis uti nisi in uehementibus malis superuacuum est.

De uulue morbo, & curationibus. Caput. XX.

X uulua quoq; foeminis uehemens malum nascitur: proxi-  
 meq; ab stomacho uel afficitur hæc: uel corpus afficit. Inter-  
 dum etiam sic exanimat: ut tanquam comitiali morbo pro-  
 sternat. Distat tamen hic casus, eo quod neq; oculi uertuntur: nec spu-  
 me prosternunt: nec nerui distenduntur. sopor tantū est. idq; quibusdā  
 foeminis crebro reuertens perpetuū est. ubi incidit, si satis uirium est:  
 sanguis missus adiuuat. si parum est, cucurbitulæ tamen defigendæ  
 sunt in inguinibus. si diutius aut iacet, aut alioqui iacere consuevit:  
 admonere oportet naribus extinctum ex lucerna linamentum, uel



aliud ex his, quæ foedioris esse odoris retuli: quod mulierem excitet. Idemq; aquæ frigida perfusio effiat. adiuvatq; ruta contrita cū melle, uel ex cyprino ceratum, uel quodlibet callidum, & humidum cataplasma naturalibus pubetens impositum. Inter hæc est perfricare coxas, & poplites oportet. deinde ubi ad se redit, circūcidendum uini est in totum annum: et si casus idē non reuertitur. Frictione quotidie utendū totius quidem corporis: præcipue uero uentris, & poplitum. cibus ex media materia dandus. sinapi super inuē uentrem tertio quoq; aut quarto die imponendum, donec corpus rubeat. Si durities manet, mollire cōmode uidetur solanum in lac demissum: deinde cōtritum, & cera alba, atq; medulla ceruina cum irino, aut seuum taurinum, uel caprinum cum rosa mixtum. dandum potui etiam uel castoreum est, uel gē, uel anetum. Si parum pura est, purgatur iunco quadrato: si uero uulua exulcerata est, ceratum ex rosa fiet: & recēs suilla adeps, & ex ouis albū miscatur, idq; apponatur: uel album ex ouo cum rosa mixtum, adiecto: quo facilius consistat, contrita rosæ puluere. dolens uero ea sulphure suffumigari debet. At si purgatio nimia mulieri nocet, remedio sunt cucurbitulae cute incisa inguinibus uel etiam sub mammis admotæ. si maligna purgatio est, subiicienda sunt,

\*  
coeuntia. Id faciunt etiā

albæ oliuæ, & nigrum papauer cum melle assumptū, & gummi cū trito semine apij liquatum, & cum cyatho passi datum. Præter hæc in omnibus uesciæ doloribus idoneæ potiones sunt, quæ ex odoribus fiunt: id est spica nardi, croco, annamomo, cassia, similibusq; Idemq; et decocta lentiscus præstat. si tamen intolerabilis dolor est, & sanguis profluit, etiā sanguinis detractio apta est: aut certe coxis admotæ cucurbitulae cute incisa. At cum urina super potionum modū etiam sine dolore profluēs, maciem, & periculum facit, si tenuis est, opus est exercitatione, & frictione, maximēq; in sole, uel ad ignem. Balneum rarum esse debet: neq; longa in eo mora cibus comprimens. Vinum austerrum meracum, per æstatem frigidum, per hyemem egelidum, sed tantum quantum minimum sit. Infima, alius quoq; uel ducenda, uel lacte purganda est. Si crassa urina est, uehementior esse debet & exercitatio, & frictio: longior in balneo mora: cibus opus est teneris: uinum idē. In utroq; morbo uitanda oīa sunt, quæ urinam mouere consueuerūt.

De nimia profusione seminis ex naturalibus. Caput. XXI

St etiā circa naturalia uitū, nimia profusio seminis. quod sine uenere, sine nocturnis imaginibus sic fertur, ut interposito spatio tabe hominē consumat. In hoc affectu salutares sunt

h iij



uehemētes frictiones, perfusiones, natationesq; quā frigidissima. neq; cibi, nec potio nisi frigida assumpta. Vitare autem oportet cruditates: omnia infantia. nihil ex his assumere, quæ contrahere semen uidentur: qualia sunt, filigo, similia, oua, alia, amyllum, omnis atro glutinosa piper, eruca, bulbi, nuclei pinei. Neq; alienum est fouere inferiores partes, aqua decocta ex uerbenis compimentibus. ex hisdem aliqua cataplasmata imo uentri, inguinibusq; circumdare: præcipueq; ex aceto rutam uitare: & ne supinus obdormiat.

De coxarum morbis, & curationibus. Caput. XXII.

Vpere est ut ad extremas partes corporis ueniam: quæ articulis inter se conferuntur. initium à coxis faciam. Harū genus dolor esse consuevit. & q; hominem sæpe debilitat: & quosdā non dimittit. Eoq; id genus difficillime curatur: quod fere post longos morbos uis pestifera huc se inclinat. quæ ut illas partes liberat: sic hanc ipsam quoq; affectam præhendit. Fouendum primum aqua calida est: deinde utendum calidis cataplasmatibus. Maxime prodesse uidetur aut cum hordeacea farina, aut cum fici ex aqua decocta mixtus capparis cortex confusus, uel lolij farina ex uino diluto cocta, & mixta cum acida fece: quæq; refrigescunt, imponere noctu malagmata commodius est. Inulæ quoq; radix confusa, & ex uino austero postea cocta, & late super coxam imposita, inter ualentissima auxilia est: si ista non soluerunt, sale calido, & humido utendum est. Si ne sic quidem finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute admouendæ sunt cucurbitulæ: mouenda urina. Alius si compressa est, duccenda. Vltimum est, & in ueteribus quoq; morbis efficacissimum, tribus, aut quatuor locis super coxam cutem candentibus, feramentis exulcerare. Sed frictione quoq; utendum est, maxime in sole, & eodem die sæpius: quo facilius ea quæ œuundo nocuerunt, dirigantur. Eaq; si nulla exulceratio est, etiā ipsis coxis, sicut & cæteris partibus adhibenda est. Cum uero sæpe aliquid exulcerandum candenti ferramento sit, ut materia inutilis euocetur: illud perpetuum est, non ut primum fieri potest, huius generis ulcera sanare: sed ea trahere, donec id uitiū, cui per hæc opitulantiur, conquiescat.

De genuum doloribus, & cura. Caput. XXIII.

Coxis proxima genera sunt: in quibus ipsis nonnunquā dolor esse consuevit. In hisdem autem cataplasmatibus, cucurbitulisq; præsidium est: sicut etiam cum in humeris, alijsue cõ-



missurijs dolor aliquis exortus est. Equitare ei, cui genua dolent: in-  
missimum omnium est. Omnes autem eiusmodi dolores ibi inuetera-  
uerunt: uix citra uestionem finiuntur.

De articuloꝝ doloribus in manibus, pedibusq; Cap. XXIIII.

**I**N manibus, pedibusq; articuloꝝ uitia frequentiora, lon-  
gioraq; sunt. quæ in podagris, chiragris uel esse consuerunt.  
Ea raro uel castratos, uel pueros ante foemina coitum, uel  
mulieres, nisi quibus menstrua suppressa sunt: tentant. ubi sentiri cœ-  
perunt, sanguis mittendus est. Id enim inter initia statim factū sepe  
annuam: nonnunquam perpetuam ualeitudinem totā præstat. Quidā  
etiam cum asinino lotio epoto se eluissent: in perpetuum hoc malum  
euaserunt. Quidam cum toto anno a uino, mulso, uenere, sibi tempe-  
rassent: securitatem totius uitæ consecuti sunt. Idq; utiq; post primum  
dolorē seruandū est: etiam si quieuit. Quod si iam consuetudo eius  
facta est: potest quidem aliquis esse securior his temporibus: quibus do-  
lor se remisit. Maiorem uero curam adhibere debent hi, quibus id  
reuertitur. quod ferè uere, autumnō uel fieri solet. Cum uero dolor  
urget, manu gestari debet: deinde ferri. in ambulatione leui se dimo-  
uere. Et si podagra est, interpositis temporibus exiguis, inuicem mo-  
do sedere: modo ingredi. tum antequam cibum capiat, sine balneo lo-  
co calido leuiter perficari: sudare: perfundi aqua egelida: deinde ci-  
bum sumere ex media materia, interpositis rebus urinā mouentibus:  
quotiensq; plenior est, euomere. Vbi dolor uehemens urget: interest sine  
tumore is sit: an tumor cum calore, an tumor iam etiam obcaluerit.  
Nam si tumor nullus est: calidis fomentis opus est. Aquam marinam,  
uel muriam duram feruēscere oportet: deinde in peluē conijcere:  
Et cum iam homo pati potest, pedes demittere: superq; palam dare:  
Et uestimento tegere: paulatim deinde iuxta labrum ipsum ex eadē  
aqua leuiter infundere, ne calor intus destituat: ac deinde noctu catu-  
plasmata caleficientia imponere, maximeq; ibi scī radicem ex uino  
coctam. Sin uero tumor, calorq; est, utiliora sunt refrigerātia: recteq;  
in aqua quā frigidiſſima articuli continentur. sed neq; quotidie, neq;  
diu fit: ne nerui lædantur. imponendum uero est cataplasma, quod  
refrigeret. Neq; tamen in hoc cotidie permanendum: sed ad ea transē-  
undum quæ sic reprimunt, ut emolliant. Si maior est dolor, papaue-  
ris cortices in uino coquendi: miscendiq; cum cerato sunt: quod ex rosa  
factum sit. Vel ceræ, Et adipis suille tantundem unā liquandum, de-  
inde his uinum miscendum: atq; ubi quod ex eo impoſitum est, in ca-



## LIBER

luit, detrahendū, & subinde imponendum aliud est. Si uero tumores etiam obcaluerunt, & dolent, leuat sponsia: quæ imposita subinde ex oleo, uel aceto, uel aqua frigida exprimitur: aut pari portione inter se mixta, pix, cera, alumen. sunt etiā plura idonea manibus, pedibusq; malagmata. Quod si nihil superimponi patitur, id quod sine tumore est, fouere oportet sponsia: quæ in aquam calidam demittatur: in qua, uel papaueris corticis, uel cucumeris siluestris radix decocta sit. tum inducere articulis crocū cum succo papaueris, & ouillo lacte. at si tumor est, foueri qd debet aqua egelida: in qua lentiscus, alia uerberna ex reprimentibus decocta sit. induci uero medicamentum ex nucibus amaris, cum aceto tritis: aut ex cerusa, cui contrita herba maralis suauis sit adiectus. Lapis etiam, qui carnem exedit: quæ oxoproperon greci uocant: excisus sic ut pedes capiat: demissos eos, cum dolēt, retentosq; ibi lenare consuevit. ex quo in Asia lapidi asio gratia est. Vbi dolor, & inflammatio se remiserunt, quod intra dies quadraginta fit: nisi uitium hominis accessit: modicis exercitationibus, abstinentia, unctionibus lenibus utendum est sic, ut etiam acopo, uel liquido cerato cyprino articuli perfricentur. Equitare podagrias quoq; alium est. Quibus uero articularum dolor certis temporibus reuertitur: hos ante, & curioso uictu cauere oportet, ne inutilis materia corpori supersit: & crebriore uomitu, & si quis ex corpore metus est, uel alui ductione uti: uel lacte purgari. quod Erasistratus in podagrias expulit: ne in inferiores partes factus cursus pedes replet: cum euident sit omni purgatione, non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exinaniri. Ex quocunq; autem morbo quis inualescit, si tarde confirmatur: uigilare prima luce debet. nihilominus in lecto conuiescere. circa tertiam horam leuiter unctis manibus corpus permulcere. deinde delectationis causa quantum iuuat, ambulare circumdāsa omni negciosa cogitatione, uel actione. tum gestari diu. multa fricatione uti. loca, celum, cibos sepe mutare. Vbi triduo, quadri duo uel unum bibit: uno, aut etiam altero die interponere aquam. per hæc enim fiet, ne in uitia tabe inferenti incidat: & ut mature uires suas recipiat. Cum ex toto uero conualuerit, periculose uitæ genus subito mutabit: & inordinate aget. Paulatim ergo debebit, ommissis his legibus eò transire: ut arbitrio suo uiuat.



## LIBER QUINTVS.

Ixi de his malis corporis, quibus uictus ratio maxime subuenit. Nunc trāseundum est ad eā medicīnæ partem: quæ magis medicamentis pugnat. His multum antiqui auctores tribuerunt: Et Erasistratus, et hi, qui se ἐπερπινούς nominauerunt: præcipue tamen Erophilus, deducitq; ab illo uiri adeo, ut nullum morbi genus

sine his curarent. Multaq; etiam de facultatibus medicamentorum memoria prodiderunt. qualia sunt, uel Zenonis, uel Andriæ, uel Apollonijs. qui Mys cognominatus est. Horum autem usum ex magna parte Asclepiades non sine causa sustulit: et cum omni ferè medicamentis stomachū ledant, maliq; succi sint: ad ipsius uictus rationem potius omnem curam suam transtulit. Verū ut illud in plerisq; morbis utilius est, sic multa admodum corporibus nostris incidere consuerunt: quæ sine medicamentis ad sanitatem peruenire non possunt. Illud ante omnia scire conuenit, quod omnes medicīnæ partes ita innexæ sunt, ut ex toto separari non possint: sed ab eo nomen trahant, a quo plurimū petant. Ergo ut illa, quæ uictu curat, aliquando medicamentum adhibet: et illa, quæ præcipue medicamentis pugnat, adhibere etiam rationem uictus debet: quæ multum admodum in omnibus malis corporis proficit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant: ac sepe simplicia opitulentur, sepe mixta: non alienum uidetur ante proponere et nomina, et uires, et mixturas eorum: quo minor ipsius curationis ex sequentibus mora sit.

De simplicibus facultatibus quarūcūq; rerum, ex quibus medicamēta fiunt: et primo de his, quæ sanguinem supprimunt. Caput. I.

Anguinem supprimunt atramentum sutorium, quod græci χαλκούρεον appellant: chalcitis, acacia, et ex aqua liuum, thus, aloë, gummi, plumbum combustum, porrum, herba sanguinalis, creta uel cimolia, uel figularis, mīss, frigida aqua, uinū, acetum, alumen, melinum, squama et ferri, et aeris. atq; huius quoq; duæ species sunt, alia tantum aeris, alia rubri aeris.

Quæ uulnus glutinant. Caput. II.

Lutinant uulnus, myrra, thus, gummi, præcipueq; acanthinum, psyllēū, tragaantha, cardamomon, bulbi, lini semen, nasturtium, oui album, gluten, ichthyocolla, uitis alba, confusæ



# LIBER

testis suis cochleæ, mel coctum, spongia, uel ex aqua frigida, uel ex uino, uel ex aceto expressa. ex hisdem lana succida, si leuis plaga est: etiam araneū reprimunt, alumen & scissile, quod  $\sigma\chi\iota\sigma\delta\iota$  uocatur: & liquidum, melinū, auripigmentum, ærugo, chalcitis, atramentū sutoriū.

## Quæ concoquunt, & mouent pus. Caput. III.

Concoquunt, & mouent pus, nardum, myrrha, costus, balsamum, galbanum, propolis, styrax, thuris, & fuligo, & cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, seuum, adeps, oleum.

## Quæ aperiunt uulnera. Caput. IIII.

Uulnera aperiunt tanquam ora in corporibus, quod  $\sigma\upsilon\mu\alpha$  græce dicitur: cinnamomum, balsamum, panacis, iuncus quadratus, puleium, flos albae uiolæ, bdella, galbanum, resina terebinthina, & pinea, propolis, oleum uetus, piper, pyretrum, chamæpytis, uua aminia, sulphur, alumen, ruta semen.

## Quæ purgant. Caput. V.

Urgant, ærugo, auripigmentum, quod  $\alpha\pi\sigma\epsilon\upsilon\iota\upsilon\delta\iota$  à græcis nominatur. Huic autem & sandaracæ in omnia eadē uis: sed ualidior est squama æris, pumex, iris, balsamū, styrax, thus, thuris cortex, resina, & pinea, & terebinthina liquida, cœnâthe, lacerti sterces, sanguis columbæ, & palumbi, & hirundinis, ammoniacum, bdellium, quod in omnia idem quod ammoniacū potest: sed ualentius est abrotanum, ficus arida, coccum gnidium, scobis eboris, omphaciū, radícula, coagulum, sed maxime leporinū: cui eadem quæ cæteris coagulū facultas, sed ubiq; ualidior est: fel, uitellus crudus, cornu ceruinū, gluten taurinum, mel crudum, misyos, chalcitis, crocum, uua aminia, abrotanum, spuma argenti, galla, squama æris, lapis hæmatites, minium, costum, sulphur, pix cruda, seuum, adeps, oleum, ruta, porrum, lentiaula, eruū.

## Quæ rodunt. Caput. VI.

Odunt alumen liquidum, sed magis rotundum: ærugo, chalcitis, mysi, squama æris, sed magis rubri, æs combustum, sandaraca, minium synopicum, galla, balsamum, myrra, thuris cortex, galbanū, resina terebinthina humida, piper utrunq; sed rotundum magis, cardamomum, auripigmentum, calx, nitrum, & spuma eius, apij semen, narossi radix, omphacium, alcyonium, oleum ex amaris nucibus, allium, mel crudum, uinum, lentiscus, squama ferri, fel taurinum, scamonea, uua aminia, cynamomum, styrax, cicutæ semen, resina, narossi semen, fel, nukes amaræ, oleumq; earum, atraniæ tum sutorium, chrysocolla, ueratrum, cinis.



Quæ exedunt corpus. Caput. VII.

Exedunt corpus acaciæ suavis, hebenus, ærugo, squama æris,  
 e chryso colla, cinis cyprius, nitrum, cadmia, spuma argenti, hy-  
 pocistis, diphyges, sal, auripigmentum, sulphur, acuta, san-  
 daraca, salamandra, alcyonium, æris flos, chalcitis, atramentum suto-  
 rium, ochra, calx, acetum, galla, alumen, lac caprisici, uel lactucæ ma-  
 rine, quæ τὸ ὑμᾶλλος à græcis nominatur: alcyonium, fel, turturis su-  
 ligo, spodium, lenticula, mel, oleæ folia, marrubium, lapis hæmatites  
 & phrygius, & asius, & scissilis, mysi, uinum, acetum.

Quæ adurunt. Caput. VIII.

a Durunt auripigmentum, atramentum sutorium, chalcitis, mysi,  
 ærugo, calx, carta combusta, sal, squama æris, fex combusta,  
 myrra, steræ & lacerti, & columbæ, & palumbi, & hirundinis, pi-  
 per, coarum gnidium, allium, diphyges, lac utrunq; quod proximo ca-  
 pite supra comprehensum est: ueratrum & album, & nigrum, can-  
 tharides, corallium, piretrû, thus, salamandra, eruca, sandaraca, una  
 aminia, chryso colla, ochra, alumen scissile, ouillum steræ, oenanthe.

Quæ crustas ulceribus inducunt. Caput. IX.

Adem ferè crustas ulceribus tanquã igne adustis inducunt:  
 e sed præcipue chalcitis utiq; si cocta est: flos æris, ærugo, au-  
 ripigmentum, mysi, & id quo magis coctum.

Quæ crustas ulceribus resolvunt. Caput. X.

e Rustas uero has resoluit, farina triticea cum ruta, uel porro, aut  
 lenticula, cui mellis aliquid adiectum est.

Quæ discutiat ea, quæ in aliqua pte corporis coierunt. Caput. XI.

D discutieda uero ea, quæ in corporis parte aliqua coierunt:  
 a maxime possunt abrotanum, helenium, amaracus, alba ui-  
 ola, mel, lilium, sampsucus, cyprius, lac, fertula campana, ser-  
 pillum, cupressus, cedrus, iris, uiola purpurea, narcissus, rosa, crocum,  
 passum, iuncus quadratus, nardum, cinamonum, cassia, ammoniacum,  
 cera, resina, una aminia, spuma argenti, styrax, ficus arida, tragori-  
 ganus, lini, & narcissi semen, bitumen, sordes ex gymnasio, pyrites la-  
 pis aut molaris: crudus uitellus, amaræ nuces, sulphur.

Quæ euocant, & educunt. Caput. XII.

Vocat, et educit lad anum, alumē rotundū, hebenus, lini semē,  
 e omphacum, fel, chalcitis, bdeliū, resina terebinthina, & pi-  
 nea, propolis, ficus arida decocta, steræ columbæ, pumex,  
 farina lolij, grossi in aqua cocti, elaterium, lauri baccæ, nitrum, sal.



Quæ exasperata leuent. Caput. XIII.

**I** Enat id quod exasperatum est, spodium, hebenus, gummi, onium album, lac, tragacanthum.

Quæ carnem nutriunt, & ulcus implent. Cap. XIII.

**C** Arnem alit, & ulcus implet resina pinea, ochra actia, uel asterica, cera, butyrum.

Quæ molliunt. Caput. XV.

**M** Olliunt æs combustum, terra erethria, nitrum, papaueris lacryma, ammoniacum, bdellium, cera, seuum, adeps, oleum, ficus arida, sesamum, fertula campana, narcissi & radix, & semen, rosæ folia, coagulum, vitellus crudus, amaræ nucleæ, medulla omnis, stibi, pix, cholea acta, cicuta semen, plumbi recrementum, σκωπιον, μονόβολον græci uocant: panacis, cardamomum, galbanum, resina, una ammiu, styrax, iris, balsamum, sordes ex gymnasio, sulphur, butyrum, ruta.

Quæ autem purgant. Caput. XVI.

**I** Tem cutē purgat mel: sed magis si est cum galla, uel eruo, uel lenticula, uel marrubio, uel iride, uel ruta, uel nitro, uel ærugine.

De mixtura simplicium rerum, & de ratione ponderum, & quid malagma, et emplastrum, et pastillus inter se differant. Caput. XVII.

**E**xpositis simplicibus facultatibus dicendum est quemadmodum misceantur, quæ ex his fiant. Miscentur autem uariæ: neque huius ullus modus est, cum ex simplicibus alia demantur: alia adiçantur: iisdemque seruatis, ponderum ratio mutetur. Ita cum facultatum materia non ita multiplex sit: innumerabilia mixturarum genera sunt: quæ comprehendere si possent, tamen esset superuacuum. Nam et ydem affectus intra paucas compositiones sunt: & mutare eas cuilibet cognitis facultatibus facile est. itaque contentus his ero quas accepi uelut nobilissimas. In hoc autem uolumine eas explicabo: quæ uel desiderari in prioribus potuerunt: uel ad eas curationes pertinent: quas protinus hic comprehendam sic: ut tamē quæ magis cōia sunt, simul iungam. Si qua singulis, uel et paruis accommodata sunt, in ipsorum locum differam. Sed & antea sciri uolo, in uncia pondus denariorum septem esse. Unus deinde denarii pondus diuidi à me in sex partes id est sex uncias: ut idem in uncia denarii habeam, quod græci habent in eo, quem ὀβολὸν appellant. id ad nostra pondera relatum, paulo plus dimidio scrupulo facit. Malagmata uero, atque emplastra, pastilli: quos ὀνίχους græci uocant: cum plurima eadem habeant: differunt eo, quod malagmata maxime ex floribus, eorumque etiam succulis, emplastra, pastilli: magis ex quibus-



dam metallicis fiunt. deinde malagmata confusa abunde mollescunt. nam super integram cutem injiciuntur. Laboriose uero conteruntur ea, ex quibus emplastra pastilliq; fiunt: ne ledant uulnera cum imposita sunt. Inter emplastrum autem, & pastillum hoc interest: quod emplarum utiq; liquati aliquid accipit. in pastillo tantum arida medicamenta aliquo humore iunguntur. Tum emplastrum hoc modo fit. arida medicamenta per se teruntur. deinde mixtis his instillatur aut acetum: aut si quis alius non pinguis humor accessurus est. & ea rursum ex eo teruntur. Ea uero quæ liquari possunt ad ignem simul liquantur: & si quid olei misceri debet: tum infunditur. Interdum etiā aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Vbi facta sunt quæ sepe ratim fieri debuerunt: in unum omnia miscentur. At pastilli hæc ratio est. Arida medicamenta contrita humore non pingui aut uino, uel aceto coquantur, & rursum cocta inarescunt. Atq; ubi utendum est eiusdem generis humore, diluantur. tum emplastrum imponitur. pastillis illinitur, aut alicui molliori: aut cerato miscetur.

## De malagmatis. Caput. XVIII.

Malagma aduersum calidas podagras.

Is cognitis, primū malagmata subiiciam: quæ ferè non sunt refrigerandi, sed calefaciendi causa reperta. Est tamen quod refrigerare possit ad calidas podagras aptum. Habet gallæ & immature, & alterius coriandri seminis, citræ, lacrimæ aridæ, gummi, singulorum plenum acetabulum, cerati eloti, quod πικτομαστίχον græci uocant: selibram. Reliqua ferè calefaciunt. Sed quædam digerunt materiam: quædam extrahunt, quæ πικτομαστίχον uocantur. pleraq; certis magis partibus membrorum accomodata sunt.

Malagma ad materiam extrahendam.

I materia extrahenda est, ut in hydropico, in lateris dolore, in inapiente abscessu, in suppuratione quoq; mediocri, aptum est id quod habet resinæ aridæ, nitri, ammoniaci, galbani singulorum pondo, ceræ pondo. Aut in quo hæc sunt, æruginis rasæ, thuris, singulorum. P. \*. ammoniaci salis. P. VI. squamæ æris, ceræ, singulorum. P. VIII. resinæ aridæ. P. VII. aceti cyathus. Idem præstat cumini farina cum struthio & melle. P. II.

Malagma ad iecur dolens.

I iecur dolet: id in quo est balsami lacrimæ. P. XII. costi, cinamomi, cassiæ, corticis myrræ, croci, iunci rotundi, balsami, seminis iridis illiricæ, cardamomi, amomi, nardi, singulorum.



LIBER.

P.XVI. quibus adiūctur nardinum unguentum, donec cæcati crassitu-  
do sit. Et huius quidem recentis usus est. Si uero seruandum est, re-  
sinæ terebinthinæ. P.XVI. cæcæ. P.X. ex uino leni contunduntur, tum  
eo miscentur.

Malagma ad lienem.

T si lienis torquet, glādis, quam βάλανον græci uocant:  
a cortex, Et nitrum paribus portionibus contunduntur:  
respergunturq; aceto quā acerrimo. Vbi cæcati crassi-  
tudinem habet, linto antea in aqua frigida madefacto  
illinitur: Et sic imponitur: supraq; farina hordacea inijciatur: sed ma-  
nere ibi non amplius sex horis debet, ne lienem consumat. satiusq;  
est id bis, aut ter fieri. Communem autem Et iocineri, Et lieni,  
Et abscessibus, Et strumæ, parotidibus, articulis, calabus quoq; sup-  
purantibus, aut aliter dolentibus, etiam concoctioni uentris Lysias cō-  
posuit ex hyssopi, panacis, styracis, galbani, resinæ, singulorum. P.II.  
ammoniaci, bdellij, cære, seui taurini, iridis aridæ. P.III. caclirios ace-  
tabulo, piperis granis quadraginta. quæ contrita irino unguento  
temperantur.

Malagma ad laterum dolores.

D laterum autem dolores compositio est, Apollophanis, in  
qua sunt resinæ terebinthinæ, turis, fuliginis, singulorū  
P.III. bdellij, ammoniaci, iridis, seui nitulini, aut capri-  
ni à renibus sicut singulorum. P.III. Hæc aut eadem  
omnem dolorem leuant: dura emolliunt: mediocriter calefaciunt. Ad  
idem latus Andrææ quoq; malagma est: quod Et resoluit: educit humo-  
rem: pus maturat: ubi id maturum est, autem rumpit: ad cicatricem  
perducit. prodest impositum minutis, maioribusq; abscessibus: item ar-  
ticulis: ideoq; Et coxis: et pedibus dolentibus: item si quid in corpore  
collisum est, reficit: præcordia quoq; dura, Et inflata emollit: ossa ex-  
trahit. ad omnia deniq; ualet, quæ adinuare calor potest. id habet  
cære. P.I. uisci, sycamini, quam aliàs sycomerum uocat: lacrimæ sin-  
gulorū. P.XI. piperis Et rotundi, Et longi, ammoniaci, thimiamatis,  
bdellij, iridis illyricæ, cardamomi, amomi, xilobalsami, thuris mascu-  
li, myrræ, resinæ aridæ, singulorum. P.X. pyretri, coati gnidij, spumæ  
nitri, salis ammoniaci, aristolochiæ creticæ, radicis ex cucumere agre-  
sti, resinæ terebinthinæ liquidæ singulorum. P.XX. quibus adiūctur  
unguenti



unguenti irini quantum satis est ad ea mollienda, atq; coeunda.

Malagmata ad resoluenda quæ astricta sunt: & mollienda  
quæ dura sunt: & digerenda quæ coeunt.

Ræcipuum uero est ad resoluenda quæ astricta sunt: molliē  
da quæ dura sunt: digerenda quæ coeunt: id quod ad Poly-  
archum authorem refertur. habet iunci quadrati, cardamo-  
mi, thuris, fuliginis, ammoniæ, ceræ, resinæ liquidæ pares portiones.

Aliud malagma ad eadem.

Liud ad eadem Nilei crocomagmatis, quod quasi recremē  
tū eius est. P. XIII. ammoniaci, thymiamatis, ceræ, singulorū,  
P. XXX. ex quibus duo priora ex aceto teruntur: ceræ cū ro-  
sa liquatur: & tum omnia iunguntur.

Malagma moschi ad molliendum.

Proprie etiam dura mollit id, quod Moschi esse dicitur. habet  
galbani unciam, thuris fuliginis. P. Z. ceræ, ammoniaci, thy-  
miamatis trientes, picis aridæ. P. XII. aceti heminas tres.

Malagma medi ad digerenda quæ coeunt.

Fitur etiam ad digerēda quæ coeunt sub authore Me do,  
quod habet ceræ. P. Z. panacis. P. semis, squamæ æris, alumī-  
nis rotundi, item scissilis, singulorum. P. Z. plumbi combusti  
P. I. & semis.

Malagma Panthemī ad eadem.

De eadē Panthemus utebatur calcis. P. semis, sinapis contriti,  
item fœni græci, aluminis, singulorum. P. I. Seni bubuli. P.  
II. & semis.

Malagma ad strumas.

De strumam multa malagmata inuenio. Credo autem quo  
pius id malum est, minusq; facile discutitur: eo plura esse  
tentata, quæ in personis uarie responderunt. Andreas author  
est, ut hæc misceantur urticae seminis. P. XI. pipis rotundi, bdellij, gal-  
bani, ammoniaci, thymiamatis, resinæ aridæ, singulorū. P. XIII.

Aurelij Cor.

i



# LIBER

resinæ liquidæ, ceræ, pyretri, piperis longi, lactucæ marinæ seminis, sulphuris ignem non experti: quod ἀπυρον uocatur, fecis aridæ, acetæ, spumæ nitri, salis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radices ex cucumeri siluestri, resinæ, singulorum. P. XV. Quæ ex leni uino contunduntur.

## Aliud malagma ad id ualens.

Xpeditius ad idem fit: quod habet uiscæ, semeni, stercoreis, resinæ, sulphuris ignem non experti pares portiones. Et in quo est sulphuris. P. XI. lapidis quæ πυρίτην uocat. P. XIII. cumini acetabulum. Itē in quo est lapidis eiusdem pars una, sulphuris due partes, resinæ terebinthinæ partes tres.

## Malagma ad strumam, & phymata.

Rabis autem cuiusdam est ad strumam, & orientia tubercula, quæ φύματα uocantur: quod hæc digerit. Habet myrrhæ, salis ammoniaci, thuris, resinæ & liquidæ & aridæ, crocomagmatis, ceræ, singulorum. P. XI. lapidis eius: quem πυρίτην uocat. P. XIII. quibus quidam adijciunt sulphuris. P. II.

## Malagma ad strumam, & tubera, & carcinodas.

St etiam proficiens in struma, & in his tuberculis: quæ difficiliter concoquuntur, & in his: quæ καρυνόδαι uocantur: quod ex his constat. sulphuris. P. XII. nitri. P. XIII. myrræ. P. XVI. fuliginis thuris. P. semis, salis ammoniaci. P. Z. ceræ. P. I.

## Malagma protarchi ad parotidas, & fauam, & mala ulcera.

Rotarchus autem ad parotidas eaq; tubercula: quæ μελινώρια idest faui uel φύματα nominantur: item mala ulcera, pumicis, resinæ pineæ liquidæ, thuris fuliginis, spumæ nitri, iridis, singulorum. P. XVIII. cū ceræ. P. XVIII. miscebat: hisq; olei cyathum, & dimidium adijciebat.

## Malagma aduersus panum, & phymata.

T aduersus panum tum primum orientem: quod φύετλος græci uocant, & omne tuberculum: quod φύμα nominatur, misceatur ochra: quæ attice nominatur cum duabus partibus simile, hisq; contunditur: subinde mel instillatur: donec malagmatis crassitudo sit.



Malagma aduersus phymata.

Iscurtit etiā omne tuberculū: quod φύμα vocatur: id quod  
d habet calis, nūtri spumæ, piperis rotundi, singulorum. P. XI.  
galbani. P. XII. salis. P. XIII. quæ excipiuntur cerato ex ro-  
sa facto.

Malagma ad supprimendum omne quod abscedit.

Vpprimūtq; omne quod abscedit id: in quo est galbani, fabæ  
fresæ, singulorum. P. XI. myrræ, thuris, ex radice capparidis  
f s corticis, singulorum. P. XIII. Satisq; omnia abscedentia di-  
gerit murex combustus, & bene contritus, aceto subinde adiecto.

Malagma ad sanguinem supprimendum, & phymata.

T si satis sanguis subit: recte imponitur quod aduersus φύ-  
ματα quoq; potest. Constat ex his bdellij, styracis, ammoniaci,  
a galbani, resinæ & aridæ, & liquidæ pineæ. Item ex lenti-  
sa, thuris, iridis singulorum. P. XII.

Malagma ad carcinodas, & phymata lenienda.

απινώδαι uero, & φύματα commode his leniuntur: galbani,  
a uisci, ammoniaci, resinæ terebinthinæ in singulis. P. XI. seui  
taurini. P. semis, fecis combustæ quā maxima portione, diū  
id sticius non faciat: quā esse malagma oportet.

Malagma ad liuorem faciei contusæ.

Vod si facie contusa liuor subcrueuit: hæc cōpositio no-  
q cte & die imposita tollit. Aristolochiæ, thapsiæ, singulorū.  
P. XII. bdellij, styracis, ammoniaci, thymiamatis, galbani, re-  
sinæ aridæ, & ex lentisco liquidæ, thuris masculi, iridis illyricæ, ce-  
ra singulorum. P. XIII. Idem faba quoq; imposita proficiat.

Malagmata stomachiæ ad aperiendum.

Vnt etiam quedam malagmata: quæ σωματικά græci vo-  
cant: quoniam aperiendi vim habent. Quale est quod ex  
f his constat. piperis longi, strumæ nūtri, singulorum. P. XII  
erissimi. P. XIII. Quæ cum melle miscentur. Idoneaq; etiam strumæ  
aperiendæ sunt eius generis. Vehementiusq; ex his est id quod habet  
calis. P. XIII. piperis grana sex, nūtri, ceræ, singulorum. P. XX. mel-  
lis. P. Z. olei heminam.



# LIBER

Niconis malagma ad resoluendum,  
aperiendumq; ac purgandum.

n Iconis quoq; est quod resoluit: aperit: purgat. Habet alcyo-  
nium, sulphur, nitrum, pumicem paribus portionibus: qui-  
bus tantum picis, & ceræ adiçitur, ut fiat cerati crassitudo.

Malagma ad ossa, & nervos.

a D ossa autē Aristogenis fit ex his. sulphuris. P. XI. resinæ te-  
rebinthinæ, nitri spumæ, & ex scylla partis interioris, plu-  
bi eloti singulorū. P. XII. thuris fuliginis. P. XVIII. ficus ari-  
dæ quàm pinguiissimæ, seu taurini, singulorū. P. XVIII. ceræ. P. XXI.  
iridis macedonicæ. P. XVI. sesami fricti acetabulum. maximèq; ner-  
uis & articulis malagma conuenit.

Malagma Euthylei ad articulos, & ad omnem dolorem.

i Citur Euthylei est et ad articulos, & ad omnem dolorem,  
& ad uescicæ, & ad recentis cicatrice contractos articulos:  
quas ἀρύνιας græci nominant. quod habet fuliginis thuris  
acetabulum, resinæ tantundem, galbani sine surculis sesunciam, am-  
moniaci, bdellij, singulorū. P. XIII. ceræ. P. semis. Aliud item fit: quod  
habet iridis, ammoniaci, galbani, nitri singulorū. P. XXIII. resinæ li-  
quidæ. P. XVI. ceræ. P. XXVI.

Malagma Sasogoræ ad dolores articulorum.

a D dolores articulorum Sasogoræ, plumbi combusti, papau-  
ris lacrymæ, corticis hyoscyami, styracis, peucedani, seu, re-  
sinæ, ceræ pares portiones.

Chrysippi malagma, ad idem ualens.

c Chrysippi, resinæ liquidæ, sandaracæ, piperis singulorum  
P. XII. quibus ceræ paulum adiçitur.

Clesipontis malagma, ad idem ualens, & ad parotidas,  
& phymata, & strumam.

c Lesypontis ceræ creticæ, resinæ terebinthinæ, nitri quàm  
ruberrimi, singulorū. p. semis, olei cyathi tres. sed id nitrum  
ante



ante per triduum instillata aqua teritur, & cum sextario eius inco-  
quitur: donec omnis humor consumatur. Potest uero ea compositio etiā  
ad parotidas, phymata, strumam, omnemq; coitum humoris emolli-  
endum.

Malagma ad articulos.

- D articulos fici quoq; aridi partem nepetæ mixtam, uel unā  
taminiam sine seminibus, cum puleio recte aliquis imponit.

Malagma Aristonis aduersus podagras, & recētia phy-  
mata, & omnis dolores.

- Adem podagræ præsidia sunt. sed ad eam fit Aristonis  
quoq; quod habet nardi, cinnamomi, cassie, chameleontis, iūci  
rotundi, singulorum. P. XVIII. seu caprini ex irino liquati.  
P. XXX. iridis. P. XI. quæ in aceto quā acerrimo iacere per viginti  
dies debet. Idem autem etiam recentia phymata, doloresq; omnes di-  
scutit.

Theoni malagma ad pedum dolores.

- T Theonus ad pedum dolores seu à renibus partem tertiā,  
salis partes duas miscebat, hisq; membranulā illitam impo-  
nebat: tum super iniiciebat ammoniacū, thymiana in aceto liquatū.

Numenij malagma ad podagram cæteros  
que articulos induratos.

- T Numenius podagram, cæterosq; articulos induratos hoc  
molliebat. abrotani, rosæ aridæ, papaueris lacrimæ, singu-  
lorū. P. XIII. resinæ terebinthinæ. P. XIII. thuris, spumæ  
nitri, singulorum. P. XVIII. iridis, aristolochiæ, singulorum. P. XII.  
ceræ. P. XIII. gbus adjicitur cedri cyathus unus, olei laurei cyathi  
tres, olei acerbi sextarius.

Dexij malagma si quando callus in articulis increuit.

- I quando autem in articulis callus increuit Dexius docuit  
imponere calcis. P. XIII. cerussæ. P. XVIII. resinæ pineæ.  
P. XXX. piperis grana. XXX. ceræ. P. Z. Quibus dum con-  
tunduntur, hemina uini lenis instillatur.

De emplastris. Caput. XVIII.

- X emplastris autem nulla maiorem usum præstant: quā  
quæ cruentis protinus uulneribus iniunguntur, & uai gra-  
ci



# LIBER

uocant. Hæc enim reprimunt inflammationem nisi magna uis eam cogit, atq; illius quoq; impetum minuunt, tum glutinant uulnera: quæ id patiuntur: cicatricem hisdem inducunt. Constant autem ex medicamentis non pinguibus, ideoq; ἀλιπὲς nominantur.

Barbarum emplastrum nigrum, quod cruentis protinus uulneribus iniicitur.

Primum ex his est quod barbarum uocatur. Habet æruginis rase. P. XXII. spumæ argenti. P. XXX. aluminis, picis aridæ, resinæ pineæ aridæ, singulorum. P. XI. quibus adiunguntur olei, & aceti singulæ hemina.

Coacon emplastrum nigrum ad idem ualens.

Iterum ad idem: quod χόανον uocant: habet spumæ argenti P. XC. resinæ aridæ tantundem. Sed spuma prius ex tribus olei heminis coquitur. His duobus emplastris color niger est: qui ferè talis fit. ex pice, atq; resina. At ex bitumine nigerrimus. ex ærugine, aut æris squama uiridis. ex minio rubet. ex cerussa albus.

Basilicon emplastrum nigrum ad idem.

Aucæ admodum compositiones sunt, in quibus aliquid mixturæ uarietas nonat. Ergo id quoq; nigrum est. quod βασίλειον nominatur. Habet panacis. P. XI. galbani. P. XII, picis & resinæ, singulorum. P. XX. olei dimidium cyathum.

Smaragdinum emplastrum ad idem.

T quod peruiride est, smaragdinum appellatur. in quo sunt resinæ pineæ. P. XII. ceræ. P. XI. æruginis. P. Semis. turis fuliginis. P. Z. olei tantundem, aceti, quo fuligo, & ærugo in unum cogantur.

Emplastrum ruffum ad idem.

Est etiam coloris ferè ruffi: quod celeriter ad cicatricem uulnera perducere uidetur. Habet thuris. P. XI. resinæ. P. XII. squamæ æris. P. XIII. spumæ argenti. P. XXX. ceræ: P. XC. olei heminam.

Paracollecticum emplastrum ad idem.

Rætereæ est: quàm παρακολλητικὸν à glutinando uocant. Constat ex his. bituminis, aluminis scissilis. P. XIII. spumæ argenti. P. XXI. & olei ueteris hemina.



*Cephalicum emplastrum Philotæ capiti conueniens.*

Rætereæ sunt quædam generis eiusdem: quæ: quia capitibus fractis maxime conueniunt: κεφαλικὰ à græcis nominantur. philotæ compositio habet terræ erythrææ, chalcitidis. singulorū. p. XIII. myrrhæ, æris combusti. p. XX. ichhyocollæ, singulorū. p. XVI. æruginis rase, aluminis rotundi, mysi crudi, aristolochiæ, singulorum. p. XVIII. squamæ æris. p. XX. thuris masculi. p. XII. ceræ. p. I. rosæ & olei acerbi ternos cyathos: aceti quantum satis est: dum arida ex eo conteruntur.

*Emplastrum uiride ad idem ualens.*

Liud ad idem uiride: æris combusti, squamæ æris, myrrhæ ichhyocollæ, singulorum. p. XVI. mysi crudi, æruginis rase, aristolochiæ, aluminis rotundi, singulorum. p. XVIII. ceræ. p. XI. olei hemina, aceti quod satis sit.

*τετραφάρμακον emplastrum ad pus mouendum.*

Vri autem mouendo non aliud melius, quam quod expeditissimum est. τετραφάρμακον à græcis nominatur. habet partes portiones ceræ, picis, resinæ, seui taurini: si id non est, uitulini.

*Enneapharmachum emplastrum ad pus mouendum, & ad purgandum ualens.*

Lterum ad idē ἐννεαφάρμακον nominatur: quod magis purgat. constat ex nouē rebus, cera, melle, seuo, resinæ, myrrhæ, rosa, medulla uel ceruina uel uitulina uel bubula, hyssopo, butyro. Quorum ipsorum quoque pondera paria miscentur. Sunt autem quædam emplastra: quibus utriusque rei facultas est. quæ si singula habenda sunt, meliora sunt. sed in copia reijcienda sunt: his potius adhibitis: quæ proprie id, quod eo tempore opus est, consequuntur. Exempli causa duo proponam.

*Attalum emplastrum ad uulnera.*

Si igitur ad uulnera attalum: quod habet squamæ æris. p. XVI. fuliginis. p. XXV. ammoniaci tantundem. resinæ terebinthinæ liquidæ. p. XXXV. seui taurini tantundem, aceti heminas tres, olei sextarium.



# LIBER

## Iudæi emplastrum fracto capiti accomodatum.

**T** inter ea quæ fracto capiti accomodantur, habet quidam  
 id quod ad auctore iudæum refertur. Constat ex his: salis  
 P.  $\text{XIII}$ . squamæ æris rubri, æris combusti. singulorum. P.  
 $\text{XXII}$ . ammoniaci, thymamatis, thuris fuliginis, resinæ aridæ, singu-  
 lorum. P.  $\text{XVI}$ . resinæ colophoniacæ, ceræ, seu vitulini curati, singu-  
 lorum. P.  $\text{XXX}$ . aceti sesquicyathum, olei minus cyathum. τὸ βεραιον  
 μὲν γὰρ ἱεροὶ ἀπὸ τῆς ἐκείνης λέγουσι, cum ex seuo puta omnes mē-  
 branulæ diligenter exemptæ sunt, aut ex alio medicamento.

## Diadaphnidon emplastrum ad extrahendum.

**V**nt etiam quædam emplastra nobilia ad extrahendum.  
 Quæ ipsa quoque ἐπιδερμὶς nominatur. Quale est: quod,  
 ga lauri bacæ habet διὰ δερμίδων appellatur. in eo est, re-  
 sinæ terebinthinæ. P.  $\text{XX}$ . nitri, ceræ, picis aridæ, bacarum lauri, sin-  
 gulorum. P.  $\text{XXX}$ . olei paulum. Quotiens aut bacam, aut nucem, aut  
 simile aliquid posuero, scire oportebit, anteq̃ expendatur, ei summam  
 pelliculam esse demendam.

## Aliud διὰ δερμίδων ad extrahendum, & pus mouendum.

**L**iud eo nomine: quod puri quoque mouendo est, seu vitulini,  
 ammoniaci, thymamatis, picis, ceræ, nitri, bacarum lauri,  
 resinæ aridæ, aristolochiæ, pyretri pares portiones.

## Philocratis emplastrum ad extrahendum, & pus mouendum

**P**æter has est philocratis: quod habet salis ammoniaci. P.  
 $\text{XVII}$ . aristolochiæ. P.  $\text{XVIII}$ . ceræ, resinæ terebinthinæ. fu-  
 lignis thuris, singulorum. P.  $\text{XXV}$ . spumæ argenti. P.  $\text{XXXII}$ . Quibus  
 ut pus quoque moueat, iridis. P.  $\text{XIII}$ . & galbani. P.  $\text{XVI}$ . adiunguntur.

## πύ τῶδες emplastrum ad extrahendum.

**P**rimum tamen ad extrahendum est id: quod à similitudine  
 sordium πύ τῶδες ἱεροὶ ἀπὸ τῆς ἐκείνης λέγουσι, Habet myrræ, croci, iridis,  
 propolis, bdellij, capitulorum punici mali, aluminis & scissi-  
 lis, & rotundi. mysi, chalātis, atramenti sutorij cocti, panacis, salis am-  
 moniaci, nisci, singulorum. P.  $\text{XIII}$ . aristolochiæ. P.  $\text{XVIII}$ . squamæ  
 æris. P.  $\text{XXVI}$ . resinæ terebinthinæ. P.  $\text{LXXV}$ , ceræ, & seui, vel tan-  
 rini, vel hircini. P.  $\text{XC}$ .

## Emplastrum



## Emplastrum Hecæti ad extrahendum.

h Ecce quoque auctore emplastrum generis eiusdem fit ex his.  
galbani. P. XII. fuliginis thuris. P. XIII. picis. P. XVI. ceræ,  
et resinæ terebinthinæ, singulorum. XVIII. quibus paulu  
irini unguenti miscetur.

## Alexandrinum emplastrum uiride ad extrahendum.

u Alensque ad idem emplastrum uiride alexandrinum est.  
Habet aluminis scissilis. P. XVIII. salis ammoniaci. P. XV  
III. Z. squamæ æris. P. XXVI. myrrhæ, thuris singulorum. P.  
XXVIII. ceræ. P. CL. resinæ colophoniacæ, aut pineæ. P. CCC. olei  
hemina, aceti sextarium

## De emplastris exedentibus.

q Vædam autem sunt emplastra exedentia: quæ serræ græci  
uocant quale est id quod habet resinæ terebinthinæ, fuligi-  
nis, thuris, singulorum. P. Z. squamæ æris. P. XI. ladani. P.  
XII. aluminis tantundem, spumæ argenti. P. XIII.

Emplastrum quod exest corpus, et ossa resoluit, et  
super crescentem carnem coeret.

e Xest etiam uehementer corpus, atque ossa quoque resoluit, et  
super crescentem carnem coeret id quod habet spumæ ar-  
genti, squamæ æris, uncias singulas, nitri ignem non expti,  
lapidis asy, aristolochiæ. p. sextantes, ceræ resinæ terebinthinæ, thuris  
olei ueteris, atramenti sutorij, salis ammoniaci. P. semis, æruginis, rase.  
p. bessæ, aceti scyllitici hemina, uini aminei tantundem.

## Emplastra aduersus morsus, et alia recentiora uulnera.

f Vnt etiam aduersus morsus quedam acomodata quale est.  
Diogenis, nigrum: quod habet bituminis, ceræ, resinæ pineæ  
aridæ, singulorum. P. XXX. spumæ argenti. P. XC. olei sexta-  
rium. Aut in quo sunt. squamæ æris. P. XIII. cerussæ, et æruginis  
passæ singulorum. P. XVIII. ammoniaci. P. XXII. ceræ, resinæ pineæ.  
singulorum. P. XXV. spumæ argenti. P. XC. olei sextarium. Aut in  
quo sunt squamæ æris. P. XIII. galbani, P. XVI. cerussæ, et ærugi-  
nis rase, singulorum. P. XVIII. ammoniaci. P. XXII. ceræ, resinæ pi-  
neæ singulorum. P. XLV. spumæ argenti concoquitur.



## LIBER

*ἑμφορῶν emplastrum rubrum ad idem ualens.*

Utrum quoque emplastrum, quod ἑμφορῶν uocatur, huc  
 aptum est. Habet resinæ terebinthinæ. P. XII. galbani. P. X.  
 IIII. minij. sinopici. P. XVI. thuris fuliginis. P. XVI. ceræ  
 P. XVII. spumæ argenti. P. XLVI. olei ueteris heminam.

Aliud emplastrum ad idem ualens.

Tē id quod ex his constat. squamæ æris: thuris fuliginis: sin-  
 gulorū. P. XIII. galbani. P. XVI. sales ammoniaci. P. XXII.  
 Z. ceræ. P. XXXV. olei tribus heminis. Hæc autē alijs quoq;  
 recentioribus uulneribus recte imponuntur.

*λευκά emplastra non grauibz uulneribus accommodata, &  
 maxime senilibus.*

Vnt enim alba lenia: λευκά græci uocant. ferè nō grauibz ul-  
 neribus accommodata, præcipuèq; senilibus. Quale est qđ ha-  
 bet cerussæ. P. XXXXII. seu nitulini curati, & ceræ: singulo-  
 rum. P. XLVIII. olei heminas tres: ex quibus ea cerussa coquitur.

Elephantinum emplastrum.

Liud qđ hēt cerussæ. P. XXX. ceræ. P. XXXXV. olei hemi-  
 nā, aquæ sextariū. Quæ quotiens adiūtur cerussæ uel spu-  
 mæ argenti: scire licet illa ex his coquēda esse. Est autē ea p-  
 cādida cōpositio quæ supra posita est, ideoq; elephātina nominatur.

Lenia emplastra.

Enia quoq; quædam emplastra sunt, quas λιπαράς ferè græ-  
 ci nominant: ut id quod habet minij. P. XIII. spumæ argen-  
 ti. P. XXXV. ceræ et adipis suillæ. singulorum. P. XXXVII  
 nitellos quatuor.

Emplastrum lene.

Liā cōpositio generis eiusdem: ceræ, resinæ terebinthinæ,  
 singulorum. P. XVI. cerussæ. P. XVIII. spumæ argenti, plū-  
 bi recrementi, σκωριατ μόλυβδου græci uocant, singulorum.  
 P. XXX. cicini olei, & myrti, singulorum heminæ.

Archagathi emplastrum lene.

Ertia quæ ad auctorem Archagathum refertur, mysi cocti,  
 æris combusti, singulorum. P. XIII. cerussæ coctæ. P. XVIII  
 resinæ terebinthinæ. P. XX. spumæ argenti. P. XVI.



Emplastrum eiusdem generis ad leniendum apta.

Tiam num spumæ, argenti, ceræ, adipis suillæ singulorum  
P. XXXVII. nitelli cocti quatuor, rosæ hemina, Aut cerati ex  
oleo myrteo facti partes tres, adipis suillæ pars quarta, pau-  
lum ex plumbi recremento. Aut spumæ argenti selibra ex olei hēma-  
na, & aquæ marinæ altera cocta donec bullire desierit, cui paulum  
ceræ sit adiectum, aut pares portiones ceræ, seu, sibi, spumæ argenti,  
cerusæ.

De pastillis, & primo de his, qui ad recentia vulnera glutinā-  
da, sanandāq; apti sunt. Cap. XX.

Astilli quoq; facultates diuersas habent. sunt enim ad recen-  
tia vulnera glutinanda, sanandāq; apti. Qualis est qui ha-  
bet chalcitis, mysi, spumæ nitri, floris æris, gallæ, aluminis  
scissilis modice cocti, singulorum. P. XI. æris combusti, capitulorum ma-  
li punici, singulorum. P. XIII. Hunc oportet diluere aceto, sic, ubi vul-  
nus glutinandū est, illinere. At si nervosus aut musculosus is locus est,  
comodius est, cerato miscere sic, ut illius octo partes: nona huius sit.

Alius pastillus ad glutinanda vulnera.

Alius ad idem constat ex his, bituminis, aluminis scissilis, sin-  
gulorum. P. XI. æris combusti. P. XIII. spumæ argenti. P. X.  
XI. olei sextarium.

De sphragide pastillo: quæ Polybus conficit, ad glutinandū vulnus.

Ed longe polybi celeberrimus est. oppari's autē nominatur.  
qui habet aluminis scissilis. P. XI. Z. atramenti sutorij. P. X.  
II. myrrhæ. P. XV. aloes tantundē, capitulorum punici mali, fellis tau-  
rini, singulorum. P. XVI. Quæ contrita uino austero excipiuntur.

Pastillus ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, nari-  
bus, obscenis partibus, inflammationesq; eorum.

D ulcera sordida & nigritiem in auribus, naribus, obscenis  
partibus, inflammationesq; eorum, chrysocolle. P. XI. atra-  
menti sutorij, aluminis scissilis, singulorum. P. XII. halicacabi corticis.  
P. XIII. minij. P. XVI. spumæ argenti. P. XII. cerusæ. P. XXVI.  
Quæ ex aceto & coguntur, & ubi utendum est: diluuntur.



# LIBER

Pastillus andronis ad uenam inflamatam, ad naturalia sordida etiam cancro laborantia.

**a** Andronis uero est ad uenam inflamatam, ad naturalia sordida etiam cancro laborantia, gallæ, atramenti sutorij, myrrhæ singulorum .P. .xij. aristolochiæ, aluminis scissilis, singulorum .P. .xii. capitula punici mali .P. .xxxv. ex passo coacta, et cum usus exigit aceto, uel uino diluta, prout ualentius, aut lenius uitium est, cui medendum est.

Pastillus ad fissâ ani, uel ora uenarum fundentia sanguinem, uel cancerum.

**p** Proprie autem ad ani fissâ, uel ora uenarum fundentia sanguinem, uel cancerum, æruginis .P. .xii. myrrhæ .P. .xii. sibi, lacrymæ papaueris, acaciæ, singulorum .P. .xxvi. Quæ ex uino, et teruntur, et in ipso usu deliquantur.

Pastillus ad expellendum calculum cum urina.

**e** Expellere autem ex uesica cum urina calculum uidetur hæc compositio. castiæ, croci, myrrhæ, costi, nardi, cinnamomi, dulcis radicis, balsami, hyperici, pares portiones conteruntur. deinde uinum lene instillatur, et pastilli fiunt: qui singuli habeant .P. .xz. hiq; singuli quotidie mane ieiuno dantur.

De pessis. Caput. XXI.

**b** Acc tria compositionum genera: id est quæ in malagmatis, pastillis, emplastrisq; sunt. maximè, præcipueq; uarium usum præstant. Sed alia quoq; utilia sunt. ut ea quæ foeminis subiciuntur (πρωὺς græci uocant) Eorum hæc proprietas est. Medicamenta composita molli lana excipiuntur, eaq; lana naturalibus conditur.

Ad sanguinem euocandum.

**a** Ad sanguinem autem euocandum canneis duabus adijcitur natri .P. .xii. aut alij semen cõteritur. adijcitur myrrhæ paululum, et unguento susino miscetur, aut cucumeris siluestris pars interior ex lacte muliebri diluitur.

Ad uulnam molliendam.

**a** Ad uulnam molliendam oui uitellus, et foenum græcum, et rosa, et crocum temperantur. Aut elaterij .P. .xz. salis tantundem, uinæ taminæ .P. .xvi. nulle excipiuntur.



Alia pessi compositio ad idem ualens.

**a** Vt Boetho auctore, croci resinæ terebinthinæ, singulorum  
P. XIII. myrræ. P. X. ZZ. rosæ. P. XI. seui uitulini. P. X. Z.  
ceræ. P. XII. miscentur.

AD inflammationes uulvæ Numenij, Pessus.

Prima autem aduersus inflammationes uulvæ Numenij com-  
positio est: quæ habet croci. P. X. Z. ceræ. P. XI. butyri. P. X.  
VIII. adipis anserinæ. P. XII. uitellos coctos duos, rosæ  
minus cyatho.

Ad eijciendum è uulua infantem mortuum.

**f** I uero infans intus decessit: quo facilius eijciatur, malicorium  
ex aqua terendum: coq; utendum est.

Si mulier uitio locorum concidit, qua curatione utendum sit.

**f** I concidere uitio locorum mulier solet, cochleæ cum testis suis  
comburendæ, conterendæq;: deinde his mel adijciendum est.  
**si non compræhendit**, adeps leonina ex rosa mollienda est.

De medicamentis quibus aridis utimur, ad carnem super-  
crecentem exedendam. Caput. XXII.

**q** Vædam autem mixturæ medicamentorum sunt: quibus ari-  
dis neq; coactis utimur sic, ut inspergamus: aut cum aliquo  
liquido mixta illinamus: quale est ad carnem supercre-  
scentem exedendam. qd habet squamæ, fuliginis thuris singulorū. P. XI.  
æruginis. P. XII. Hæc aut eadem cum melle purgant ulcera: cum cera  
implent. Myrsi quoq; & gallæ si paribus portionibus misceatur, corpus  
consumunt: eaq; uel arida inspergere licet: uel excepta cadmia illinere.

Ad putrem carnem continendam ne ultra serpat, eamq;  
leniter exedendam plures compositiones.

**p** Vtrem uero carnem continet, neq; ultra serpere patitur, &  
leniter exest mel, uel cum lenticula, uel cum marrubio, uel  
cum oleæ folijs ante ex uino decoctis. Item sertula campana  
in mulso cocta, deinde contrita, aut calx cum cerato, aut amaræ nuxes  
cū allio sic, ut huius pars tertia sit: paulumq; his croci adijciatur. aut  
quod habet spumæ argenti. P. XVI. cornu bubuli combustum. P. XII.



# LIBER

aluminis scissilis, thuris, singulorum. p. xiiii. gallæ. p. xviii. aristolochiæ. p. xx. Vehementius idem facit etiam adurendo, auripigmenti cum chalcitide, aut nitro, aut calce, aut charta combusta. Item sal cum aceto. Vel ea compositio quæ habet chalcitidis, capitalorū punici mali, aloes, singulorum. p. xii. aluminis scissilis, thuris, singulorum. p. xiiii. gallæ. p. xviii. aristolochiæ. p. xx. vullis quantum satis sit ad ea cogenda. Vel catharides. p. xi. sulphuris. p. xi. lolij. p. xiii. Quibus adiungitur picis liquidæ quantum satis est. adiungendum uel chalcitis quoque cum resina, et ruta mixta. aut cum eadem resina: diphryges, aut uua aminia cum pice liquida. Idem uero possunt feces uini combustæ, et calcis, et nitri pares portiones, uel aluminis scissilis. p. xxz. thuris sandaracæ, nitri singulorum. p. xi. gallæ. p. xviii. aristolochiæ. p. xx. mellis quantum satis est.

## Hieræ compositio.

St etiam hieræ compositio. quæ habet myrrhæ, chalcitidis, singulorum. p. xii. aloes, thuris, aluminis scissilis, singulorum. p. xiiii. Aristolochiæ, gallæ immaturæ, singulorum. p. xviii. malicorij contriti. p. xx.

## Iudæi compositio.

St iudæi in qua sunt calcis partes duæ, nitri quæ ruberrima pars tertia. quæ urina impuberis pueri cogitur, donec strigmeti crassitudo sit. Sed subinde is locus: cui id illinitur: morificandus est.

## Iolæ compositio.

T iolas, chartæ combustæ, sandaracæ, singulorum. p. xi. calcis. p. xii. auripigmenti tantundem miscbat.

Ad sanguinis profluvia, uel ex membrana cerebri, uel alijs locis et ad cancerum, et ad inducendam cicatricem, et ad coerendam carnem crescentem.

I uero ex membrana: quæ super cerebrum est, profluit sanguis, uittellus combustus et contritus inspergi debet. Si alio loco sanguinis profluium est, auripigmenti, squamæ æris, singulorum. p. xi. sandaracæ. p. ii. marmoris cocti. p. xiiii inspergi debet. Eadem cancro quoque obsistunt. Ad inducendam cicatricem, squamæ æris, thuris fuliginis, singulorum. p. xii. calcis. p. p. iiii. Eadem incrementem quoque carnem coercent.



## Timei compositio ad ignem sacrum, uel cancerum.

Imeus autem ad ignem sacrum, uel ad cancerū, his utebatur.  
 e Myrræ. P. XII. thuris, atramētī sutorij, singulorum. P. XIII.  
 sandaracæ, auripigmētī, squamæ æris, singulariū. P. XIII.  
 galle. P. XVI. cærussæ combustæ. P. XVIII. Eadem uel arida insper-  
 sa, uel melle excepta idem præstant.

## Ad sternutamenta excitanda.

f Sternutamenta uero, uel albo ueratro, uel struthio coniecto  
 in nares excitantur, uel his mixtis: piperis, ueratri albi, sin-  
 gulorum. P. XZ. castorei. P. X. spumæ nitri. P. XI. struthij. P. XIII.

## Gargariationes quibus fieri debeant.

g Argariationes autem aut lenandi causa fiunt, aut reprimē-  
 di, aut euocandi. Lenāt lac, cremor uel ptisanæ, uel furfurū.  
 Reprimūt aqua, in qua uel lenticula, uel rosa, uel rubus, uel  
 cotoneum malum, uel palmulæ decoctæ sunt. Euocant, sinapi, piper.

## De antidotis, &amp; quibus malis opitulentur. Caput. XXIII.

a Nitidota raro, sed præcipue interdum necessaria sunt: quia  
 grauissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem datur col-  
 lisis corporibus uel per ictus, uel ubi ex alto deciderunt, uel  
 uiscerum, laterum, faucium, interiorumq; partiū doloribus. Maxime  
 autem desideranda sunt aduersus uenena uel per morsus, uel per ci-  
 bos, aut potiones nostris corporibus inserta.

## Compositio antidoti.

Num est: quod habet lacrymæ papaueris. P. XZ. acori, ma-  
 u lobathri. P. XV. iridis illiyrice, gummi, singulorum. p. XII.  
 anesi. p. XIII. nardi gallica, foliorum rosæ aridorū, carda-  
 momi, singulorum. p. p. IIII. petroselinī. P. p. IIII. Z. folij. p. p. V. castæ  
 nigræ, silis, bdellij, balsami, seminis piperis albi, singulorum. P. XZ. sty-  
 racis. P. V. Z. myrræ, oppoponacis, nardi syrii, thuris masculi, hypocisti-  
 dis suci, singulorū. P. XVI. castorei. P. XVI. costi, piperis albi, galbani,  
 resinæ terebinthine, croci floris, iunci rotundi, singulorum. P. VI. Z.  
 dulcis radicis. P. p. VIII. Z. Quæ uel melle, uel passo excipiuntur.



LIBER

Aliud antidotum Ambrosia nominatum, quod Zopyrus  
Ptolemæo regi composuit.

Lterum quod Zopyrus regi Ptolemæo dicitur composuisse,  
atq; Ambrosia nominasse: ex his constat. Costi, thuris masca-  
li, singulorū. P. p. V. piperis albi. P. p. Z. floris iunci rotundi. P.  
II. cinnamomi. P. p. III. casia nigræ. P. p. IIII. croci alij. P. p. IIII.  
Z. myrræ quàm stacten nominat. P. p. V. nardi indici. P. p. V. Z. quæ  
singula contrita melle cocto excipiuntur. Deinde ubi utendum est id:  
quod ægyptiæ fabæ magnitudinem impleat, in potione uini diluatur.

Antidotum Mithridatis.

Obilissimum autem est Mithridatis, quod cotidie sumendo  
rex ille dicitur aduersus uenenorum pericula tutum corpus  
suū reddidisse. in quo hæc sunt, costi. P. p. S. Z. acori. P. p. V.  
hypici, cumini, sagpeni, agaciæ suci, iridis illyricæ, cardamomi, singu-  
lorū. P. p. II. anesi. P. p. III. nardi gallici, gentiæ æradias, aridorū ro-  
sæ foliorum, singulorū. P. p. IIII. papaueris lacrymæ, petroselinī, sin-  
gulorū. P. p. IIII. Z. casia, filis lolij, piperis longi, singulorū. p. XVI.  
syracis. p. V. Z. castorei, thuris hypocistidis suci, myrræ, opopenacis, sin-  
gulorum. p. VI. Z. malobathri folij. XVI. floris iunci rotundi, resinæ  
terebinthinæ, galbani, dauci cretica seminis, singulorū. P. p. VI. Z. nar-  
di, opobalsami, singulorū. P. p. VI. Z. thlappis. p. XV. ZZ. radices pon-  
ticæ. p. VII. croci, Zinziberis, cinnamomi, singulorum. p. XVIII. r.  
Hæc contrita melle excipiuntur: Et aduersus uenenum, quod magni-  
tudinem nucis græcæ impleat, ex uino datur. In cæteris autem affe-  
ctibus corporis pro modo eorū, uel quod ægyptiæ fabæ, uel quod Erui  
magnitudinem impleat, satis est.

DE acopis. Caput. XXIII.

Copa quoq; utilia nervis sunt: quale est quod habet floris  
iunci rotundi. p. II. ZZ. costi, iunci quadrati, lauri bacarum,  
ammōiaci, cardamomi, singulorū. p. p. IIII. Z. myrræ, æris  
cōbusti singulorū. P. p. VII. iridis illiricæ, cere singulorū. P. p. XIII.  
alexadrini calami, iunci rotundi, aspalathi, xylobalsami, singulorum  
P. XVIII. seu. P. I. unguenti irini cyathum.

Acopum aīōdes nervis utile.

Lterum quod aīōdes uocant, hoc modo fit: ceræ. P. Z. olei  
tantundem, resinæ terebinthinæ ad nucis iuglandis magni-  
tudinem simul incoquuntur: deinde infusa in mortario te-  
runtur:



runter, instillaturq; subinde quàm optimi mellis acetabulum: tum iri  
ni unguenti, & rosæ terni cyathi.

Ex pisa ad ulcera purganda, & implenda.

Ex pisa autem græci vocant, liquida quæ illinuntur. Qua-  
le est quod fit ad ulcera purganda, & implenda, maximo  
inter nervos paribus portionibus inter se mixtis, butyri, me-  
dulle vitulinæ, seu vitulini, adipis anserinæ, ceræ, mellis, resinæ tere-  
binthinæ, rosæ, olei cicini. Quæ separatim omnia liquantur: deinde  
liquida miscentur, & tum simul teruntur. Et hoc quidem magis pur-  
gat. Magis uero emollit: si pro rosâ cypirus infunditur.

Ad sacrum ignem.

D sacrum ignem spumæ argenti. P. XVI. corni bubuli com-  
busti. P. XII. conteruntur, adijciuntq; invicem vinum, & id  
quod specialiter sil vocatur, & myrtæ: donec utriusq; terni  
cyathi coniiciantur.

De catapotijs. Caput. XXV.

Catapotium ad somnum accersendum, & levationem  
doloris, & simul ad concoquendum.

A tapotia quoq; multa sunt, varijsq; de causis fiunt. αὐτοδυνα  
vocant quæ somno dolorem leuant. Quibus uti: nisi nimis  
necessitas urget, alienum est. Sunt enim ex vehementibus me-  
dicamentis, & stomacho alienis. Potest tamen etiam ad concoquendū:  
quod habet papaveris lacrymæ, galbani, singulorum. P. XI. myrrhæ,  
castorei, piperis, singulorum. P. XII. Ex quibus quod erui magnitudi-  
nem habet, satis est deuorasse.

Catapotium valentius ad somnum.

Iterum stomacho peius, ad somnū valentius ex his fit, mā-  
dragoræ. P. Z. apij seminis, item hyoscyami seminis, singulo-  
rū. P. XIII. Quæ ex uino teruntur. Vinum autem eiusdē  
magnitudinis: quæ supra posita est: abunde est sumpsisse.

Catapotium ad plurimos dolores per somnum leniendos.

Iue autem capitis dolores, siue ulcera, siue lippitudo, siue  
dentes, siue spiritus difficultas, siue intestinorum tormenta,  
Aurelij Cor. k



# LIBER

sive inflammatio uulue est, siue coxa, siue iecur, aut lienis, aut latus torquet, siue uitio locorum aliqua prolabitur, & obmutescit, occurrat dolori per quietem eiusmodi catapotium. Silis, acori, rutæ siluestris seminis, singulorum. P. p. I. castorei, cinnamomi, singulorum. P. XII. papaueris lacrymæ, panaces, radices mandragoræ, malorum aridorum, iun. rotundi floris, singulorum. P. p. II. piperis grana. LVI. Hæc per se contrita, rursus instillato subinde passo, simul omnia teruntur, donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum aut deuoratur, aut aqua diluitur, & potui datur.

Catapotium aliud, ad multa ualens.

Vin etiam siluestris papaueris, cum iam ad excipiendam lachrymam maturum est, manipulus qui manu comprehendi potest, in uas demittitur, & superinfunditur aqua: quæ id contegit, atq; ita coquitur. Vbi iâ bene manipulus is coctus est, ibidem expressus proijcitur, & cum eo humore passi pari mensura misceatur, inferuetq; donec crassitudinem sordium habeat. Cum infrixit, catapota ex eo fiunt ad nostræ fabæ magnitudinem, habentq; usum multiplicem. Nam & somnū faciunt uel per se assumpta, uel ex aqua dati, & aurium dolores leuant, adiectis exiguo modo rutæ succi, ac passi. Et tormina supprimunt ex uino liquata, & inflammationem uulue coercet mixta cerato ex rosa facto: cum paulum his croci quoq; accessit, & ex aqua fronti inducta, pituitam in oculos decurrentem tenent.

Catapotiū ad inducendū somnū: quod uulua dolens prohibuit.

Item si uulua dolens somnum prohibuit, croci. P. XII. anesi, myrrhæ, singulorū. P. p. I. papaueris lacrymæ. p. p. XIII. cicutæ seminis. p. XVIII. miscentur, excipiunturq; uino uetere, et quod lupini magnitudinem habet in tribus cyathis aquæ diluitur. Id tamen in febre periculose datur.

Ad iecur sanandum.

Ad sanandum iecur nūri. P. X. Z. croci, myrrhæ, nardi gallici, singulorum. P. XI. melle excipiuntur, daturq; quod ægyptiæ fabæ magnitudinem habeat.

Ad finiendos dolores lateris.

Ad lateris dolores finiendos, piperis, aristolochiæ, nardi, myrrhæ pares portiones.



Ad thoracis dolores finiendos.

D thoracis, nardi. P. XI. thuris, casia, singulorū. P. XIII. myrrhæ, cinnamomi, singulorū. P. XVI. croci. P. XVIII. resinæ terebinthinæ quadrans, mellis hemina tres.

Catapotium Athenionis ad tussim.

D tussim Athenionis, myrrhæ, piperis, singulorum. P. p. XI. castorei, papaueris lacrymæ, singulorum. P. XI. Quæ separatim contusa postea iunguntur, et ad magnitudinem fabæ nostræ bina catapotia mane, bina noctu dormituro dantur.

Catapotium Heraclidis tarentini ad tussim, et somnum.

I tussis somnum prohibet, ad utranq; Heraclidis tarentini croci. P. XI. cinnamomi. castorei, papaueris lacrymæ, singulorū. P. XI. myrrhæ, pipis longi. costi, galbani, singulorū. P. Z.

Catapotium ad purganda ulcera in faucibus tussientibus.

Vod si purganda sunt ulcera in faucibus tussientibus, panaces, myrrhæ, resinæ terebinthinæ, singulorum. P. X. galbani. P. Z. hyssopi. P. Z. conterenda sunt. huiusq; hemina mellis adiungenda, et quod digito excipi potest, deuorandum est.

Collice castij medici.

Collice uero Castij ex his constat, croci, anesi, castorei, singulorū. P. XIII. petroselin. P. XIII. piperis et longi, et rotundi, singulorum. P. XV. papaueris lacrymæ, iunci rotundi, myrrhæ, nardi, singulorum. P. XVI. Quæ melle excipiuntur. id autem et deuorari potest, et ex aqua calida sumi.

Ad infantem mortuum, aut secundas expellendas.

Infantem uero mortuum, aut secundas expellit aquæ potio, cui salis ammoniaci. P. XI. aut cui dictami cretici. P. XI. adiectum est.

Laborantibus ex partu quid dari debeat.

Ex partu laborantibus erisimum ex uino tepido ieiunæ dari debet.

Ad adiuvandam uocem.

Ocem adiuvat thuris. P. XI. in duobus cyathis uini datum.

Aduersus difficultatem urinæ.

Duersus urinæ difficultatem, piperis longi, castorei, myrrhæ, galbani, papaueris lacrymæ, croci, costi uncie singula, styraeis, resinæ terebinthinæ. P. sextantes, mel, absinthij cyathus. Ex quibus ad magnitudinem fabæ ægyptiæ et mane, et conato dari debet.

k ij



Arteriace uero hoc modo fit: casia, iridis, cinnamomi, nardi, myrrhae, thuris, singulorum. P. ꝯ. I. croci. P. ꝯ. I. piperis grana. XXX. ex passi tribus sextarijs decoquantur: donec mel lis crassitudo his fiat. Aut croci, myrrhae, thuris, singulorum. P. ꝯ. I. coniunguntur in passi eundem modum, eodemq; modo decoquantur. Aut eiusdem passi heminae tres usq; eo coquantur: donec extracta inde gutta indurescat, & adiungitur trita casia. P. ꝯ. I.

De quinque generibus noxarum corporis, & primo de uulneribus quae maxime per tela inferuntur. Cap. XXVI.

Ubi facultates medicamentorum proposuerim, genera in quibus noxa corpori est: proponam. Ea quinque sunt. Cum quid extrinsecus laesit: ut in uulneribus. Cum quid intra se ipsum corruptum est, ut in cancro. Cum quid innatum est, ut in uesica calculus. Cum quid increuit, ut uena quae intumescens in uaricem conuertitur. Cum quid deest, ut cum curata pars aliqua est. Ex his alia sunt, in quibus plus medicamenta. Alia in quibus plus manus proficit. Ergo dilatis his: quae praecipue scalpelli, et manu postulant: nunc de his dicam, quae maxime medicamentis egent. Diuidam autem hanc quoque curandi partem sicut priorem. Et ante dicam, de his quae in quolibet partem corporis incidunt. Tum de his, quae certas partes infestant. Incipiam a uulneribus. In his autem ante omnia scire medicus debet: quae insanabilia sunt: quae difficile curatione habeant: quae promptiores. Est. namque prudentis hominis: primum eum, qui seruari non potest, non attingere, nec subire speciem eius ut occisi, quem fors ipsius peremit. Deinde ubi grauis metus sine certa tamen desperatione est, indicare necessarijs periclitantis in difficili rem esse: ne si uicta ars malo fuerit, uel ignorasse, uel fefellisse uideatur. Sed ut haec prudenti uiro conueniunt, sic rursum histrionis est, paruam rem attollere, quo plus praestitisse uideatur. Obligatoriq; aequum est confessione propterea rei: quo curiosius etiam circumspiciat, ne, quod per se exiguum est malum, maius curantis negligentia fiat.

Quae uulnera insanabilia sint.

Eruari non potest, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui iocineris portae, cui in spina medulla percussa est, cuique aut pulmo medius, aut ieiunum, aut tenuius intestinum, aut uentriculus, aut renes uulnerati sunt: cui uel circa fauces grandes uenae, uel arteriae praecise sunt.



*Quæ vulnere difficilē curationem habeant.*

Ita autem ad sanitatē perueniunt: quibus ulla parte pulmo,  
 aut iocineris crassum, aut membrana, quæ continet cerebrū,  
 aut lienis, aut uulua, aut uesica, aut ullum intestinum, aut se-  
 ptum transversum vulneratū est. Hi quoq; in præcipiti sunt: in qui-  
 bus usq; ad grandes intusq; conditas uenas in alis, uel poplitibus  
 mucro descendit. Periculosa etiam uulnera sunt, ubicunq; uenæ maio-  
 res sunt. quoniam exhaurire hominem profusione sanguinis possunt.  
 Idq; euenit non in alis tantum, atq; poplitibus, sed etiam in his ue-  
 nis, quæ ad anum, testiculosq; perueniunt. Præter hæc malum uulnus  
 est, quodcunq; in alis uel foeminibus, uel inanibus locis, uel in articu-  
 lis, uel inter digitos est. Item quodcunq; musculum, aut neruum, aut ar-  
 teriam, aut membranam, aut os, aut arthilaginem læsit.

*Quæ uulnera tutiorē curationem habeant.*

Utissimum omnium quod in carne est. Et hæc quidem loco  
 uel peiora uel meliora sunt. modo uero periculū facit quod-  
 cunq; magnum est.

*Observationes quædam et ætatis, et corporis, et uitæ,  
 et temporis in uulneribus.*

Liquid etiam in uulneris genere, figurāq; est. Nam peius  
 est quod etiā collisum, quā quod tantū discissum est. adeo  
 ut acuto quoq; quā retuso telo uulnerari commodius sit.  
 Peius etiā uulnus est, ex quo aliquid excisum est: ex quo ne cæro alia  
 parte abscissa, alia dependet: pessima quæq; plaga in orbē est: tutissi-  
 ma quæ lineæ modo recta est. Quo deinde propius huic, illi uel figu-  
 ræ uulnus est: eo uel deterius, uel tolerabilius est. Quin etiam confert  
 aliquid et ætas, et corpus, et uitæ propositum, et anni tempus, quia  
 facilius sanescit puer uel adolescens, quā senior: ualens quā infir-  
 mus: neq; nimis tenuis, neq; nimis plenus, quā si alterum ex his est.  
 integri habitus, quā corrupti: exercitatus, quā iners: sobrius, et tem-  
 perans, quā uino, ueneriq; deditus. Opportunissimumq; curationi tem-  
 pus uernum est, aut certe: neq; feruens neq; frigidum, siquidem uulne-  
 ra et nimis calor, et nimium frigus infestant: maxime tamen horū  
 uarietas: ideoq; perniciosissimus autumnus est. Sed pleraq; ex uulne-  
 ribus oculis subiecta sunt: quorundam ipsæ sedes indicæ sunt, quas  
 alio loco demonstrauimus, cum positus interiorum partiū ostendimus.  
 Veruntamen quia quædam uicina sunt, interest quoq; uulnus in sum-

Aurelij Cor.

k iij



ma parte sit, an penitus penetraverit: necessarium est notas subijcere, per quas quid intus actum sit, scire possimus: & ex quibus vel spes, vel desperatio oritur.

Signa percussi cordis.

Citur corde percusso, sanguis multus effertur: uenæ languescunt: color pallidissimus: sudores frigidi, maliq; odoris: tamquam irrorato corpore oriuntur: extremisq; partibus frigidis matura mors sequitur.

Signa pulmonis icti.

Ulmone uero icto, spirandi difficultas est: sanguis ex ore spumas: ex plaga rubens: simulq; etiam spiritus cum sono fertur in uulnus inclinari iuvat: quidam sine ratione consurgunt. Multi, si in ipsum uulnus inclinati sunt, loquuntur: si in aliam partem, obmutescunt.

Signa iocineris uulnerati.

Ocineris autem uulnerati notæ sunt, multus sub dextra parte præcordiorum profusus sanguis: ad spinam redacta præcordia: in uentrem cubandi dulcedo: punctiones, doloresq; usq; ad iugulum, iunctumq; ei latus scapularum: os intentum. Quibus nonnunquam etiam biliosus uomitus accedit.

Signa percussorum renium.

Enibus uero percussis, dolor ad inguina, testiculosq; descendit: difficulter urina redditur: eaq; aut est cruenta, aut cruor fertur.

Signa uulnerati lienis.

T liene icto sanguis niger à sinistra parte prorumpit: præcordia cum uentriculo ab eadem parte indurescunt: sitis ingens oritur: dolor ad iugulum, sicut iocinere uulnerato uenit.

Signa percussæ uulvæ.

T cum uulua percussa est, dolor inguinibus, & coxis, & femoribus est. sanguinis pars per uulnus, pars per naturale descendit: uomitus bilis insequitur. Quædam obmutescunt: quedam mente labuntur: quedam sui compotes: nervorum, oculorumq; dolore urgeri se consentitur: morientesq; tandem eadē, quæ corde uulnerato, patiuntur.



Signa percussi cerebri, uel membranæ eius.

In cerebrum membrana uel eius uulnus accepit: sanguis per nares, quibusdam etiam per aures exit: fereq; bilis uomitus insequitur. Quorundam sensus obtunduntur: appellatiq; ignorant. Quorundam trux uultus est: quorundam oculi quasi resoluti huc, atq; illuc mouentur. fereq; tertio, uel quinto die delirium accedit. multorum etiam nervi distenduntur. Ante mortem autem pleriq; fascias, quibus caput deligatum est: lacerant: ac nudum uulnus frigori obijciunt.

Signa percussi stomachi.

Bi stomachus autem percussus est: singultus, et bilis uomitus insequitur. Siquid cibi, uel potionis assumptum est, ea redditur cito. Venarum motus elanguescunt: sudores tenues oriuntur: per quos extremæ partes frigescent.

Signa ieiuni intestini, et uentriculi uulnerati, et aliorum intestinorum.

Omnes uero ieiuni intestini, et uentriculi uulnerati notæ sunt. Nam cibi, et potio per uulnus exeunt: præcordia indurescunt: nonnunquam bilis per os redditur. intestino tantum sedes inferior est. Cætera intestina icta uel stercus, uel odorem eius exhibent.

Signa percussæ medullæ, quæ in spina est.

Medulla uero quæ in spina est discissa, nervi resoluuntur: aut distenduntur: sensus intercidit: interposito tempore aliquo sine uoluntate inferiores partes uel semen, uel urinam, uel etiam stercus excernant.

Signa septi transversi percussi.

¶ Si septum transversum percussum est, præcordia sursum contrahuntur: spina dolet: spiritus rarus est: sanguis spumans fertur.

Signa uesicæ uulneratæ.

¶ Vesica uero uulnerata dolent inguina. quod super pulcem est: intenditur. pro urina sanguis, aut ex ipso uulnere urina descendit: stomachus afficitur. itaq; aut bilem uomunt: aut singultuant: frigus, et ex eo mors sequitur.

De sanguine, et sanie, et pure, et eorum speciebus quando uel meliora, deteriora uel sint.

¶ Is cognitis etiam nunc quædam alia noscenda sunt ad omnia uulnera, ulceraq; de quibus dicturi sumus: pertinentia. Ex his autem exit sanguis, sanies, pus. Sanguis omnibus notus est.

k iiij



LIBER

Sanies est tenuior hoc, uarie crassa, & glutinosa, & colorata. Pus crassissimum, albidissimumq; glutinosius & sanguine, & sanie. Exit aut sanguis ex uulnere recenti, aut iam sanescente. Sanies est inter utruq; tempus. pus ex ulcere iam ad sanitatem spectante. Rursus & sanies, & pus quasdam species græcis nominibus distinctas habent. Est enim quædā sanies quæ uel ἰχθῦς, uel μέλι' unpos nominatur. Est pus quod ἐλαῦδες appellatur. ἰχθῦς tenuis, subalbidus ex malo ulcere exit: maximeq; ubi nervo læso inflammatio secuta est. μέλι' unpos crassior, & glutinosior subalbida, melliq; albo subsimilis fertur. Hæc quoq; ex malis ulceribus ubi nervi circa articulos læsi sunt, & inter hæc loca maxime ex genibus. ἐλαῦδες tenue subalbidum quasi unctum colore, atq; pinguitudine, oleo albo non dissimile apparet in magnis ulceribus sanescentibus. Malus autem est sanguis nimium aut tenuis, aut crassus, colore uel liuidus uel niger, aut pituita mixtus, aut uariis. Optimus calidus, rubens, modice crassus, non glutinosus. Itaq; protinus eius uulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit. Itemq; postea spes in his maior est, ex quibus melioris generis quæq; proueniunt. Sanies igitur mala est multa, nimis tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quæ & ipsum ulcus & iunctam ei cutem erodit. Melior nō multa modice crassa, subrubicunda, aut subalbida. ἰχθῦς autem peior est multus, crassus, subliuidus, aut subpallidus, glutinosus ater, calidus, mali odoris. Tolerabilior est subalbidus, qui cætera omnia contraria prioribus habet. μέλι' unpos autem mala est multa, & percrassa: melior quæ & tenuior, & minus copiosa est. Pus inter hæc optimum est. Sed id quoq; peius est multum, tenue, dilutum, magisq; si ab initio tale est. Itemq; si colore sero simile, si pallidum, si liuidum, si feculentum est. Præter hæc si male olet, nisi tamen locus hunc odorem excitat. Melius est, quo minus est, quo crassius, quo albidius. Itemq; si leue est: si nihil olet: si æquale est. modo tamen conuenire & magnitudini uulneris, & tempori debet. Nam plus ex maiore, plus nondum solutis inflammationibus naturaliter fertur. ἐλαῦδες quoq; peius est multum, & parum pingue, quo minus etiam quoq; id ipsum pinguius, eo melius est.

Curatio aduersus profusionem sanguinis in uulneribus.

Vibis exploratis ubi aliquis ictus ē, qui seruari potest: protinus prospicienda duo sunt: ne sanguinis sit profusio: ne ue inflammatio interimat. Si profusionem timemus, quod ex se de uulneris, & magnitudine eius, & ex impetu ructis sanguinis in-



telligi potest, sicut linamentis vulnus implendum est: supraque imponenda spongia ex aqua frigida expressa: ac manu super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescit, sepius linamenta mutanda sunt. Et si siata parum valent, aceto madefacienda sunt. id uehemens ad sanguinem suppressendum est. Ideoque quidam id vulnere infundunt. Sed alius rursus metus subest: ne nimis ualenter ibi retenta materia magnam inflammationem postea moueat. quæ res efficit neque rodentibus medicamentis, neque adurētibus: et ob id ipsum inducentibus crustam, sit utendum: quanuis pleraque ex his sanguinem supprimunt. Sed si semel ad ea decurritur, potius quæ mitius id efficiunt. Quod si illa quoque profusio uincuntur uenæ, quæ sanguinem fundunt, apprehendendæ: circaque id quod ictum est, duobus locis deligendæ, intercidendæque sunt, ut in se ipsæ coeant: et nihilominus ora præclusa habeant. ubi ne id quidem res patitur: possunt ferro candenti aduri. Sed etiam satis multo sanguine effuso ex eo loco, quo neque nervus, neque musculus est, ut puta in fronte, uel superiore capitis parte, commodissimum tamen est cucurbitulam admoovere à diuersa parte, ut illuc sanguinis cursus reuocetur.

Curationes aduersus uulnerum inflammationem.

Aduersus profusionem quidem in his auxilium est. Aduersus inflammationem autem in ipso sanguinis cursu ea timeri possunt, ubi læsum est uel os, uel nervus, uel cartilago, uel musculus: aut ubi parum sanguinis pro modo uulneris fluxit. Ergo quotiens quid tale erit, sanguinem mature suppressere non oportebit: sed pati fluere dum tutum erit: adeo ut si parum fluxisse uidebitur: mitti quoque ex brachio debeat, utique si corpus iuuenile, et robustum, et exercitatum est: multoque magis si id uulnus ebrietas præcessit. Quod si musculus læsus uidebitur, præcidendus erit. Nam percussus mortiferus est: præcisus sanitatem recipit.

De glutinatione uulnerum.

Sanguine autem uel suppresso, si nimis erumpit: uel exhausto, si per se parum fluxit: longe optimum est, uulnus glutinari. Potest autem id uel quod in cute uel etiam in carne est: si nihil ei præterea mali accedit. Potest caro alia parte dependens, alia inherens: si tamen etiam nunc integra est, et coniunctione corporis fouetur. In his uero quæ glutinantur duplex curatio est. Nam si plaga in molli parte, sui debet: maximeque si discissa auris ima est: uel minus nasus, uel frons, uel buccæ, uel palpebra, uel labrum, uel circa



guttur cutis, uel uenter. Si uero in carne uulnus est, hiatq; neq; in unius orae facile attrahuntur: sutura quidem aliena est. Imponendae uero fibulae sunt, ἀρτήρας graeci nominant: quae oras, paulum tamen contrahunt: quo minus lata postea cicatrix sit. Ex his autem colligi potest, id quoq; quod alia parte dependens, alia inhaerebit: si alienatum adhuc non est: suturam, an fibulam postulet. Ex quibus neutra ante debet imponi, quam intus uulnus purgatum est: ne quid ibi concreti sanguinis relinquatur. Id enim & in pus uertitur: & inflammationem mouet: & glutinari uulnus prohibet. ne linamentum quidem, quod suppressendi sanguinis causa inditum est: inibi relinquendum est. nam id quoq; inflammat. Compræhendi uero sutura, uel fibula non cutem tantum, sed aliquid etiam ex carne: ubi suberit hæc, oportebit quo ualentius hæreat, neq; cutem abrumpat. Vtraq; optima est ex acia molli non nimis torta, quo mitius corpori insidat. Vtraque neq; nimis rara, neq; nimis crebra inicienda est. Si nimis rara est, non continet: si nimis crebra est, uehementer afficit: quia quo sæpius acus corpus transit, quoq; plura loca iniectum uinculum mordet, eo maiores inflammationes oriuntur: magisq; æstate. neutra etiam uim ululam desiderat. sed eatenus utilis est, quia cutis ducentem quasi sua sponte subsequitur. Ferè tamen fibulae latius uulnus esse parantur. Sutura oras iungit: quæ ne ipsæ quidem inter se contingere ex toto debent: ut si quid intus humoris concreuerit, sit quæ emanet. Si quod uulnus neutrum horum recipit, id tamen purgari debet: deinde omni uulneri primo imponenda est spongia ex aceto expressa. si sustinere aliquis aceti uim non potest: uino utendum est. Leuis plaga immatur etiam si ex aqua frigida expressa spongia imponitur. sed ea quocumq; modo imposita est: dum madet, prodest. itaq; ut inarescat, non est committendum. Licetq; sine peregrinis, & conquisitis, & compositis medicamentis uulnus curare. Sed si quis huic parum confidit, imponere medicamentum debet: quod sine seuo compositum sit ex his, quæ cruentis uulneribus apta esse proposui. Maximèq; si caro est: barbarum, si nerui, uel cartilago, uel aliquid ex eminentibus, quales aures, uel labra sunt, Polybi sphragidem. Alexandrinum quoq; uiri de neruis idoneum est: eminentibusq; partibus ea, quam graeci πόλιν ουρα uocant. Solet etiam colliso corpore exigua parte findi cutis. quod ubi incidit, non alienum est, scalpello latius aperire: nisi muscoli, neruiq; iuxta sint: quos incidi non expedit. ubi satis deductum est, medicamentum imponendum est. At si id quod collisum est, quantum parum diductum est: latius tamen aperiri propter neruos, aut musculos non licet: adhibenda sunt ea, quæ humorem leniter extrahant, præ-



capueq; ex his id quod *πρωτες* uocari proposui. Non alienum est etiam ubi-  
am ubiqueq; *uulnus* graue est, *impositum*, quo id inuenitur, *insuper* cir-  
cundare *lanam* sordidam ex aceto, & oleo: uel *cataplasma*, si *mollis*  
is locus est, quod leniter reprimat. Si *neruosus*, aut *musculosus*: quod  
emolliat.

Quomodo *uulnus* ligari conueniat.

*f* *Ascia* uero ad *uulnus* deligandum *lintea* aptissima est: ea q;  
lata esse debet, ut semel *iniecta* non *uulnus* tantum, sed *pas-*  
lum utrinq; etiam *oras* eius comprehendat. Si ab altera par-  
te *atro* magis recessit, ab ea melius attrahitur. Si aeq; ab utraq; *trās-*  
uersa comprehendere *oras* debet: aut si id *uulneris* ratio non pati-  
tur: *media* *primum* *inicienda* est, ut tum in utraq; partem *ducatur*.  
sic autem deliganda est: ut & contineat, neq; *astringat*. quod non  
continetur, elabitur. quod nimis *astrictum* est, *cancro* *periclitatur*.  
*Hyeme* *sapius* *fascia* *circuire* debet: *estate* *quotiens* *neceffe* est: tum ex-  
trema pars eius *inferioribus* *actu* *assuenda* est. nam *nodus* *uulnus*  
lædit: nisi tamen *longe* est. illo *neminem* *decipi* decet, ut *propriam* *ui-*  
*scerum* *curationem* *requirat*: de quibus *supra* *posui*. Nam *plaga* *ipsa*  
*curanda* *extrinsecus* uel *sutura*, uel *alio* *medicane* *genere* est. In *uiscer-*  
*ibus* *nihil* *mouendum* est: nisi aut si *quid* ex *iocinere*, aut *liene*, aut  
*pulmone* *duntaxat* *extremo* *dependeat*: *præcidatur*. alioquin *uul-*  
*nus* *interius* ea *uictus* *ratio*, eaq; *medicamenta* *sanabunt*: quæ *cuiq;*  
*uisceri* *conuenire* *superiore* *libro* *proposui*.

De ratione *uictus*, & *notis* *uulnerum*, *curationibusq;* *eorum*.

*h* *Is* *ita* *primo* *die* *ordinatis*, *homo* *in* *lecto* *collocandus* est: usq;  
si *grauis* *uulnus* est: *abstinere* *quantum* *uires* *patiuntur* *ante*  
*inflammationē* *à* *cibo* *debet*. *bibere* *donec* *situm* *finiat* *aquā*  
*calidam*. uel si *æstas* est, neq; *febris*, neq; *dolor* est: et *frigida*. adeo  
tamen *nihil* *perpetuum* est. sed *semper* *pro* *uiribus* *corporis* *æstimand-*  
*um* *ut* *imbecillitas* *etiam* *cibum* *protinus* *facere* *neccesarium* *possit*:  
*tenuem* *scilicet* & *exiguam*, qui *tantum* *sustineat*. Multiq; *etiam* *ex*  
*profluvio* *sanguinis* *inter* *morientes* *ante* *ullam* *curationem* *uino* *re-*  
*ficiendi* *sunt*: quod *alioquin* *inimicissimum* *uulneri* est. *nimis* *uero*  
*intumescere* *uulnus*, *periculosum*: *nihil* *intumescere*: *periculosissimum*  
est. illud *inditum* est *magnæ* *inflammationis*: hoc *emortui* *corpo-*  
*ris*. *Protinusq;* *si* *mens* *homini* *consistit*: *si* *nulla* *felix* *accessit*: *scire* *li-*  
*cet* *mature* *uulnus* *sanum* *fore*. Ac *ne* *febris* *quidem* *terrere* *debet*,



# LIBER

si in magno vulnere, dum inflammatio est: permanet. Illa pernicio-  
sa est, quæ vel leui vulnere superuenit: vel ultra tempus inflammatio-  
nis durat: vel delirium mouet: vel si neruorū rigor, aut distentio, quæ  
ex vulnere orta est: eam non finit. Vomitus quoq; biliosus non volun-  
tarius, vel protinus ut percussus est aliquis, vel dum inflammatio ma-  
net, malum signum est, in his duntaxat, quorum vel nerui vel etiam  
neruosi loci vulnerati sunt. Spōte tamen uomere non alienum est, præ-  
cipue his, quibus in consuetudine fuit: sed neq; protinus post cibum, neq;  
iam inflammatione orta: neq; cum in superioribus partibus plaga est.  
Biduo sic vulnere habito, tertio die id aperiendum, detergendq; sa-  
nies ex aqua frigida est: eademq; rursus iniicienda sunt. Quinto iam  
die quantæ inflammatio futura est, se ostendit. Quo die rursus detecto  
vulnere considerandus color est. Quod si lividus, aut pallidus, aut ua-  
rius, aut niger est: scire licet malum vulnus esse. idq; quandoq; ani-  
maduersum est terrere nos potest. album, aut rubicundum esse ulcus,  
commodissimum est. Item cutis dura, crassa, dolens, periculū ostendit.  
bona signa sunt ubi hæc sine dolore tenuis & mollis est. Sed si gluti-  
natur vulnus, aut leniter intumuit, eadem sunt imponenda, quæ pri-  
mo fuerunt. Si grauis inflammatio est, neq; glutinadi spes est, ea quæ pus  
moueant: aquæ quoq; calidæ necessarius usus est, ut & materiam dige-  
rat: & duritiam emolliat: & pus citet. Ea sic temperanda est, ut &  
manu contingenti iocunda sit: usq; eo adhibenda, donec aliquid ex tu-  
more minuisse, colorcmq; ulceri magis naturalem reddidisse uideatur:  
maximq; si grande vulnus est, τρυπαλῶδες. si in articulis, digitis,  
locis cartilagineosis πυρῶδες. Post id fomentum si lata plaga non pa-  
tet: imponi protinus emplastrum debet: & si latius hiat, illud empla-  
strum liquari ex irino unguento oportet: eoq; illita linamenta disponi  
per plagam: deinde emplastrum supra dari, & super id succadam la-  
nam: minusq; etiam, quam primo fasciæ astringendæ sunt.

## Curationes propriæ articulorum.

Ropriæ quedam in articulis uisenda sunt: in quibus si præ-  
cipue nervi sunt, qui continebant: debilitas eius partis sequitur.  
Si id dubium est: & ex acuto telo plaga est: ea transversa  
commodior est. Si retuso & graui est, nullum in figura discrimen est.  
At uisendum est pus supra articulum, an infra nascatur. Si sub eo na-  
scitur: albumq; & crassum diu fertur: neruum præsum esse credibi-  
le est. Magis quoq; maiores dolores, inflammationesq; quo maturius  
excitæ sunt. Quamuis autem non abscissus neruus est: tamen si cir-  
ca tumor durus diu permanet: necesse est & diuturnum ulcus esse:



et sano quoque eo tumorem permanere futurumque est, ut tarde membrum id extendatur uel contrahatur. Maior tamen in extendendo mora est, ubi recurvato articulo curatio adhibita est, quam in recurvando eo, quod rectum continuerimus. Colla ceteri quoque membrum: quod ictum est ratione certa debet. Si glutinandum est, ut superius sit: si in inflammatione est: ut in neutram partem inclinatum sit. Si iam plus profuit, ut deuexum sit. Optimum etiam medicamentum quies est: moveri et ambulare nisi sanis alienum est. Minus tamen his est periculosum, qui in capite uel brachijs, quam qui inferioribus partibus uulnerati sunt. Minimeque ambulatio convenit: foemine, aut crure, aut pede laborante. Locus in quo cubabit, tepidus esse debet. Balneum quoque, dum parum vulnus purum est: inter res infestissimas est. Nam id et humidum et sordidum reddit: ex quibus ad cancerum transitus esse consuevit. Levis frictio recte adhibetur, sed his partibus, quae longius absunt à vulnere.

Vulnus quomodo purgandum est.

Inflammatione finita, vulnus purgandum est. Id optime faciunt tincta in melle linamenta, supraque id, emplastrum, uel ex *ερεσι* *αυαν* dandum est. Tum demum uero purum ulcus est: cum rubet, ac nimium neque siccum neque humidum est, ac quodcumque sensu caret, quod non naturaliter sentit, quod nimium aut aridum, aut humidum est. Quod aut pallidum, aut albidum, aut lividum, aut nigrum est: id purum non est.

Quomodo vulnus implendum est.

Vergato, sequitur ut impleatur, iamque calida aqua eatenus necessaria est, ut sanies removeatur. Lana succida superuacuius usus est. Lota melius circumdatur. Ad implendum autem vulnus proficiunt quidem etiam medicamenta aliqua. Itaque ea adhiberi non alienum est, ut butyrum cum rosa: exigua mellis parte, aut cum eadem parte, aut cum eadem rosa *τεροπα* *αυαν*, aut ex rosa linamenta. Plus tamen proficit balneum rarum. Cibi boni succi, uitatis omnibus acribus, sed iam plenioribus. Nam et auis, et uenatio, et suilla elixa dari potest. Vinum omnibus dum febris, dum inflammatio est, alienum est. Itemque usque ad cicatricem, si nervi, musculi uel uulnerati sunt, etiam si alte caro, aut si plaga in summa cute generis tutioris est: potest non peruectus, modice tamen datum ad implendum quoque proficere. Si quid molliendum est: quod in nervosis locis musculosisque necessarium est: cerato quoque super vulnus utendum est. At si caro supercreuit, modice reprimat siccum linamentum, uehementius squama aeris. Si plus est quod tolli opus est: adhibenda sunt etiam uehementio-



percreuit, modice reprimat: sicum linamentum uehementius squama  
eris. Si plus est quod tolli opus est, adhibenda sunt etiamnum uehe-  
mentiora, quæ corpus exedunt. Cicatricem post omnia hæc commode  
inducit lycum ex passō, aut lacte dilutum, uel etiam per se imposi-  
tum sicum linamentum.

De uulneribus: quæ ex iri secus p uulnera incidunt, curatioibusq; eorū.

h I cordo felix curationis est. Sed quædam tamen periculosa in-  
cidere consuerunt. Interdum enim uetustus ulcus occupat, indu-  
citurq; ei callus, et circum oræ crassa liuent: post quæ quicquid me-  
dicamentorū ingeritur, parum proficit. quod ferè negligenter curato  
ulceri superuenit. Interdum uel ex nimia inflammatione, uel ob æstus  
immodicos, uel ob nimia frigora, uel quia nimis uulnus astrictū est,  
uel quia corpus aut senile, aut mali habitus est cancer occupat. Id ge-  
nus à græcis diductum in species est, nostris uocabulis non est. Om-  
nis autem cancer non solum id corrumpit: quod occupauit, sed etiam  
serpit: deinde alijs, alijsq; signis decernitur. Nam modo super inflam-  
mationem rubor ulcus ambit. isq; cum dolore procedit. et ipse hæc  
græci nominant. Modo ulcus nigrum est: quia caro eius corrupta est.  
Idq; uehementius etiam putrescendo intenditur. Vbi uulnus humi-  
dum est, et ex nigro ulcere humor pallidus fertur, maliq; odoris est.  
caruncula corrupta, interdum etiam nerui ac membrane resoluun-  
tur, specillumq; demissum descendit, aut in latus, aut deorsum, eoq; ui-  
tio nonnunq; os quoq; afficitur. modo oritur ea: quàm græci ῥάγχε-  
ται appellant. Priores in qualibet parte corporis sunt. Hoc in pro-  
minentibus membris idest inter ungues et alas, uel inguina, ferèq;  
in senibus, uel his, quorū corpus mali habitus est. Caro in ulcere uel  
nigra, uel liuida est: sed sicca et arida, proximaq; cutis plerunq;  
sub nigris pusulis impletur, deinde ei proxima uel pallida, uel liui-  
da, ferèq; rugosa sine sensu est. Vltior in inflammatione est, omniaq;  
ea simul serpunt, vlcus: in locum pusulosum. Pusula: in eum, qui pal-  
let aut liuet. Pallor aut liuor: in id quod inflammatum est. Inflam-  
matio: in id quod integrum est, transit. Inter hæc deinde febris acuta  
oritur, ingensq; sitis. quibusdam etiam delirium accedit. alij quauis  
mentis suæ cōpotes sunt, balbutiendo tamen uix sensus suos explicant.  
Incipit affici stomachus. Fit foedi spiritus ipse odoris. Atq; initium  
eius quidem mali recipit curationem. Vbi uero penitus insedit, insa-  
nabile est. plurimiq; sub frigido sudore moriuntur.

Curatio ulceris.

¶ C pericula quidem uulnerum hæc sunt. Vetus autem ulcus  
scalpello conijcendum est, excidendæq; eius oræ, et quic-



quid super eas linet, æque inadendum. si varicula intus est: quæ his sanari prohibet, ea quoque excidenda. Deinde ubi sanguis emissus, nondumque vulnus est, eadem curatio adhibenda: quæ in recentibus vulneribus exposita est. si scalpello aliquis uti non vult: potest sanare id emplastrum: quod ex ladano fit, & cum ulcus sub eo exesum est: id, quo cicatrix inducitur.

#### Curatio erysipelarum.

**I**D autem quod ἐρυσιπέλας vocari dixi: non solum vulnere si peruenire: sed sine hoc quoque oriri consuevit: atque interdum periculum maius affert: utique si circa cervicem aut caput constitit. Oportet si vires patiuntur sanguinem mittere: deinde imponere simul reprimentia & refrigerantia, maximèque cerussam solani suato: aut cimoliam cretam aqua pluviali exceptam, aut ex eadem aqua subactam farinam cupresso adiectam, aut si tenerius corpus est: lentikulam. Quicquid impositum est: betæ folio contegendum est, & super linteolum frigida aqua madens imponendum. Si per se refrigerantia parum proderunt, miscenda erunt hoc modo. sulphuris. P. XI. cerussæ & croci, singulorum. P. XII. eaque cum uino conterenda sunt, & id his illinendum: aut si durior locus est, solani folia contrita suillæ adipi miscenda sunt, & illata linteolo super iniicienda. At si nigrities est: neque dum serpit: imponenda sunt, quæ carnem putrem lenius exedunt: repurgatumque ulcus sic, ut cætera nutriendum est. Si magis putre est: iamque procedit ac serpit: opus est vehementius erodentibus. Si hæc quidem evincunt, aduri locus debet, donec ex eo nullus humor feratur: nam quod sanum est: sicrum est cum aduritur: post unctionem putris ulceris superponenda sunt, quæ crustas à uino resoluant, eas ῥέκος græci vocant. ubi exciderunt, purgandum ulcus maxime melle et resina uest. sed alijs quoque purgari potest: quibus purulenta curantur, eodemque modo ad sanitatem perducendum est.

#### Curatio Gangrenæ.

**8** Angrenam uero si nondum planè tenet, sed adhuc incipit: curare non difficillimum est, utique in corpore iuuenili, et magis etiam si muscoli integri sunt: si nervi vel læsi non sunt: uel leniter affecti sunt: neque ullus magnus articulus nudatus est: aut carnis in eo loco paulum est: ideoque non multum, quod putresceret, fuit, consistitque eo loco vitium quod maxime fieri in digito potest. In eiusmodi casu primum est, si vires patiuntur, sanguinem mittere. Deinde quicquid aridum est & intentione quadam proximum quoque locum male habet: usque eo sanum corpus concidere.



Medicamenta uero, dum malum serpit, adhibenda nulla sunt: quæ pus mouere consueverunt: ideoq; ne aqua quidem calida. Grauiæ quoque: quanuis reprimentia, aliena sunt. Sed his quàm leuissimis opus est. superq; ea, quæ inflàmata sunt: utendum est refrigerantibus. Si nihilo magis malum constitit, uri id quod est inter integrum ac uitiatum locum debet. Præcipueq; in hoc casu petendū non à medicamentis solum, sed etiam à uictus ratione præsidium est. Neq; enim id malum nisi corrupti uitiosiq; corporis est. Ergo primo, nisi imbecillitas prohibet, abstinentia utendum. Deinde danda quæ per cibum potionemq; aluum: ideoq; etiam corpus astringant, sed ea leuia. Postea si uitium constitit: imponi super uulnus eadem debent: quæ in putri ulcere præscripta sunt. Ac tum quoq; plenioribus cibis uti licebit ex media materia, sic tamen non nisi aluum corpusq; siccantibus. aqua uero pluuiali frigida. balneum nisi iam certa fiducia reddita sanitatis est, alienum est, si quidem emollitum in eo uulnus cito rursus eodem malo afficitur. Solent uero nonnunq; nihil omnia auxilia proficere, ac nihilo minus serpere his cancer. Inter quæ miserum sed unicum auxilium est, ut cætera pars corporis tuta sit, membrum quod paulatim emoritur, abscedere. Hæ grauissimorum uulnorum curationes sunt. Sed ne illa quidem negligenda, ubi integra cute interior pars collisa est, aut ubi dera sum, ac tritum uel aliquid est, aut ubi surculus corpori infixus est, aut ubi tenue, sed altum uulnus insedit. In primo casu commodissimum est malicorium ex uino coquere, interioremq; eius partem conterere, & cerato miscere ex rosa facto, idq; supponere. deinde ubi cutis ipsa exasperata est, inducere lenè medicamentum. quale λιπαρά est. Dera so uero detrictoq; imponendum est emplastrum τετραφάρμακον, minuendusq; cibus, & uinum subtrahendum. Neq; id: quia non habebit altiores ictus, contemnendum erit. Si quidem ex eiusmodi casibus sæpe canceri fiunt. Quod si leuius id erit, & in parte exigua, contenti esse poterimus eodem leni medicamento. Surculum uero, si fieri potest, oportet uel manu, uel etiam ferramento eicere. Si uel præfractus est, uel altius descendit: quàm ut ita fieri possit, medicamento euocandus est. Optime autem educit super imposita arundinis radix, si tenera est, protinus contrita, si iam durior, ante in mulso decocta. Cui semper mel adiiciendum est, aut aristolochia cum eodē melle. Pessima ex surculis arundo est, quia aspera est. Eademq; offensa etiam in filias ha stula est. Sed usu cognitum est utraq; aduersus alteram medicamentum esse. si contrita super imposita est. Facit autem idem in omnibus surculis quodcumq; medicamentum extrahedi uim habet. Idem altis timibusq; uulnibus aptissimum est. Priori rei Philocratis: huic He-

cætei



cicatri emplastrum maxime conuenit.

Quo modo cicatrix uulneri inducenda, purgandaq; sit.

Bi uero in quolibet uulnere uentum ad inducendum cicatricem est: quod per purgatis iam repletisq; ulceribus necessarium est: primum ex aqua frigida linamentum, dum cito alitur, deinde cum iam continenda est: sicut imponendum est, donec cicatrix inducatur. Tum deligari super album plumbum oportet: quo et reprimatur cicatrix, et colorem maxime sano corpori similem accipit. Idem radix siluestris cucumeris praestat. Idem compositio, quae habet elaterij. P. XI. spumae argenti. P. XII. unguenti pond. XIII. Quae excipiuntur resina terebinthina: donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat. Ac nigras quoque cicatrices leniter purgat paribus portionibus mixta, aerugo, plumbum elotum, eademq; rosa cocta, siue ungitur cicatrix: quod in facie fieri potest: siue id ut emplastrum imponitur: quod in alijs partibus commodius est. At si uel excreuit cicatrix, uel concava est, stultum est decoris causa rursus et dolorem, et medicinam sustinere. Alioqui res utriusque suauiter patitur: Si quidem utraq; cicatrix exulcerari scalpello potest. si medicamentum aliquis manu: idem efficiunt compositiones haec: quae corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnem exedentia medicamenta coniungenda sunt. Super concavam, impletia: donec utrunque uetus sanae cuti aequetur, et tum cicatrix inducatur.

De uulneribus quae per morsus inferuntur, eorumque curationibus. Caput XXVII.

Idem de his uulneribus, quae maxime per tela inferuntur. Sequitur ut de his dicam, quae morsu fiunt, interdum hominis, interdum simiae, sepe canis, nonnunquam ferorum animalium, aut serpentium. Omnis autem fere morsus habet quoddam uirus. Itaque si uehemens uulnus est: cucurbitula admoenda est. si leuius: protinus emplastrum iniiciendum, praecipueque Diogenis. si id non est, quodlibet ex his, quae aduersus morsus propositi. si ea non sunt. uiride alexandrinum. si ne id quidem est, quodlibet non pingue ex his quae recentibus uulneribus accommodantur. Sal quoque his, praecipueque ei, quod canis fecit, medicamentum est: si manus uulneri imponitur, superque id duobus digitis uerberatur (Exsaniat enim) ac salsa mentum quoque recte super id uulnus deligatur.

Aurelij Cor.

1



Tiq; autem si rabiosus canis fuit, cucurbitula uirus eius extrahendum est. deinde si locus neq; nervosus, neq; musculosus est, uulnus id adurendum est. si uri non potest, sanguinē homini mitti non alienum est. tum usto quidem uulnere super imponenda, quæ cæteris ustis sunt. ei uero quod expertum ignem nō est, ea medicamenta, quæ uehementer exedunt. post quæ nullo nouo magisterio, sed iam supra posito, ulcus erit implendum: & ad sanitatem perducendum. Quidam post rabiosi canis morsum protinus in balneum mittunt: ibiq; patiuntur desudare, dum uires corporis sinunt ulcere adaperto: quo magis ex eo quoq; uirus destillet. deinde multo meraciq; uino excipiunt. quod omnibus uenenis contrarium est. idq; cum ita per triduum factum est, tutus esse homo à periculo uidetur. Solet autem ex eo uulnere, ubi parum occursus est, aquæ timor nasci. ὀφopόςος græci appellant. Miserrimum genus morbi. in quo simul æger & siti, & aquæ metu cruciatur. quo oppressis in angusto spes est. Sed unicum tamen remedium est: nec opinantem in piscinam non ante ei prouisam proijcere. Et si natandi scientiam non habet modo morsum bibere pati, modo attollere. Si habet, interdum deprimere, ut inuitus quoq; aqua satietur. sic enim simul & sitis, & aquæ metus tollitur. Sed aliud periculum excipit: ne infirmum corpus in aqua frigida uexatum, nervorum distentio absumat. Id ne incidat, à piscina protinus in oleum calidum demittendus est. Antidotum autem præcipue id quod primo loco posui. ubi id non est, aliud si nondum æger aquam horret, potui ex aqua dandum est: & si amaritudine offenditur: mel adijciendum est. Et si iam is morbus occupauit: per catapota sumi potest.

Curationes communes aduersus omnes morsus serpentium.

Serpentium quoq; morsus non nimium distantem curationem desiderant: quantum in ea multum antiqui uariarunt, ut in singula genera anguium singula medēdi genera præciperent: atq; alijs alia. sed in omnibus eadem maxime proficiunt. Igitur in primis super uulnus id membrum deligandum est: non tamen nimium uehementer, ne torpeat. Dein uenenum extrahendū est. id cucurbitula optime facit. Neq; alienū est ante scalpello circa uulnus incidere: quo plus uitiati iam sanguinis extrahatur. Si cucurbitula non est: quod tamen uix incidere potest: tum quodlibet simile uas quod idem possit. Si ne id quidem est, homo adhibendus est, qui uulnus exsugāt.



nus exsugat. Neq; hercules scientiam præcipuam habent hi qui psilli nominantur: sed audaciam usu ipso confirmatam. Nam uenenum serpentis, ut quædam etiã uenatoria uenena, quibus galli præcipue utuntur: non gustus, sed in uulnere nocent. Ideoq; colubra ipsa tuto estur: ictus eius occidit: & si stupente ea, quod per quædam medicamenta circulatores faciunt: in os digitum quis indidit: neq; percussus est: nulla in ea salua noxa est. Ergo quisquis exemplum psylli secutus id uulnus exsuxerit, & ipse tutus erit: & tutum hominem præstabit. Illud ne ignoret, ante debebit attendere: ne quod in ginguis, palato ue, alia ue parte oris ulcus habeat. Post hæc is homo loco callido collocandus est sic, ut id, quod percussus erit, in inferiorem partem inclinetur. Si neq; qui exsugat: neq; cucurbitula est: sorbere oportet ius anserinum, uel ouillum, uel uitulinum, & uomere. Vium autem gallicum pullum per medium diuidere: & protinus calidum super uulnus imponere sic, ut pars interior corpori iungatur. Facti id etiã hædus, agnus ue discissus, & calida eius caro statim super uulnus imposita. emplastra quoq; quæ supra comprehensa sunt. Aptissimumq; est uel ephesium, uel id quod ei subiectum est. præsensq; in aliquo antidoto præsidium est. sin id non est: necessarium est exsorbere potionem meri uini cum pipere, uel quidlibet aliud, quo calor mouendus est: ne humorẽ intus coire patiatur. Nam maxima pars uenorum frigore interimit. Omnia etiam urinam mouentia, quia materiam extenuant: utilia sunt.

Speciales curationes aduersus ictus serpentium,  
& primo aduersus ictum Aspidis.

h Acc aduersus oēs ictus cõmunia sunt. Vnus tamen ipse docuit, eum, quẽ aspis percussit: acetum potius bibere debere.

Quod demonstrasse dicitur casus cuiusdam pueri: qui cum ab hac ictus esset: et partim ob ipsum uulnus, partim ob immodicos æstus siti premeretur: ac locis siccis alium humorem nõ reperiret: acetum, quod forte secum habebat, ebibit: & liberatus est. Credo qm id, quantum refrigerandi uim habet, tamen habet etiã dissipandi. Quo fit ut terra respersa eo, spumet. Eadem ergo uerisimile est, spissescentem quoq; intus humorem hominis ab eo discuti: & sic dari sanitatẽ.

Aduersus ictum scorpionis.

i N quibusdam etiam alijs serpentibus certa quædã auxilia satis nota sunt. Nam scorpio sibi ipse pulcherrimũ medicamentum est. Quidam contritum cum uino bibunt: quidam eodẽ modo contritum super uulnus imponunt: quidã super prunã

l ij



# LIBER

eo imposito vulnus suffumigant undiq; ueste circumdata, ne is fumus dilabatur: tum carbonem eius, super vulnus deligant. Bibere autem oportet herbae solaris, quam ἡλιοτρόπιον græci uocant. semen, uel certe folia ex uino. Super vulnus uero etiam fursures ex aceto, uel ruta siluatica recte imponitur, uel cum melle sal tostus. Cognoui tamen medicos, qui ab scorpione ictis nihil aliud, quam ex brachio sanguinem miserunt.

*Aduersus aranei & scorpionis ictum.*

*T* ad scorpionis autem & ad aranei ictum allium cum ruta recte miscetur, ex oleoq; contritum super imponitur.

*Aduersus Ceraſtis, & Dipsæ, & Hæmorrhoidis ictum.*

*T* si Ceraſtes, aut Dipsas, aut Hæmorrhoids percussit: catapotium, quod ægyptiæ fabæ magnitudinem æquet, arefactum in duas portiones diuidendū est sic, ut ei rutæ paulum adiudatur. Trifolium quoq; & mentastrum, & cum aceto panaces æque proficiunt. Costumq; & casia, et cinnamomū recte per potionem assumentur.

*Aduersus Chersydri ictum & ceraſtis.*

*D*uersus Chersydri uero ictum, panacis, aut laser, quod sit scrupulorum. IIIS. ꝯI. uel porri suavis cum hemina uini sumendus est, et edenda multa satureia. Imponendum autē super vulnus stercus caprinum ex aceto coctum, aut ex eodem hordeacea farina, aut ruta, uel nepeta cum sale contrita melle adiecto. Quod in eo quoq; uulnere, quod ceraſtes fecit, æq; ualet.

*Aduersus Phalangij ictum.*

*B*i uero phalangium noquit, præter eam curationem, quæ manus redditur, sepe homo demittendus in solium est, dandusq; ei myrrhæ & uinæ taminie par modus ex passi hemina: uel radiculæ semen, aut lolij radix ex uino, & super vulnus fursures ex aceto coctæ: imperandumq; ut is conquiescat.

*Aduersus ictus italorū anguiū, qui minus terribiles peregrinis sunt.*

*E*rum hæc genera serpentium & peregrina, & aliquanto magis pestifera sunt, maximeq; æstuosis locis gignuntur. Italia, frigidioresq; regiones hac quoq; parte salubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. Aduersus quos satis proficit



herba betonica, uel cantabrica, uel centaurion, uel agrimonia, uel trixago, uel personina, uel marinae pastinacae singulae, binae uel tria et cum uino potui datae: et super vulnus impositae. Illud ignorari non oportet, ois serpentis ictum et ieiuni, et ieiuno magis nocere. Ideoque pernitiosissimae sunt, cum incubant. Vtilissimumque est, ubi ex anguibz metus est, non ante progredi, quam quid aliquis assumpsit.

Remedium generale aduersus omnia uenena, uel cibo,  
uel in potione assumpta.

Non tam facile his opitalari est, qui uenenum, uel in cibo, uel in potione sumpserunt. Primum, quia non protinus sentiunt, ut ab angue icti, ita ne succurrere quidem statim sibi possunt. Deinde, quia noxa non à cute, sed ab interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen ubi primum sensit aliquis, protinus oleo multo epoto uomere. Deinde, ubi praecordia exhausta, bibere aridum. si id non est, uel merum uinum.

Specialia remedia aduersus quaedam uenena, et primo  
aduersus cantharidas.

Vnt tamen quaedam remedia propria aduersus quaedam uenena, maximeque leuiora. Nam si cantharidas aliquis ebibit: panace cum lacte cōtusa, uel galbano, uino adiecto dari, uel lac p se debet.

Aduersus cicutam.

I cicuta: uinum merum calidum cum ruta quamplurimum ingerendum est: deinde is uomere cogendus. posteaque laser ex uino dandum. isque, si febre uacat: in calidum baneum mittendus. Si non uacat: unguendus ex calefactentibus est. post quae quies ei necessaria est.

Aduersus hyoscyamum.

I hyoscyamum: feruens mulsum bibendum est: aut quodlibet lac, maxime tamen asinum.

Aduersus cerussam.

I cerussam: ius maluae, uel ius glandis ex uino contritae maxime praesunt.

Aduersus sanguisugam si epota est: et lac quod intus coit.

I sanguisuga epota est, acetum cum sale bibendum est. si lac intus coit, aut passum, aut coagulum, aut cum aceto laser.

Aurelij Cor.

l iij



I fungos inutiles quis assumpserit, radícula aut epota, aut  
 S cum sale & aceto edenda est. Ipsi uero hi & specie quidem  
 discerni possunt ab utilibus, & coctura genere idonei fieri.  
 Nam siue ex oleo inferuerunt, siue piri surculus cum his inferunt,  
 omni noxa vacant.

De adustis corporis locis, & quomodo curari debeant.

Dustis quoque locis extrinsecus uis infertur. Itaque sequi uide-  
 tur, ut de his dicam. Hæc autem optime curantur folijs, aut  
 lilij, aut lingue canina, aut betæ in uetere uino, oleoque deco-  
 ctis. Quorum quilibet protinus impositum ad sanitatem perducit.  
 Sed diuidi quoque curatio potest in ea, quæ mediocriter exedentia re-  
 primentiaque: primo & pustulas prohibeant, & summam pelliculâ  
 exasperent. Deinde ea quæ lenia ad sanitatem perducant. Ex priori  
 bus est lenticulæ cum melle farina, uel myrrha, uel uino: creta cimo-  
 lia cum thuris cortice contrita & aqua coacta, atque ubi usus necessitas  
 incidit: aceto diluta. Ex insequentibus quælibet *κατὰ*. Sed idonea  
 maxime est, quæ uel plumbi recrementum, uel uitellos habet. Est etiâ  
 illa adustorum curatio, dum inflammatio est: impositam habere cum  
 melle lenticulam. Vbi ea declinauit, farina cum ruta, uel porro, uel  
 marrubio, donec crusta cadant. Tum erui cum melle, aut irim, aut  
 resinam terebinthinam, donec ulcus purum sit. Nouissime sicum lina-  
 mentum.

De interioribus ulceribus, quæ aliqua corporum  
 parte corrupta nascuntur. Cap. XXVIII.

De carbunculo, & eius curatione.

B his quæ extrinsecus incidunt ad ea ueniendum est, quæ  
 interioribus corrupta aliqua corporum parte nascuntur. Ex quibus  
 non aliud carbunculo peius. eius hæc notæ sunt. Rubor  
 est: superque eum non nimium pustulæ eminet: maxime nigræ: inter-  
 dum subliuidæ, aut pallidæ. In his sanies esse uidetur: infra color ni-  
 ger est. Ipsum corpus aridum & durius quam naturaliter oportet.  
 Circa quem quasi crusta est: eaque inflammatione angitur: neque in eo  
 loco lenari cutis potest: sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus ur-  
 get: nonnunquam horror, aut febris oritur: aut uirumque. Idque uitium  
 subter actis quasi quibusdam radicibus serpit: interdum celerius, in-  
 terdum tardius: supra quoque procedens in albescit: dein liuidum fit,  
 circumque exiguae pustulæ oriuntur. Et si circa stomachum, fauces ue



incidit, subito spiritum saepe elidit. Nihil melius est, quam protinus adurere. Neque id graue est (nam non sentit: quoniam ea caro mortua est) finisque adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde vulnus, sicut cetera adusta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta undique à uina carne diducta, quae trahit secum quicquid corruptum erat: purusque iam sinus curari potest implentibus. At si in summa cute uitium est: possunt succurrere quaedam uel exedentia tantum, uel etiam adurentia. Vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcumque uero medicamentum positum est: si satis proficiet, protinus à uina corruptam partem resoluit. Certaque esse fiducia potest ferè, ut undique uitiosa caro excedat: qua huiusce rei medicamen exest. Si id non fit, medicamentum malo uincitur, utique ad uisionem properandum est: sed in eiusmodi casu abstinendum à cibo, à uino est. Aquam liberaliter bibere expedit: magisque ea seruanda sunt, si febricula quoque accessit.

De carcinomate, et eius curatione.

On idem periculum carcinoma affert, nisi imprudentia curantis agitata est. Id uitium fit maxime in superioribus partibus, circa faciem, nares, aures, labra, mammas foeminarum. Et iecore autè, aut splene hoc nascitur. Circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur: usque immobilis, inaequalis tumet: interdum etiam torpet. Circa eum inflatae uenae quasi recuruantur: haecque pallent, aut liuent: nonnunquam etiam in quibusdam delitescent. Tactusque is locis alijs dolorem affert, in alijs cum non habet. Et nonnunquam sine ulcere durior aut mollior est, quam esse naturaliter debet: nonnunquam hisdem omnibus ulcus accedit. Interdumque nullam habet proprietatem, interdum simile his est, quae uocantur graeci *κρόνιδες* *ματὰ*: aspredine quadam et magnitudine sua. Colorque eius ruber est, aut lenticulae similis neque tato fertur. Nam protinus aut resolutio nervorum, aut distentio insequitur. Saepe haemorrhoeus elutiscit, atque eius anima deficit. Quibusdam etiam si id ipsum pressum est, quae circa sunt: intenduntur et intumescunt. Ob quae pessimum id genus est: ferèque primum id fit quod *κρόνιδες* à graecis nominatur. Deinde ex eo id carcinoma quod sine ulcere est. Deinde ulcus ex eo thymum. Tolli nihil nisi *κρόνιδες* potest: reliqua curationibus irritantur. Et quo maior uis adhibita est, eo magis quidam usi sunt medicamentis adurentibus. Quidam ferro adusserunt: quidam scalpello exciderunt. Neque ulli unquam mediana proficit: sed adusta protinus conata sunt et increuerunt, donec occiderent. Exorsa etiam post indu-



Etiam cicatricem tamen reuenterunt: & causam mortis attulerunt. Cū interim pleriq; nullam uim adhibēdo, qua tollere id malum tentent: sed imponendo tantum lenia medicamenta, quæ quasi blandiatur: quo minus ad ultimam senectutem perueniant, non prohibentur. discernere autem non habentes quod curationē recipit à carcinomate, quod non recipit: nemo scire potest. sed tempore, & experimento. Ergo ubi primum id uitium notatum est: imponi debēt medicamenta adurentia. si leuatur malum, minuunturq; eius inditia, procedere curatio potest & ad scalpellum, & ad usionem. si protinus irritatum est, scire licet iam carcinoma esse: remouendāq; sunt omnia acria, omnia uehementia. sed si sine ulcere is locus durus est: imponi sicum quā pinguis simam, aut potius emplastrum satis est. si ulcus æquale est, ceratū ex rosa iniiciendum est: adijciendusq; ei puluis ex contrita testa: ex qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est. si id nimium supercreuit: tentanda squama æris est: quæ lenissima ex adurentibus est: eatenus nequid eminere patiatur: sed ita, si nihil exacerbauit. sin minus, eodem cerato contenti esse debebimus.

## De Theriomate, &amp; eius curatione.

Et etiam ulcus, quod θηρίωμα græci uocant. Id & per se nascitur: & interdum ulceri ex alia causa factō superuenit: color est uel limidus, uel niger: odor foedus, multus, & mucis similis humor. Ipsum ulcus neq; tactum, neq; medicamentum sentit: prurigne tantum mouetur. at circa, dolor est, & inflammatio. Interdū etiam febris oritur. Nonnunquam ex ulcere sanguis erumpit. ad id quoq; malum serpit. quæ omnia sæpe intenduntur. Fitq; ex his ulcus, quod ἑρπητις ἕλκος, uel ἑρπητις græci uocant: quia celeriter serpendo, penetrandoq; usq; ossa, corpus uorat. id ulcus inæquale est, cæno simile: inestq; multus humor glutinosus: odor intollerabilis, maiorq; q̃ pro modo ulceris inflammatio. Vtrunq; sicut omnis cancer, fit maxime in senibus: uel his, quorum corpora mali habitus sunt. Curatio utriusq; eadem est: sed in maiore malo magis necessaria. Ac primum à uictus ratione ordinandus est: ut quiescat in lectulo: ut primis diebus à cibo abstineat: aquā quā plurimā assumat. alius quoq; ei ducatur. dein post inflammationē cibum boni succi capiat: uitatis omnibus acribus, potionis quantum uolet sic, ut interdū quidem aqua contentus sit. in cæna etiam uini austeri aliquid bibat. non æque tamen fame in his, quos ἑρπης urget: atq; his qui θηρίωμα adhuc habebūt, utendum erit. & uictus quidem talis necessarius est. super ulcus uero



inpergenda arida aloë oenanthe est: & si parum proficiet, chalcitis. Ac si quis nervus exesa carne nudatus est: contegendus ante linteolo est: ne sub eo medicamento aduratur. Si ualidioribus etiam num remedijs opus est: ad eas compositiones ueniendum est, quæ uehementius adurunt. Quicquid autem inpergitur, auerso specillo infundi debet. Super danda cum melle sunt uel linamenta, uel olea folia ex uino de cocta, uel marrubium: eaq; linteolo contegenda in aqua frigida madefacto, dein bene expresso. Circaq; qua tumor ex inflammatione est, imponenda quæ reprimant cataplasmata. Si sub his nihil proficitur: ferro locus aduri debet: diligenter nervus, si qui apparent: ante contextis. Adustum uel medicamentis, uel ferro corpus primum purgandū, deinde implendū esse: apparere cuilibet ex prioribus potest.

De sacro igne, & eius curatione.

Acer quoq; ignis malis ulceribus annumerari debet. eius due species sunt. Alterum est subrubicundum, aut mixtum rubore, atq; pallore: exasperatumq; p pustulas continuas, quarum nulla, altera maior est, sed plurimæ perexiguæ. In his semper fere pus, & sæpe rubor cum calore est: serpitq; id nonnunquam sanescente eo, quod primum uitiatum est: nonnunquam etiam exulcerato: ubi ruptis pustulis ulcus continuatur: humorq; exit: qui esse inter saniem, et pus uideri potest. Fit maxime in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, præcipueq; in plantis. Alterum autem est in summæ cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, sublinidum, inæqualiter tamen, mediumq; sanescit extremis procedentibus: ac sæpe id quod iam sanum uidebitur, iterum exulceratur. At circa proxima cutis, quæ uitium receptura est: tumidior, & durior est: coloremq; habet ex rubro subnigrum. Atq; hoc quoq; malo ferè corpora seniores tentantur: aut quæ mali habitus sunt, sed in cruribus maxime. Omnis autem sacer ignis ut minimum periculum habet ex his quæ serpunt: sic propè difficillime tollitur. Medicamentum eius fortuitum est: uno die febris, quæ humorem noxium absumat. Cuius quo crassius, & albidius est: eo periculi minus est. Prodest etiam infra os ulcerum ladi: quo plus puris exeat, & id, quod ibi corruptum corpus est: extrahat. sed tamen si febricula accessit, abstinentia, lectulo, alui dictione opus est. In omni uero sacro igni neq; lenibus, et glutinosiis cibis, neq; salis, & acris utendum est: sed his quæ inter utrumq; sunt: qualis est panis sine fermento, piscis, hedus, aues, exceptoq; apro omnis ferè uenatio. Si non est febricula, & gestatio utilis



# LIBER

est, & ambulatio, & uinum austerū & balneum. Atq; in hoc quoq; genere potio magis liberalis esse, quā cibus debet. Ipsa autem ulcera si mediocriter serpunt: aqua calida. Si uehementius, uino calido fouenda sunt. Deinde acu pusula quaecunq; sunt aperiendae. Tum imponenda ea: quae putrem carnem exedunt. Vbi inflammatio sublata, ulcusq; purgatum est: imponi leue medicamentum debet. In altero autem genere possunt proficere mala cotonea in uino aceta atq; contrita. Potest emplastrum uel Hierae, uel *τεροαφάρμακον*, cui quinta pars thuris adiecta sit. Potest nigra hedera ex uino austero aceta. Ac si celeriter malum serpit: non aliud magis proficiat. Purgato ulcere: quod in summa cute esse, proposui: satis ad sanitatem eadem lenia medicamenta proficient.

De Chironeo ulcere, & eius curatione.

Hironeum autem ulcus appellatur, quod & magnum est, et c  
habet oras duas, collosas, tumentes. Exit sanies non multa, sed tenuis. Odor malus neq; in ulcere, neq; in eius humore est. Nulla inflammatio, dolor modicus est. nihil serpit: ideoq; nullum periculum affert, sed non facile sanescit. Interdum tenuis cicatrix inducitur: deinde iterum rumpitur: ulcusq; renouatur. Fit maxime in pedibus & cruribus. Super id imponi debet, quod & lene aliquid, & uehemens, & reprimens habeat. Quale eius rei causa sit ex his. Squamæ æris: plumbi eloti combustis, singulorum. P. XIII. Cadmiæ, ceræ: singulorum. P. XVIII. rosæ quantum satis est ad ceram simul cum eis molliendam.

De ulceribus quæ ex frigore in pedibus & manibus oriuntur, & eorum curationibus.

Iunt etiam ex frigore hiberno ulcera: maxime in pueris, et f  
præcipue pedibus, digitisq; eorum, nonnunq; etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est. Interdum pustulae oriuntur, deinde exulceratio. Dolor autem modicus. Prurigo maior est: nonnunquam humor exit: sed non multus, qui referre uel pus, uel saniem uidetur. In primis multa calida aqua fouendum est: in qua rapa decocta, aut si ea non sunt: aliquæ uerbena ex reprimentibus. Si nondum ad apertum ulcus: æs, q̄ maxime calidum quis pati potest, admoendum est. Si iam exulceratio est: imponi debet alumen æqua portione cum thure contritum, cum uino adiecto: aut malicorium in aqua coctum, deinde contritum. Si summa detracta pellicula est: hic quoq; melius lenia medicamenta proficiunt.



## De struma, &amp; eius curatione.

**S**truma quoq; est tumor, in quo subter concreta quaedam ex pure & sanguine quasi glandulae oriuntur. Quae uel praecipue fatigare medicos solent: quoniam & febres mouent, nec unquam facile maturescunt, et siue ferro, siue medicamentis curantur. Plerumq; iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoq; post medicamento est opus. Quibus id quoq; accedit: quod longo spatio detinent. Nascuntur maxime in ceruice, sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoq; foeminarum se repperisse chirurgus Megethes auctor est. Propter haec et album ueratrum recte datur: atq; etiam saepius, donec ea digerantur. Et medicamenta imponuntur: quae humorem, uel educant, uel dissipent: quorum supra mentio facta est. Adurentibus quoq; quidam utuntur: quae exedunt: crustaq; eum locum astringunt: tunc uero ut ulcus curant. Quaecumq; autem ratio curandi est: corpus puro ulcere exercendum atq; alendum est: donec ad cicatricem perueniat. Quae cum medici doceant, quorundam rusticorum experimento cognitum: quem struma male habet, eum: si anguem edit: liberari.

## De furunculo, &amp; eius curatione.

**F**urunculus uero est tuberculum acutum cum inflatione & dolore, maximeq; ubi iam in pus uertit. Qui ubi ad apertum est: & exit, super apparet pars carnis in pus uersa: pars corrupta subalbida, subrubra: quem uentriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiam si nulla curatio adhibeatur. Maturescit enim per se atq; erumpit. Sed dolor efficit, ut potior medicina sit, quae maturius liberet. Proprium eius medicamentum galbanum est: sed alia quoq; supra comprehensa sunt. Si cetera desunt: imponi debent primum non pingue emplastrum, ut id reprimat: deinde si non repressit: quodlibet puri mouendo accommodatum. Si ne id quidem est, uel resina, uel fermentum. Expresso pure, nulla ultra curatio necessaria est.

## De phymate, &amp; eius curatione.

**P**hyma uero nominatur tuberculum furunculo simile: sed rotundius & planius: saepe etiam maius. Nam furunculus omni dimidij magnitudinem raro explet, nunquam excedit. Phyma etiam latius patere consuevit: sed inflammatio, dolorq; sub eo minores sunt. Vbi enisum est pus: eodem modo, apparet uentriculus.



# LIBER

quod in furunculo non inuenitur. Verum omnis corrupta caro in pus uertitur. Id autem in pueris & sepius nascitur, & facilius tollitur: in iuuenibus rarius oritur, & difficilius curatur. Vbi ætas indurauit, ne nascitur quidem. Quibus uero medicamentis discenteretur, supra propositum est.

De phygelo, & eius curatione.

ὕπετρον autem est tumor non altus, latus, in quo quiddam pusula simile est. Dolor, & stentioq; uehemens est: & maior quam pro magnitudine tumoris: interdum etiam febricitat: idq; tarde maturescit, neq; magnopere in pus conuertitur. Fit maxime aut in uertice, aut in alis, aut inguinibus. Panem ad similitudinem figuræ nostri uocant, atq; id ipsum quo nudicamento tolleretur, supra demonstraui. Sed cum omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius uitium ad suppurationē spectans. Idq; ferè fit aut post febres, aut post dolores partis alicuius: maximq; eos, qui uentrem infestant. Sepiusq; oculis expositum est. Si quidem latius aliquid intumescit ad similitudinem eius, quod phyma uocari proposui: rubetq; cum calore, & paulo post etiam cum duritia, magisq; innocenter indolescit: & sitim, uigiliamq; exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute deprehendi potest: maximeq; ubi altius pus mouetur. Sed cum siti, uigiliamq; sentiuntur intus aliqua punctiones, & quod de subito durius non est, melius est: & quamuis non rubet: coloris tamen aliter mutatus est. quæ signa iam pure oriente nascuntur. Tumor, ruborq; multo ante incipiunt. Sed si locus mollis est, auertendus is materiæ aditus est per cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & refrigerant: qualia et aliis & paulo ante in erysipela proposui. Si iam durior est, ad ea ueniendum est, quæ digerant, & resoluant: qualis est ficus arida contusa, aut fex mixta cum cerato, quod ex adipe suilla coactum sit: aut cucumeris radix, cui ex farina duæ partes adiectæ sint, ante ex mulso decoctæ. Licet etiā miscere æquis portionibus ammoniacum, galbanum, propolim, uiscum: pōdusq; adijcere myrrhæ dimidio minus, quam in prioribus singulis erit. Atque emplastra quoque & malagmata idem efficiunt: quæ supra explicui. Quod per hæc discussum non est, necesse est maturescat: idq; quo celerius fiat, imponenda est farina hordeacea, ex aqua cotta recte miscetur. Eadem autem hæc in minoribus quoque abscessibus, quorum nomina, proprietatesq; supra reddidi, recte fiunt. eademq; omnium curatio. tantum modo distat. Crudum est autem, in quo magis quasi uenarum motus est, & grauitas, & ardor, & distentio, & dolor, & rubor, & durities. Et si maior abscessus est, horror,



aut etiam febricula permanet, Penitusq; condita suppuratio. Si pro his, quæ alibi cæcis ostendit, punctiones sunt, ubi ista se remiserunt, iamq; is locus prurit, & aut subliuidus, aut subalbidus est: matura suppuratio est: eaq; ubi uel per ipsa medicamenta, uel etiã ferro aperta est: pus debet emitte. Tum si qua in alijs uel inguinibus sunt: sine linamento nutrienda sunt. In cæteris quoq; partibus, si una plaga exigua est, si mediocris suppuratio fuit, si non alte penetravit, si febris non est, si ualet corpus, æq; linamenta supernuacia sunt. In reliquis parce tamen: nec, nisi plaga est, imponi debent. Commode uero uel super linamenta, uel sine his imponitur lenticula ex melle, aut malicorium ex uino coctum. Quæ & per se, & mixta idonea sunt. Si qua circa duriora sunt, ad ea mollienda, uel malua contrita: uel fœnigræci, lini'ue semen ex passo coctum super dandum est. Quicquid deinde impositum est, non astringi sed modice deligari debet. Illo neminẽ decipi decet, ut in hoc genere cerato utatur. Cætera quæ pertinent ad purgandum ulcus, ad implendum, ad cicatricem induendam: conueniunt, quæ in uulneribus exposita sunt.

De fistulis & earum generibus, & curationibus.

Nonnunquam autem ex eiusmodi abscessibus, & ex alijs ulcerum generibus fistulæ oriuntur. Id nomen est ulceri alto: angusto: calloso. Fit in omni ferè parte corporis: habetq; quedam in singulis locis propria: prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt. siquidem aliæ breues sunt: aliæ altius penetrant, aliæ rectæ intus feruntur, aliæ multoq; plures transuersæ, aliæ simplices sunt, aliæ duplices, triplices'ue ab uno ore intus orsse: quæ tres fiunt, aut etiam in plures sinus diuiduntur: aliæ rectæ: aliæ flexæ, & tortuosæ sunt. Aliæ intra carnem desinunt. Aliæ ad ossa: aut cartilagine[m] penetrant, aut ubi neutrum horum subest: ad interiora perueniunt. Aliæ deinde facile, aliæ cum difficultate curantur. Atq; etiam quedam insanabiles reperiuntur. Expedita curatio est in fistula simplicia, recenti, intra carnem, adiuuatq; ipsum corpus si iuuenile: si firmum est. Inimica, contraria his sunt. Itemq; si fistula os uel cartilagine[m], uel neruum, uel musculos læsit: si articulum occupauit: si uel ad uesicam, uel ad pulmone[m], uel ad uulnam, uel ad grandes uenas, arterias'ue, uel ad inania, ut guttur, stomachum, thoracem penetravit. Ad intestina quoq; eam tendere semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit: si corpus uel ægrum, uel senile, uel mali habitus est. Ante omnia autem demitti specillum in fi-



## LIBER

fistulam conuenit: ut quo tendat & quam alte perueniat, scire possi-  
mus. Simul etiam protinus humida, an siccior sit. quod extracto spe-  
cillo patet. Si uero os in uicino est, id quod disci potest: si iam nec ne  
eo fistula penetravit, quatenus nocherit. Nam si molle est, quod ulti-  
mo specillo contingitur: intra carnem adhuc uitium est. Si magis id  
renititur, ad os uentum est. ibi deinde si labitur specillum, nondum  
caries est. si non labitur, sed equali inmittitur: caries quidem, uerum  
adhuc leuis est. Si inaequale quoque et asperum subest: uehementius os  
exesum est. At cartilago ubi subhaesit, ipsa sedes docet: peruentumque  
esse ad eam ex renixu patet. Sed ex his quidem colliguntur fistula-  
rum sedes, spatia, noxae. Simpliciter uero haec sint, an in plures partes  
diducantur: cognosci potest ex modo puris: cuius si plus fertur, quam  
quod simplici spatio conuenit: plures sinus esse manifestum est. Cumque  
ferè iuxta sint, caro, & nervus, & aliqua nervosa: quales ferè tunicae,  
membranaeque sunt: genus quoque puris docebit, num plures sinus intus  
diuersa corporis genera perferant. si quidem ex carne pus leue, al-  
bum, copiosius fertur. At ex nervoso loco: coloris quidem eiusdem,  
sed tenuius, & minus. Ex nervo, pingue & oleo non dissimile. Denique  
etiam corporis inclinatio docet, num in plures partes fistulae pene-  
trarint: quia saepe cum quis aliter decubuit: aliterque membrum collo-  
cauit: pus ferri, quod iam desierat, iterum incipit: testaturque non solum  
aliu sinum esse ex quo descendat: sed etiam in aliam corporis partem  
eum tendere. Sed si & in carne & recens, & simplex est: ac neque  
rugosa, neque caua sede, neque in articulo, sed in eo membro, quod per se  
immobile, non nisi cum toto corpore mouetur: satis proficiet empla-  
strum, quod recentibus uulneribus imponitur: dum habeat uel salē,  
uel alumen, uel squamā aeris, uel æruginem, uel ex metallicis aliquid.  
exque eo collirium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo ple-  
nius. Idque ea parte qua tenuius est: altera antecedente demitti oportet  
in fistulam, donec sanguis purus se ostendat. quæ in omnibus fistula-  
rum collirijs perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in linteolo su-  
perimponendum: supraque iniicienda spōgia est in acetiū ante demissa.  
soluique quinto die satis est. genusque uictus adhibendum est: quo car-  
nem ali docui. Ac si longius à præcordijs fistula est: ex intervallo ieiun-  
ium radículas edisse: deinde uomere necessarium est. uetustate callo-  
sa fit fistula. Callus autem neminem fallit, quia durus est: & aut al-  
bus, aut pallidus. sed tum ualidioribus medicamentis opus est. Qua-  
le est, quod habet papaueris lacrymæ. P. XI. gummi. P. XIII. cadmiæ  
P. XIII. atramenti sutorij. P. XVIII. Ex quibus aqua coactis colliri-  
um fit. aut in quo sunt gallæ. P. XI. æruginis, sandaracæ, aluminis



egyptij, singulorum. P. XI. atramenti sutorij combusti. P. XII. aut quod constat ex chalcide, et saxo calce quibus auripigmenti dimidio minus, quam in singulis prioribus est: adiungitur. eaq; melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex præcepto Megetis, æruginis rase. P. XII. conterere: deinde ammoniac, thymiamatis. P. XII. aceto liquare: eoque infuso ex ærugine colligere. idq; ex primis medicamentis est. sed ut hæc maximi effectus sunt: sic cui ista non adsunt, facile tamen est callum quibuslibet adurentibus medicamentis prodere: aut quibus hæc maxime in effectum sunt, erodere. Satiusq; est uel papyrum intortum, uel aliquid ex penicillo in modum collirij astrictum eò illinere. scylla quoq; cocta, et mixta cum calce callum exest. si quando uero longior et transversa fistula est: demisso specillo contra principium huius incidi commodissimum est: et collirium utrumq; demitti. At si duplicem esse fistulam, aut multiplicem existimamus, sic tamen ut brevis, intraq; carne sit: collirio uti non debemus: quod unam partem curet: reliquis omittat. sed eadem medicamenta arida in calamentum scriptorium coniicienda sunt: usq; ori fistulæ aptandus: inspirandumq; ut ea medicamenta intus compellantur. aut eadem ex uino liquanda. Vel si sordidior fistula est, ex mulso: si callosior, ex aceto sunt: atq; intus infundendum quicquid inditum est. superponenda sunt quæ refrigerent, et reprimant. nam ferè quæ circa fistulam sunt, habent aliquid inflammationis. Neq; alienum est ubi quis resoluuerit, anteq; rursus alia medicamenta coniiciat: per oricularium clystere rem fistula eluere. si plus puris fertur, uino. si callus durior est, aceto. si iam purgatur, mulso, uel aqua, in qua eruum coctum sit sic, ut huic quoq; mellis paulum adiciatur. Ferè uero fit, ut ea tunica quæ inter ferrumentum, et integram carnem est, uicta medicamentis tota exeat: infraq; ulcus purum sit. quod ubi contigit, imponenda glutinamenta sunt: præcipueq; sponsa melle cocto illita. Neq; ignoro multis placuisse linamentum in modum collirij compositum, tinctum melle demitti. sed celerius id glutinatur, quam impletur. Neq; uerèdum est ne purum corpus puro corpori iunctum, non coeat: adiectis quoq; medicamentis ad id efficacibus: cum sæpe exulceratio digitorum, nisi magna cura prospeximus: sanescendo in unum eos iungat.

## De melicera.

St etiam ulceris genus: quod à faui similitudine, *μυλιν* uocatur à græcis nominatur: idq; duas species habet. Alterum subalbidum furunculo simile, sed maius, et cum dolore maiore. quod ubi maturescit, hêt foramina, per quæ fertur humor glutinosus, et



# LIBER

purulentus. Nec tamen ad iustam maturitatem peruenit. Si diuisum est, multo plus intus corrupti, quam in firunculo apparet, altiusq; descendit. Raro fit nisi in scapulis. Alterum est minus super corpus emnens, durum, latum subuiride, subpallidum, magis exulceratum. Si quidem ad singulorum pilorum radices foramina sunt: per quæ fertur humor glutinosus subpallidus: crassitudinem mellis aut uisci referens: interdum olei. Si inciditur, uiridis intra atro apparet. Dolor autem & inflammatio ingens est, adeo ut acutam quoq; febrem mouere consuerit. Super id quod minus crebris foraminibus exasperatum est: recte imponitur & ficus arida, & lini semen quod in uino coctum: & emplastra, ac malagmata materiam educantia: aut quæ proprie huc pertinentia supra posui. Super alterum, & ea medicamenta. & farina ex mulso cocta sic, ut ei dimidium resinæ terebinthinæ miscetur, & ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adiectum, & uinæ taminicæ pars quarta fisco adiecta. Quod si parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt: totum ulcus usq; ad sanam carnem excidi oportet, & ulcere ablato super plagam medicamenta danda sunt: primum quæ pus citent: deinde quæ purgent: tum quæ impleant.

De acrochordone & Thymio, & Myrmecio, & Clauo,  
curationibusq; eorum.

Vnt quædam uero uerrucis similia: quorum diuersa nomina ut uitia sunt: ἀποχόρδωρα græci uocant ubi sub cute coit aliquid durius, & interdum paulo asperius coloris eiusdem: infra tenue: ad cutem latius: idq; modicum est: quia raro fabæ magnitudinem excedit. Vix unum tantum eodem tempore nascitur: sed ferè plura, maximeq; in pueris, eaq; nonnunquam subito desinunt, nonnunquam mediocrem inflammationem excitant. Sunt quæ etiam in pus conuertuntur. At thymion nominatur, quod super corpus quasi uerrucula eminet, ad cutem tenue: supra latius, subdurum, & in summo perasperum. Idq; summum colorem floris thymi representat. Vnde ei nomen est. Ibiq; facile finditur & cruentatur, nonnunquam aliquantum sanguinis fundit: fereq; circa magnitudinem fabæ ægyptiæ est: raro maius: interdum per exiguum: modo unum, modo autem plura nascuntur, uel in talis, uel palmis, uel inferioribus pedum partibus. Pessima tamē in obscenis sunt: maximeq; ibi sanguinem fundunt. Myrmecia autem uocantur, humiliora thymio durioraq; quæ radices altius exigunt, maioremq; dolorem mouent: infra lata: super autem tenuia: minus sanguinis mittunt: magnitudine uix unquam lupini modum



pinum modum excedunt. Nascentur ea quoque, aut in palmis, aut in inferioribus partibus pedum. Clauus autem nonnunquam quidem etiam alibi: sed in pedibus tamen maxime nascitur: præcipue tamen ex contuso: quantum interdum aliter, doloremque etiam, si non alias: tamen ingredienti mouet. ex his acrochordon: siue thymium sepe etiam per se finiuntur: et quo minora sunt: eò magis Myrmecia et clauus sine curatione uix unquam desinunt. Acrochordon, si excisa est nullam radiculam relinquit, ideoque ne renascitur quidem. Thymio, clauoque excisis subter rotunda radícula nascitur: quæ penitus descendit ad carnem, eaque relicta idem rursus exigit. Myrmecia latissimis radicibus inhaeret: ideoque ne excidi quidem sine exulceratione magna possunt. Clauum subinde deradere commodissimum est. Nam sine ulla ui sic emollescit: ac si sanguinis quoque aliquid emissum est: sepe emoritur. Tollitur etiam, si quis eum circum purgat, deinde imponit resinam, cui miscuit pulueris paulum: quem ex lapide molari contrito fecit. Cætera uero genera medicamentis adurenda sunt. Alijque id quod ex fecæ uini, myrmecij id quod ex alumine, et sandaracæ fit: aptissimum. Sed ea: quæ circa sunt: folijs contegi debent: ne ipsa quoque exulcerentur. Deinde postea lenticula imponi solet. Tollit thymium etiam ficus in aqua cocta.

De pustularum generibus, et earum curationibus.

Pustula maxime uernis temporibus oriuntur: earum plura genera sunt. Nam modo circa totum corpus, partemue aspreto quedam fit similis his pustulis: quæ ex urtica, uel ex sudore nascuntur. et *εξ αὐθιματῶν* græci uocant: eaque modo rubet: modo colorem cutis non excedunt. Nonnunquam plures similes uariis oriuntur, nonnunquam maiores pustulae linidæ, aut pallidæ, aut nigrae, aut aliter naturali colore mutato: subestque his humor. Vbi hæruptæ sunt, infra quasi exulcerata caro apparet *φλυκταῖνα* græce nominatur. fiunt uel ex frigore, uel ex igni, uel ex medicamentis. Psoriasis autem paulo durior, pustula est subalbida: acuta ex qua ipsa quod exprimitur, humidum est. Ex pustulis uero nonnunquam etiam ulcra scula sunt, aut aridiora, aut humidiora, et modo tantum cum prurigne, modo etiam cum inflammatione aut dolore, Exitque aut pus, aut sanies, aut utrumque. Maximeque id euenit in ætate puerili, raro in medio corpore: sepe in eminentibus partibus. Pessima pustula est: quæ *επιρυκτὴ* uocatur. Ea colore uel sublinida, uel subnigra, uel alba esse consuevit. Circa hanc autem uehemens inflammatio est, et cum adaperitis

Aurelij Cor.

m



est: reperitur intus exulceratio mucosa. Color est humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem eius est. Neque enim ea faba maior est. Atque hæc quoque oritur in eminentibus partibus: et ferè noctu. Unde nomen quoque à græcis ei ἐπιπρωκτὶς impositum est. In omni uero pustularum curatione primum est, multum ambulare atque exerceri. Si quid ista prohibet, gestari. Secundum est, cibum minuire: abstinere ab omnibus acerbis et extenuantibus: eademque nutrices facere oportet: si lactens puer ita affectus est. Præter hæc: is, qui iam robustus est: si pustulæ minutæ sunt: desudare in balneo debet, simulque super eas nitrum inspergere: oleoque uinum miscere: et sic ungi. Tum descendere in solium. Si nihil sic proficitur, aut si maius pustularum genus occupauit: imponenda lenticula est: detractaque summa pellicula: ad medicamenta lenia transeundum. et πρωκτὶς post lenticulam recte herba quoque sanguinali, uel uiridi coriandro curatur. Ulcera ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine fœni græci mixta sic, ut his inuicem rosa atque intubi suatus adijciatur: donec mellis crassitudo fiat. Proprie ad eas pustulas: quæ infantes male habent: lapidis: quem πυρίτην uocant P. XVIII. cum quinquaginta amaris uicibus miscetur, adijciunturque olei cyathi tres. Sed prius ungi ex cerussa pustulæ debent: tum hoc illini.

## De scabie, et eius curatione.

Scabies uero est humor cutis rubicundus: ex qua pustulæ oriuntur: quædam humidiores, quædam sicciores. Exit ex quibusdam sanies, fitque ex his continue exulceratio prurietis: ferpitque in quibusdā cito. Atque in alijs quidem ex toto desinit: in alijs uero certo tempore anni reuertitur. Quo asperior est, quoque prurit magis, eo difficilius tollitur. Itaque eam: quæ talis est, ἀπὸ τοῦ, id est ferè græci appellant. In hac quoque uictus ratio eadem: quæ supra necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est: quod fit ex spodij, croci, æruginis, singulorum P. XI. piperis albi: omphacij: singulorum P. XI. cadmiæ P. XVIII. Aut ubi iam exulceratio est: id quod fit ex sulphuris P. XI. ceræ P. XIII. picis liquidæ hemina: olei sextarijs duobus. Quæ simul incoquantur, dum crassitudo mellis fiat. Est etiam quod ad Protarchum authorem refertur. Habet hoc farine lupinorum sextarium: nitri cyathos quattuor: picis liquidæ heminam: resinæ humidæ sēlibram: aceti cyathos tres. Crocum quoque liquidum, ærugo, myrrha, cinis æquis portionibus recte miscentur, et ex passo coquantur. Idque omnē pituitam ubique sustinet. At si nihil aliud



est, amurca ad tertiam partē decocta, uel sulphur picæ liquida mixtū  
sicut in pediculis proposui: hominibus quoq; scabie laborantibus opi-  
tulantur.

De impetiginis speciebus & curationibus.

i Impetiginis uero species sunt quattuor. Minime mala est,  
quæ similitudine scabiem representat. Nam & rubet &  
durior est, & exulcerata est & roditur. Distat autem ab ea  
quia magis exulcerata est, & uariis similes pustulas habet, uideturq;  
esse in ea quasi bullulæ quædam ex quibus interposito tempore squa-  
mulæ resoluuntur: certioribusq; hoc temporibus reuertitur. Alterum  
genus peius est simile papulæ ferè: sed asperius, rubicundiusq;: figu-  
ras uarias habens. Squamulæ ex summa cute discedunt: roseo maior  
est: celerius & latius procedit: certioribusq; etiam nonnunquam pri-  
or temporibus & fit et desinit: rubicæ cognominatur. Tertia etiam  
num deterior est. Nam & crassior est, & durior, et magis tumet: in  
summa cute finditur: & uehementius rodit. Ipsa quoq; squamosa, sed  
nigra procedit: & late & tarde eminus serpit. In temporibus, aut  
oritur, aut desinit, neq; ex toto tollitur: nigrae cognomen est. Quartum  
genus est, quod curationem omnino non recipit: distans colore. Nam  
subalbidum est & recenti cicatrici simile, squamulasq; habet palli-  
das, quasdam subalidas, quasdam lenticulæ similes. quibus demptis  
nonnunquam profluit sanguis. Alioquin uero humor eius albidus est,  
cutis dura atq; fissæ est, proceditq; latius. Hæc uero omnia maxime  
genera oriuntur in pedibus et manibus, atq; ungues quoq; infestant.  
Medicamentum non aliud ualentius est, quàm quod ad scabiem quoq;  
pertinere sub auctore. Protarcho retuli. Serapion autem nitri. P. XII.  
sulphuris. P. XIII. exapiebat resina copiosa, eoq; utebatur.

De papulis, & earum curatione.

p Apularum uero duo genera sunt. Altera est, in qua per im-  
pimas pustulas cutis exasperatur & rubet, leniterq; rodi-  
tur: medium habet pauxillo leuius: tarde serpit, idq; uitiū  
maxime rotundum incipit, eademq; ratione in orbem procedit. Alte-  
ra autem est, quam ἀρπίων, græci appellant. In qua similiter qui-  
dem, sed magis cutis exasperatur, exulceraturq; ac uehementius  
& roditur & rubet: interdum etiam pilos remittit. Quæ minus  
rotunda est: difficilius sanescit: nisi sublata est, in impetiginē uertitur:

m ij



sed leuis papula, etiam si ieiuna salina quotidie defricatur: sanescit. Maior commodissime murali herba tollitur, si sub ea detrita est. Vt uero ad composita medicamenta ueniamus, idem illud Protarchi tanto ualentius in his est, quanto minus in his uitij est: alterum ad idem Myronis: nitri rubri, thuris, singulorum. P. XI. cantharidum purgatum. P. XII. sulphuris ignem non experti tantundem, resinae terebinthinae liquidae. P. XXX. farinae lolij sext. iij. guthi diathos tres: picis crudae sext.

De uutilignis speciebus, idest de Alpho & Mela, et leuca, & earum curatione.

Utiligo quoque, quamuis per se nullum periculum affert: tamen foeda est, & ex malo corporis habitu fit. Eius tres species sunt. Alphos uocatur, ubi color albus est fere subasper et non continuus, ut quaedam quasi guttae dispersae esse uideatur. Interdum etiam latus, & cum quibusdam intermissionibus serpit. Melas colore ab hoc differt: quia niger est, & umbræ similis. Cætera eadem sunt. Albus non habet quiddam simile alphi, sed magis albida est, & altius descendit, in eaque albi pili sunt, & lanugini similes. Omnia hæc serpunt. Sed in alijs celerius, in alijs tardius. Alphos & Melas in quibusdam uarijs temporibus & oriuntur, & desinunt. Leuca quæ occupauit: non facile dimittit. Priora curationem non difficillimam recipiunt: ultimum uix unquam sanescit: ac si quid ei uitio demptum est: tamen non ex toto sanus color redditur. Vtrum autem aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acu pungi. Si sanguis exit: quod fere fit in duobus prioribus, remedio locus est. Si humor albidus, sanari non potest. Itaque ab hoc quidem abstinendum est. Super id uero: quod curationem recipit, imponenda lenticula mixta cum sulphure & thure sic, ut ea contrita ex aceto sit. Aliud ad idem: quod ad Hireneum auihorē refertur. Alcyonium, nitrum, cuminum, fici folia arida paribus portionibus contunduntur adiecto aceto. His in sole utiligo perungitur: deinde non ita multo post: ne nimis erodatur: eluitur. Proprie quidem Myrone auihore eos: quos alphos uocari dixi, hoc medicamento perungunt. sulphuris. P. p. Z. aluminis scissilis. P. p. Z. nitri. P. XIII. myrti radice contrita acetabulum miscent: deinde in balneo super utiliginem inspergunt farina ex faba: tum hæc inducunt. Hi uero, quos melanas uocari dixi: curantur: cum simul contrita sunt alcyonium, thus, hordeum, faba sine oleo, in balneo ante sudorē insperguntur: tum genus id utilignis defricatur.



## De uitijis singularum corporis partium. Cap. I.

## De capillis fluentibus.

**d** Ixi de his uitijis, quæ per totum corpus orientia: medicamentorum auxilia desiderat. nunc ad ea ueniam, quæ non nisi in singulis partibus incidere consuerunt orsus à capite. In hoc igitur capillis fluentibus maxime quidem sæpe radèdo succurritur. adiicit enim uim quædam ad continendum ladanum cum oleo matum. nunc de his capillis loquor, qui post morbum ferè fluunt. nã quo minus caput quibusdã ætate nudetur, succurri nullo modo potest.

## De porrigne &amp; eius curatione. Cap. II.

**P** Orrigo autem est ubi inter pilos quædam quasi squamulæ surgunt, eæq; à cute resoluntur, & interdū madent: multo sæpius sicca sunt. Idq; euenit modo sine ulcere, modo exulcerato loco: huic quoq; modo malo odore, modo nullo accidente: ferèq; id in capillo fit, rarius in barba: aliquando etiam in supercilio. ac neq; sine aliquo corporis uitio nascitur, neq; ex toto inutile est. nam bene integro capite non exit. Vbi aliquid in eo uitium est, non incommodum est, summam cutem potius subinde corrumpi: quàm id quod nocet in aliam partem magis necessariam uerti. Commodius est ergo subinde pectendo repurgare: quàm id ex toto prohibere. Si tamen ea res nimium offendit: quod humore sequente fieri potest, magisq; si id etiam mali odoris est, caput sæpe radendum est, dein id super adinuandum aliquibus ex leniter reprimentibus: quale est nitrum cum aceto, uel ladanum cum myrteo uino, uel myrobalanum cum uino. Si parum per hæc proficiatur uehementioribus uti licet, cum eo, ut sciamus, utiq; in recenti uitio id inutile esse.

## De syofsi &amp; eius curatione. Cap. III.

**e** St etiam ulcus, quod à fici similitudine σύωσις à græcis nominatur. caro excrescit: & id quidem generale est. sub eo uero duæ species sunt. alterum ulcus durum & rotundum est, laterum humidum & inæquale. ex duro exiguum quiddam &

Aurelij Cor.

m iij



# LIBER

glutinosum exit: ex humido plus, & mali odor is. Fit uero utrumq; in his partibus, quæ pilis conteguntur: sed id quidem, quod callosum & retundum est, maxime in barba. Id uero quod humidum, præcipue est in capillo. Super utrumq; oportet imponere elaterium, aut lini semen contritum & aqua coactum, aut ficum in aqua decoctam, aut emplastrum terrapharmacum ex aceto subactum: terra quoq; erithrea ex aceto liquata recte illinitur.

## De Areis & earum curationibus. Cap. IIII.

Rearum quoq; duo genera sunt. commune utriq; est: quod emortua summa pellicula, pili primum extenuantur: dein de excidunt: ac si ictus is locus est, sanguis exit liquidus et mali odoris, increfcitq; utrumq; in alijs celeriter, in alijs tarde: Peius est quod densam cutem & subpinguem, & ex toto glabram facit: sed ea quæ ἀλωπενία nominatur, sub qualibet figura dilatatur, fit et in capillo & in barba. Id uero quod à serpentis similitudine ὀφθαλμοειδής appellatur: incipit ab occipitio: duorum digitorum latitudinem non excedit: ad aures duobus capitibus serpit: quibusdam etiam ad frontem: donec se duo capita in priorem partem committant. Illud uicissim in qualibet ætate est: hoc ferè in infantibus. Illud uix unquam sine curatione: hoc per se sæpe finitur. quidam hæc genera arearū scalpello exasperant. quidam illinunt adurētia ex oleo, maximeq; chartam combustam. quidam resinam terebinthinam cum tapsia inducunt. sed nihil melius est, quàm nouacula quotidie radere: qua cum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur pilorū radiculæ: neq; ante oportet desistere, quàm frequentem pilū nasci apparuerit. Id autem, quod subinde raditur: illini atramento scriptorio satis est.

## De Varis, et Lenticulis, & Ephelide, & eorū curationibus. Cap. V.

enè ineptiæ sunt: curare Varos, et Lenticulas, & Ephelidas. sed eripi tamen foeminis cura cultus sui non potest. Ex his autem quas supra proposui, uari, lenticulæq; uulgo notæ sunt: quanuis rarior ea species est, quàm ξείριος græci uocant: cum sit ea lenticula rubicundior et inæqualior. ξείριος uero à plerisq; ignoratur: quæ nihil est: nisi asperitas quædam & durities mali coloris. cætera non nisi in facie, Lenticulæ etiam in alia parte nonnunquam nasci solent. de qua per se scribere alio loco uisum operæ præcium non est. sed Vari commodissime tolluntur imposita resina, cui nō mē



nus quàm ipsa est: aluminis, scissilis, & paulum mellis adiectum est. Lenticulam tollunt galbanum et nitrum, cum pares portiones habet, contritaq; ex aceto sunt: donec ad mellis crassitudinem uenerint. His corpus illinendum, & interpositis pluribus horis mane eluendū est: oleoq; leniter unguendum. Epheliden tollit resina, cui tertia pars salis fossilis, & paulum mellis adiectum est. Ad omnia uero ista atq; etiā ad colorandas cicatrices potest ea compositio, quæ ad Tryphonem patrem auctorem refertur. In ea pares portiones sunt myrobalani, crocomagmatis, cretæ amoliæ subcerulæ, nucum amararum, farinæ hordei atq; erui, struthij albi: scitula campanæ seminis. quæ omnia contrita, melle quàm amarissimo coquantur, illitumq; à uespere usq; mane eluitur.

De oculorum morbis, curationibusq; eorum: & primo de his morbis qui lenibus medicamentis curantur. Cap. VI.

Ed hæc quidem mediocria sunt. Ingentibus uero et uarijs casibus oculi nostri patent. qui cum magnam partem ad uitæ simul & usum & dulcedinem conferant: summa cura tuendi sunt. protinus autem orta lippitudine quædam notæ sunt: ex quibus quid euenturum sit: colligere possimus. nam simul & lacryma, & tumor, & crassa pituita cœperint, si ea pituita lacrymæ mixta est: & ea lacryma calida est: pituita uero alba & mollis, tumor non durus: longæ ualeitudinis metus non est. at si lacryma multa & calida: pituita paulum, tumor modicus: idq; in uno oculo est: longum id, sed sine periculo futurum est. Idq; lippitudinis genus minime cum dolore est, sed uix ante uigesimum diem tollitur: nonnunq; per duos menses durat: sed quandoq; finitur. Si pituita alba et mollis esse incipit, lacrymæq; miscentur, aut si simul hæ utrunq; oculum inuaserunt: potest esse breuior, sed periculum ulcerum est. Pituita autem si crassa & arida dolorem quidē mouet, sed maturius desinit, nisi quid exulcerauit, tumor magnus si sine dolore est & si cæcus, sine ullo periculo est. si si cæcus quidem: sed cum dolore est, ferè exulcerat, & nonnunq; ex eo casu fit, ut palpebra cum oculo glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor in palpebris, pupillis'ue est: ubi super magnum dolorem lacrymæ salsæ, calidæq; eunt, aut etiam si tumore infinito diu lacryma cum pituita profluit. peius etiam nam est, ubi pituita calida, aut linida est, lacryma calida aut multa profluit, caput calet, à temporibus ad oculos dolor peruenit: nocturna uigilia urget. si quidem sub his oculis plerunq; rumpitur: notumq; est, ut tantum exulceretur. In-



## LIBER

tus ruptum oculum febricula inuat. Si foras iam ruptus procedit: si-  
ne auxilio est: si de nigro aliquid albidum factum est, diu manet. at  
si asperum, crassum est: etiam post curationem uestigium aliquod re-  
linquit. Curari uero oculos sanguinis detractio, medicamento, bal-  
neo, uino uetustissimus auctor Hippocrates memoriae prodidit. sed  
eorum tempora & causas parum explicuit. In quibus medicinae sum-  
ma est. neq; minus in abstinentia & alui ductione saepe auxilij est.  
Hos igitur interdum inflammatio occupat: ubi cum tumore in his do-  
lor est, sequiturq; pituitae cursus nonnunquam copiosior uel acrior:  
nonnunq; utraq; parte moderatior. In eiusmodi casu prima omnium  
sunt, quies & abstinentia. Ergo primo die loco obscuro cubare debet,  
sic ut à sermone quoq; abstineat. nullum cibum assumere: si fieri po-  
test ne aquam quidem: sin minus, certe quam minimum eius. Quod  
si graues dolores sunt: commodius secundo die: si tamen res urget: etiā  
primo sanguis mittendus est: utiq; si in fronte uenae tumunt, si firmo  
corpori materia superest. si uero minor impetus, minus acrem cura-  
tionem requirit, aluum, sed non nisi secundo, tertio ue die duci oportet.  
At modica inflammatio neutrum ex his auxilium desiderat. sa-  
tisq; est uti quiete & abstinentia. Neq; tamen in lippientibus longum  
ieiunium necessarium est: ne pituita tenuior atq; acrior fiat. sed secū-  
do die dari debet id quod leuissimum uideri potest ex his, quae pitui-  
tam faciunt crassiores: qualia sunt oua sorbilia. Si minor uis urget:  
pulticula quoq; aut panis ex lacte. Insequentibusq; diebus quantum  
inflammationi detrahatur: tantum adijci cibis poterit. sed generis eius-  
dem: utiq; ut nihil falsum, nihil acre, nihil ex his: quae extenuant, su-  
matur: nihil potui praeter aquam. Et uictus quidem ratio talis ma-  
xime necessaria est. Protinus autem primo die croci. P. XI. & farinae  
candidae quam tenuissimae. P. XII. excipere oportet oui albo: donec mel-  
lis crassitudinem habeat: idq; in linteolum illinere & fronti agglu-  
tinare, ut compressis uenis pituitae impetum cohibeat. si crocum non  
est, thus idem facit: Linteolo an lana excipiatur: nihil interest. Super  
iungit uero oculi debent: sic ut croci quantum tribus digitis compre-  
hendi potest: sumatur: myrrhae: ad fabae: papaueris lacrymae ad len-  
ticulae magnitudinem. eaq; cum passo conterantur, & specillo super  
oculum inducatur. Aliud ad idem: Myrrhae. P. XI. Mandragorae suc-  
ci. P. XII. papaueris lacrymae. P. XII. foliorum rosae, cicutae seminis:  
singulorum. P. XIII. acaciae. P. XIII. gummi. P. XVIII. Et haec qui-  
dem interdum. noctu uero: quo commodior quies ueniat: non alienum  
est superimponere candidi panis interiorum partem ex uino suba-  
ctam. Nam & pituitam reprimat: & si quid lacrymae prociussit, ab-  
sorbet,



forbet: & oculum glutinari non patitur. Si graue id et durum propter magnum oculorum dolorem uidetur: oui & album & vitellus in uas disfundendum est, adijciendumq; eò mulsi paulum: idq; digito permiscendum. Vbi facta unitas est, demitti debet lana mollis bene carpta. quæ id excipiat, superq; oculos imponi. Ea res & leuis est: & refrigerando pituitam coercet, & non exarescit, et glutinari oculum non patitur. Farina quoq; hordeacea cocta, & cum malo cotoneo cocto mixta commode imponitur. neq; ab ratione abhorret etiam penicillo potissimum uti expresso: si leuior impetus est, ex aqua: si maior, ex posca. Priora fasciæ deliganda sunt, ne per somnam cadant, et hoc superimponi satis est, quia & reponi ab ipso commode potest, et cum inaruit, iterum madefaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu prohibeat: eorum aliquid dandum est: quæ ἀνώδυνα græci uocant. satisq; est puero, quod erui, uiro, quod fabæ magnitudinem impleat. In ipsum uero oculum primo die, nisi modica inflammatio est, nihil recte conijcitur. saepe enim potius concitatur eò pituita, quam minuitur. A secundo die graui quoq; lippitudini per indita medicamentum recte succurritur, ubi uel iam sanguis missus, uel aluus ducta est, aut ubi neutrum necessarium esse manifestum est.

## De diuersis oculorum collirijs.

Uita autem, multorumq; auctorum colliria ad id apta sunt: nouisq; etiam nunc mixturis temperari possunt, cum lenia medicamenta & modice reprimentia facile et uarie miscantur. Ergo nobilissima exequar.

## Philonis collirium.

St igitur Philonis quod habet cerussæ elotæ: spodij, gummi, singulorum. P. XI. papaueris lacrymæ combustæ. P. XI. Illud scire oportet, hic quoq; omnia medicamenta, singula primum per se teri: deinde mixta iterum adiecta paulatim, uel aqua, uel alio humore: gummi cum quasdam alias facultates habeat, hoc maxime prestare, ut ubi colliria facta inaruerunt, glutinata sint, neque fricentur.

## Dionysij collirium.

Dionysij uero collirium est, papaueris lacrymæ combustæ donec tenerescat. P. XI. thuris combustæ, gummi: singulorum. P. XII. spodij P. XIII.



LIBER

Cleonis collirium.

Leonis nobile admodum: papaueris lacrymæ frictæ. P. XI. croci. P. XI. gummi. P. XI. quibus cum teruntur: adiicitur rosa succus. aliud eiusdem valentius: squamæ æris quod sôma appellatur. P. XI. croci. P. XII. spodi. P. XIII. plumbi & eloti & combusti. P. XVI. gummi tantundem. eius aliud quoque idem est: maxime ubi multa pituita profluit. castorei. P. XZ. aloes. P. XL. croci. P. XXI. myrrhæ. P. XII. lycij. P. XIII. cædmæ curatæ. P. XVIII. sibi tantundem: acaciæ succi. P. XXII. quod cum gummi misuit id quod habet liquidum in pixidecula seruatur. Theodotus uero huic compositioni adiecit papaueris lacrymæ combustæ. P. X. æris combusti et eloti. P. XII. nucleos palmarum combustos numero. XX. gummi. P. XXII.

Theodoti collirium, Acharistum appellatum.

T ipsius Theodoti, quod à quibusdā Ἀχαριστὸν nominatur: eiusmodi est. castorei: nardi indicij: singulorum. P. XI. lycij. P. XII. papaueris lacrymæ tantundem: myrrhæ. P. XII. croci, cerussæ elotæ: aloes, singulorum. P. XIII. cædmæ, botryodis elotæ æris combusti singulorum. P. XVIII. gummi. P. XVIII. acaciæ succi. P. XXX. sibi tantundem: quibus aqua pluvialis adiicitur.

Cythion, uel tephriion collirium.

Ræter hæc ex frequentissimis collirijs est id quod quidam ὑψίον: quidā à cinereo colore τέφριον appellant: amyli, tragacanthæ, acaciæ succi, gummi, singulorum. P. XI. papaueris lacrymæ. P. XII. cerussæ elotæ. P. XVIII. spumæ elotæ. P. XXIII. quæ æque ex aqua pluviali conteruntur.

Enelpidis collirium, trygodes nominatum.

Velpides autem, qui ætate nostra maximus fuit oculus medicus utebatur eo, quod ipse composuerat: ἑνελπίδης nominabat. castorei. P. XII. lycij, nardi, papaueris lacrymæ, singulorum. P. XI. croci, myrrhæ, aloes, singulorum. P. XIII. æris combusti. P. XVIII. cædmæ & sibi: singulorum. P. XXII. acaciæ succi. P. XXXVI. gummi tantundem. quo grauior uero quæque inflammatio est: eo magis leniri medicamentum debet, adiecto uel albo oui, uel m



liebri lacte. at si neq; medicus, neq; medicamentum præsto est, sæpius utrumlibet horum in oculis penicillo ad id ipsum factò infusum, id malum lenit. Vbi uero aliquis releuatus est: iamq; cursus pituitæ constitit: reliquias fortasse leniores futuras discutiunt balneum, & uinum. Igitur lauari debet leniter ante ex oleo perfrictus, diutiusq; in cru-ribus & feminibus, multa; calida aqua fouere oculos: deinde per caput prius calida, num egelida perfundi, à balneo cauere ne quo fri-gore afflatus ne lædatur. post hæc cibo paulo pleniore, quàm ex eorū dierum consuetudine uti, uitatis tamen oibus pituitam extenuantibus, uinū bibere lene: subausterū, modice uetus, neq; effuse, neq; timide, ut neq; cruditas ex eo, & tamen somnus fiat, lenianturq; intus laten-tia acris. sed si quis in balneo sensit maiorem oculorum perturba-tionem, quàm attulerat: quod inadere his solet: qui manente adhuc pituitæ cursu, festinarunt, quàm primū discedere debet: nihil eo die uini assumere: cibi minus etiam quàm pridie. deinde cum primum satis pituita substat iterum ad usum balnei redire. solet tamen eueni-re nonnunquam siue tempestatum uitio, siue corporis, ut pluribus die-bus neq; dolor, neq; inflammatiō, & minime pituitæ cursus finiatur. quod ubi inadit, iamq; ipsa uetustate res matura est, ab his hisdem auxilium petendum est: id est ba-neo ac uino. hæc enim ut in recen-tibus malis aliena sunt: quia concitare ea possunt & accendere, sic in ueteribus, quæ nullis alijs auxilijs cesserunt: admodum efficacia esse cō-fuerunt. uidelicet hic quoq; ut alibi, cum secunda uana fuerint con-trarijs adiuantibus. sed ante tonderi ad cutem conuenit. deinde in balneo aqua calida q̄ plurima caput atq; oculos fouere: tum utrumq; penicillo detergere, & ungere caput irino unguento, continereq; in le-ctulo se, donec omnis calor qui conceptus est finiatur, desinatq; sudor, qui necessario in capite collectus est. tum ad idem cibi uiniq; genus ue-niendum sic, uti potiones meracæ sint: obtegendumq; caput & quie-scendum. sæpe enim post hæc grauis somnus, sæpe sudor, sæpe alui deiectio pituitæ cursum finit. si leuatum malum est, quod aliquanto sæpius fit: per plures dies idem fieri oportet, donec ex toto sanitas re-stituatur. si diebus hisdem alius nihil reddit: ducenda est: quo magis superiores partes leuentur. Nonnunq̄ autem ingens inflammatiō tan-to impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat: proprie enim πρὸ μῶ-σις id, quoniam oculi prociuant, græci appellant. His utiq; si uires pa-tiuntur, sanguinē mitti: si id fieri non potest, alium duci, longioremq; in diem indici necessarium est. Opus autem lenissimis medicamentis est. Ideoq; Cleonis collirio quidam, quod ex duobus ante positum est: utuntur. sed optimum est Nilei. neq; de ullo magis inter omnes au-ctores conuenit.



## LIBER

Nilei collirium omnium optimum.

**D** habet nardi indici, papaueris lacrymæ, singulorum. **P**

**XI**. gummi. **P**. **XI**. croci. **P**. **XII**. foliorum rosæ recentium. **P**.

**XIII**. quæ uel aqua pluuiatili, uel uino leni subaustero coguntur. Neq; alienum est malicorium, uel sertulam campanam ex uino coquere, deinde conterere: aut myrrham nigram cum rosæ folijs miscere, aut hyoscyami folia cum oui cocti uitello, aut farinam cum acaciæ succo, uel passo, aut mulso. quibus si folia quoq; papaueris adiunguntur, aliquanto ualentiora sunt. Horum aliquo præparato penicillo fouere oculos oportet ex aqua calida expresso: in qua ante mel myrti, uel rosæ folia decocta sint. deinde ex illis aliquid imponi. præter hæc ab occipitio incisa cute cucurbitula admouenda est. Quod si per hæc restitutus oculus in sedem suam non est: eodēq; modo prolapsus permanet: scire oportet lumen esse amissum. deinde futurum ut inarescat is, aut in pus uertatur. Si suppuratio se ostendit, ab eo angulo qui propior tempore est: incidi oculus debet: ut effuso pure & inflammatione ac dolor finiatur: et intus tunica residat quo minus foeda postea facies sit. Utendum deinde uel hisdem collirijs est ex lacte, aut ouo uel croco, cui album oui miscetur. Ac si induruit & sic emortuus est, ne in pus uerteretur: quatenus foede prominebit excidendum erit: sic ut hamo summa tunica apprehendatur, infra id deinde scalpellus incidat: tum eadem medicamenta erunt coniicienda: donec omnis dolor finiatur. Hisdem medicamentis in eo quoq; oculo utendum est: qui primum prociidit: deinde per plura loca fissus est.

De carbunculis oculorum, & eorum curatione.

**O**lent etiam carbunculi ex inflammatione nasci: nonnunquam in ipsis oculis, nonnunquam in palpebris: & in his ipsis oculis modo ab interiore, modo ab exteriori. In hoc casu aliud duenda est: cibus minuendus: lac potui dandum, ut acria quæ læserunt: leniantur. Quod ad cataplasmata & medicamenta pertinet: his utendum, quæ aduersus inflammationes proposita sunt. Atq; hic quoq; Nilei collirium optimum est. si tamen carbunculus in exteriori palpebræ parte est, ad cataplasmata aptissimum est lini semen ex mulso coctum: aut si id non est, tritici farina eodem modo cocta.

De pustulis oculorum, et curatione earum.

**P**ustulæ quoq; ex inflammationibus interdum oriuntur: quod si inter initia protinus incidit: magis etiam seruanda sunt quæ de sanguine et quiete supra posui. sin serius quam ut sanguis



mitti possit: alius tamen ducenda est. si id quoque aliqua res inhibet, utique uictus ratio seruanda est. Medicamentis autem hic quoque lenibus opus est, quale Nilei: quale Cleonis est.

φιλαιθου's collirium ad pustulas oculorum.

D quoque: quod philalethos uocatur: huic aptum est. Myrrhæ, papaueris lacrymæ: singulorum. P. XI. plumbi eloti, terræ samie, quæ ἀσπὴρ uocatur: tragacanthæ: singulorum. P. XIII. stibis cocti, amyli: singulorum. P. XVI. spodij eloti, cerussæ elotæ, singulorum. P. XVIII. Quæ aqua pluuiali excipiuntur. Vnus collirij, uel ex ouo, uel ex lacte est.

De ulceribus oculorum, et coru' curatione, et de διαβαλόν collirio

X pustulis ulcera interdum fiunt, ea quæ recentia æque lenibus medicamentis nutrienda sunt, et hisdem ferè quæ supra in pustulis posui. Fit quoque proprie ad hæc quod διαβαλόν uocatur. Habet aeris combusti, et eloti papaueris lacrymæ frictæ: singulorum. P. XI. spodij eloti, thuris, stibis combusti et eloti, myrrhæ gummi, singulorum. P. XII.

Curatio oculorum aliquo casu imminutorum.

Venit etiam ut oculi, uel ambo, uel singuli minores fiant quam esse naturaliter debeant: Idque et acer pituitæ cursus in lippitudine efficit, et continuati fletus, et ictus parum bene curati. In his quoque hisdem lenibus medicamentis: ex muliebri lacte utendum est. Cibus uero his, qui maxime corpus alere et implere consueverunt. Vitandaque omni modo causa: quæ lacrymas excitet: citraque domesticorum. quorum etiam si quid tale incidit: eius notitiæ subtrahendum: atque acris quoque medicamenta, et acres cibi non alio magis nomine his nocent: quam quod lacrymas mouent.

De pediculis palpebrarum.

Enus quoque uitij est: qui inter pilos palpebrarum pediculi nascuntur. Id φθιρίαιον græci nominant. Quod cum ex malo corporis habitu fiat: raro non ultra procedit. Sed ferè tempore interposito pituitæ cursus acerrimus sequitur: exulceratisque uehementer oculis aciem quoque ipsam corrumpit. His alius ducenda, caput ad cutem tondendū, diuque quotidie ieiunij perficiendum. His;



# LIBER

ambulationibus, alijsq; exercitationibus diligenter utendum, gargarizandumq; ex mulso, in quo nepeta, & pinguis ficus decocta sit: saepe in balneo multa calida aqua fouendum caput. Vitandi acres cibi, late uinoq; pingui utendum, bibendumq; liberalius, quam edendum est. Medicamenta uero intus quidem lenia danda sunt, ne acriorem pituitam conatent. Super ipsos uero pediculos alia, quae necare eos et prohibere ne similes nascentur, possint. Ad id ipsum spuma nitri: P. XI. sandaracae. P. XI. uniae taminiae. P. XI. simul teruntur, adijciturq; uetus oleum pari portione atq; acetum donec ei nullis crassitudo sit.

De oculorum grauioribus morbis, qui ex inflammationibus oriuntur, & ualidioribus medicamentis curantur: & de Andree collirio, & de *ῥίαν κέρκας*.

Actenus oculorum morbi lenibus medicamentis nutrium =  
h tur. Genera deinde alia sunt: quae diuersam curationem de siderant, fereq; in inflammationibus nata sunt, sed finitis quoq; his manentia. Atq; in primis in quibusdam perseverat tenuis pituitae cursus: quibus alius ab inferiore parte euocanda est: demendum aliquid ex cibo: neq; alienum est illi frontem compositione Andree, Quae habet gummi. P. XI. cerussae, stibis, singulorum. P. XII. spumae argenti & coctae & elotae. P. XIII. Sed & ea spuma ex aqua pluuiali coquitur, & arida haec medicamenta ex succo myrti continentur. His illita fronte, cataplasma quoq; super iniiciendum est ex farina, quae frigida aqua coacta sit: cuiq; aut acaciae succus, aut cypressus adiecta sit. Cucurbitula quoq; in oculo uertice recte accommodatur, aut ex temporibus sanguis emittitur. Inungi uero eo debet, quod habet squamae aeris: papaueris lacrymae: singulorum. P. XI. ceruini cornus combustae, & eloti plumbi, eloti gummi: singulorum. P. XIII. thuris. P. XXII. Hoc collirium: quia cornum habet, *ῥίαν κέρκας* nominatur. Quotienscumq; non adicio quod genus humoris adijciendum sit: aquam intelligi uolo.

Memigmenon Euelpidis collirium.

Idem Euelpidis: quod *μεμυγμένον* nominabat. In eo papaueris lacrymae, et albi piperis singulae unciae sunt: gummi libra: aeris combustae. P. XI. Inter has autem curationes post intermissionem aliquam profunt balneum & uinum. Cumq; omnibus lippientibus uitandi cibi sunt, qui extenuant, tum praecipue quibus tenuis humor diu fertur. Quod si iam fastidium est eorum, quae pituitam crassionem reddunt: sicut in hoc genere materiae maxime



promptum est: confugiendum est ad ea: quæ quia uenirent, corpus quoque astringunt.

De oculorum ulceribus supercrescentibus, sordidis, cauis, ueteribus, & de curationibus singulorum.

**T**ulcera, si cum inflammatione finita non sunt, aut supercrescentia, aut sordida, aut caua, aut certe uetera esse consuevunt. Ex his supercrescentia collirio: quod *μυζιμενον* uocatur: optime reprimuntur. Sordida purgantur et eodem, ex eo, quod *μυλινον* nominatur.

*μυλινον* collirium.

**h**abet æruginis. P. XIII. gummi tantundem: ammoniaci, manij sinopia: singulorum. P. XXVI. Quæ quidam ex aqua, quidam quo uehementiora sint, ex aceto terunt.

*Phynon* collirium Euelpidis.

**D** quoque Euelpidis, quod *phynona* appellabat, huic utile est Croci. P. XI. papaueris lacrymæ gummi, singulorum. P. XII. æris combusti & eloti, myrrhæ: singulorum. P. XIII. piperis albi. P. XVI. Sed ante linitum hoc, ungendum est.

*Sphæron* collirium Euelpidis.

**D** quoque eiusdem, quod *sphæron* nominabat: eodem ualet. Lapidis hæmatitis eloti. P. XII. piperis grana sex: cadmiæ elotæ, myrrhæ, papaueris lacrymæ: singulorum. P. XIII. croci. P. XIII. gummi. P. XVIII. Quæ cum uino amineo conteruntur.

*Liquidum* Euelpidis collirium.

**L**iquidum quoque medicamentum ad idem componebat: in quæ erant hæc. Eruginis. P. X. manij combusti, atramenti sutorij annamoni: singulorum. P. XII. croci, nardi, papaueris lacrymæ: singulorum. P. XI. myrrhæ. P. XII. æris combusti. P. XIII. anæris ex odoribus. P. XIII. piperis grana. XV. Hæc ex uino austero teruntur. Deinde cum passi tribus heminis decoquuntur. donec corpus unum sit. Idque medicamentum uetustate efficiatius fit.

De cauis oculorum ulceribus, & curationibus.

**C**aua uero ulcera commodissime implent ex his quæ supra posita sunt, *sphæron*, & id quod *φιλανθοῦς* uocatur. Idem *sphæron* uetusis ulceribus & uix ad cicatricem uenientibus optime succurrit.



## LIBER

### Hermonis collirium.

St etiam collirium, quod cum ad plura valeat: plurimum  
tamen proficere in his ulceribus uidetur. Refertur ad her-  
monem authorem: habet piperis longi. P. XII. albi. P. XV.  
cinnamomi. costi: singulorum. P. XI. atramenti sutorij: nardi, castae, ca-  
stori: singulorum. P. XII. gallae. P. XV. myrrhae, croci, thuris, lycij, ce-  
russae: singulorum. P. XVIII. papaueris, lacrymae. P. XII. aloes: aeris  
combusti, cadmiae singulorum. P. XXVI. acatiae, stibis, gummi: singulo-  
rum. P. XXV.

De cicatricibus oculorum: quae ex ulceribus factae sunt: et quomodo  
curari debeant: et de Asclepia, et Canopite, et Pyxino collirijs.

Actae uero ex ulceribus cicatrices duobus uitjs periclitan-  
tur: ne aut cauae, aut crassae sint. Si cauae sunt, potest eas im-  
plere id, quod sphaerion uocari dixi, uel id, quod asclepias  
nominatur: habet papaueris lacrymae P. XII. sagapeni, opopanaeis:  
singulorum. P. XIII. eruginis. P. XIII. cumini. P. XVIII. piperis. P.  
XXII. cadmiae elotae: cerussae: singulorum. P. XXVI. At si crassae cicat-  
trices sunt: extenuant uel Smilion, uel Canopite collirium: quod habet  
cinnamomi, acatiae: singulorum. P. XI. Cadmiae elotae, croci, myrrhae:  
papaueris lacrymae: gummi: singulorum. P. XII. piperis albi, thuris,  
singulorum. P. XIII. aeris combusti. P. XVIII. cum aqua pluviali.  
uel Euelpidis Pyxinum: quod ex his constat. Salis fossilis. P. XIII.  
ammoniaci: thymiamatis. P. XVIII. papaueris lacrymae. P. XXII. ce-  
russae. P. XXV. piperis albi, croci siculi: singulorum. XXXXI. gum-  
mi. P. XXIII. cadmiae elotae. P. XVIII. Maxime tollere cicatricem ui-  
detur id quod habet gummi. P. XII. eruginis. P. XI. crocomagna-  
tis. P. XIII.

De alio genere inflammationis oculorum.

St etiam genus inflammationis: in qua, si cui tument ac di-  
stenduntur cum dolore oculi, sanguinem ex fronte emitti  
necessarium est: multaq; aqua calida caput, atq; oculos fove-  
re: gargarizari ex lenticula, uel ex fici cremore: inungi acribus medi-  
camentis, quae supra comprehensa sunt: maximeq; eo quod sphaerion  
nominatur, quod lapidem haematitem habet. Atq; alia quoq; utilia  
sunt, quae ad extenuandam aspritudinem fiunt: de qua protinus di-  
ctum. Hanc autem inflammatio oculorum fere sequitur: interdum maior,  
interdum



Interdum leuior, nonnunquam etiam ex aspritudine lippitudo fit: deinde aspritudinem ipsam auget, fitq; ea in alijs breuis, in alijs longior, & quæ uix unquam finitur. In hoc genere ualetudinis quidam crassas, durasq; palpebras & ficulneo folio, & asperato speallo, & interdum scilicet pello eradunt: uersasq; quotidie medicamentis suffrunt. Quæ neq; nisi in magna: uetustaq; aspritudine, neque sæpe facienda sunt. Nam melius eodē, ratione uictus & idoneis medicamentis peruenitur. Ergo exercitationibus utemur, & balneo frequentiore, multaq; oculorum palpebras aqua calida fovebimus. Cibos autem sumemus acres, & extenuantes.

#### Cæsarianum collirium.

**T** medicamentum id quod cæsarianum uocatur, habet atramenti sutorij. P. XI. mysi. P. X. piperis albi. P. XV. papaueris lacrymæ, gummi: singulorum. P. XII. cadmiæ lotæ. P. XIII. subis. P. XVI. Satisq; constat hoc collirium aduersus omne genus oculorum ualetudinis idoneum esse, exceptis his, quæ lenibus nutriuntur.

#### Hieracis collirium.

**D** quæq; quod Hieracis nominatur ad aspritudinem potest. habet myrrhæ. P. XI. ammoniaci: thymamatis. P. XII. æruginis rasæ. P. XIII. cum aqua pluuiatili. Ad idem idoneum est etiam id quod Canopite est: & id quod similion uocatur, & id quod pyxinum, et id quod Sphæriion. Si composita medicamenta non ad sunt, felle capripino, uel quam optimo melle satis comode aspritudo curatur.

#### De Xerophthalmia.

**S**t etiam genus aridæ lippitudinis: ξηροφθαλμία, græci appellant: neq; tument, neq; fluunt oculi, sed rubent tantum, et cum dolore quodam grauescunt, & noctu prægraui pituita inhaerescunt, quantoq; minor generis huius impetus: tanto finis manus expeditus est. In hoc uitio multum ambulare, multum exerceri, lauare sæpe, ibiq; desudare, multaq; frictione uti necessarium est. ubi qui neq; implent, neq; nimium acres, apti sunt: sed inter hos medijs mane ubi concoxisse manifestum est, non alienum est ex sinapi gargarizare: tum deinde caput, atq; os diutius defricare.

#### Aurelij Cor.

n



# LIBER

## Rhinion collirium.

Ollirium uero aptissimum est, quod Rhinion uocatur. habet myrrhæ. P. XI. papaueris lacrymæ: acaciæ succi, pipis, gummi: singulorum. P. XI. lapidis hæmatitis: lapidis phrygij, lycij, lapidis scissilis singulorum. P. XII. æris combustij. P. XIII. ac pyxinum quoq; eodem accommodatum est.

## Ad oculos scabros colliria.

I uero scabri oculi sunt, quod maxime in angulis esse consuevit, potest prodesse Rhinion id, quod supra positum est: potest similiter prodesse id, quod habet æruginis rasæ: piperis longi, papaueris lacrymæ singulorum. P. XII. piperis albi, gummi, singulorum. P. XIII. cadmiæ clotæ, cerussæ, singulorum. P. XVI. nullum tamen melius est quam Euelpidis quod βασιλινδὲρ nominabat. habet papaueris lacrymæ, cerussæ, lapidis asij, singulorum. P. XII. gummi. P. XIII. piperis albi. P. XIII. croci. P. XVI. psorici. P. XIII. Nulla autem per se materia est: quæ psoricum nominetur: sed chalcitidis aliquid, & cadmiæ dimidio plus ex aceto simul conteruntur, idq; in uas fictile additum, et contactu ficulneis folijs sub terra reponitur: sublaturq; post dies uiginti rursus teritur, & sic appellatur. Verum in basilico quoq; collirio conuenit ad omnes affectus oculorum id esse idoneum: qui non leuibus medicamentis curantur. Vbi non sunt autem medicamenta composita, scabros angulos leuant, et mel, et uinum. succurritq; & his, & aridæ lippitudini si quis panem ex uino subactum super oculum imponit. nam cum ferè sit humor aliquis, qui modo ipsum oculum, modo angulos aut palpebras exasperat, sic et si quid prodit humoris: extrahitur, & si quid iuxta est, repellitur.

## Ad caligationem oculorum, quæ propter lippitudinem oritur remedia & colliria.

Aligare uero oculi nonnunquam ex lippitudine, nonnunquam etiam sine hac propter senectutem, imbecillitatem uel aliâ consuerunt: si ex reliquijs lippitudinis id uitiu est, adiunat collirium, quod asclepias nominatur, adiunat id quod ex crocomagmate fit.

## Διὰ πρόνου collirium.

Proprie etiam ad id componitur: quod διὰ πρόνου uocant. habet piperis. P. XI. croci alidis, papaueris lacrymæ, cerussæ, singulorum. P. XII. psorici, gummi: singulorum. P. XIII.



Ad caligationem oculorum, quæ propter senectutem, aut  
aliam imbecillitatem fit.

**T** si ex senectute, aliaue imbecillitate id est, recte inungi po-  
test, & melle quam optimo, et cyprino, et oleo uetere. Côm-  
dissimum tamen est balsami partem unam: & olei ueteris,  
aut cyprini partes duas, mellis quam acerrimi partes tres miscere.  
Vtilia quoq; huic medicamenta sunt, quæ ad caliginem proxime, quæq;  
ad extenuandas cicatrices supra comprehensa sunt. Cuiusq; uero oca-  
li caligabunt: huic opus erit multa ambulatione atq; exercitatione,  
frequenti balneo, ubi tutum quidem corpus perficiendum est: præci-  
pue tamen caput, & quidem irino donec insudet: uelandumq; postea:  
nec detegendum antequam sudor, & calor domi conquierint. ium ei  
bis utendum acribus & extenuantibus, interpositisq; aliquibus die-  
bus ex sinapi gargarizandum.

De suffusione oculorum.

**S**uffusio quoq; quam greci ὀφθαλμιασμία nominant: interdum  
oculi potentia, qua cernit, se opponit. Quod si inucteraue-  
rit, manu curandum est. Inter initia nonnunquam etiam  
certis observationibus discutitur. sanguinem ex fronte uel naribus mit-  
tere, in temporibus uenas adurere: gargarizando pituitam euocare:  
suffumigare oculos acribus medicamentis, inungere expedit. uictus  
optimus est qui pituitam extenuat.

De resolutione oculorum, quæ paralysis dicitur.

**C**ne resolutio quidē oculorum: quam παραλυσις greci no-  
minant, alio uictus modo, uel alijs medicamentis curanda est.

Exposuisse tantum genus uirij satis est. igitur interdum eue-  
nit modo in altero oculo, modo in utroq; aut ex ictu aliquo, aut ex  
morbo comitali, aut ex distentione nervorum, qua uehementer oculus  
ipse concussus est, ut his neq; quoquam intendi possit, nec omnino con-  
sistat, sed huc illuc ne sine ratione moneatur, ideoq; ne conspectum  
quidem rerum præstet.

De mydriasi oculorum.

**N**on multū ab hoc malo distat id, quod μυδρίασις greci uo-  
cant. Pupilla effunditur, & dilatatur, aciesq; eius hebescit,  
ac penē difficillime genus id imbecillitatis eliditur. i utraq;  
uero id est, et paralyti, & mydriasi pugnandū est p eadē oia, quæ in  
caligine oculorū præcepta sunt, paucis tamen mutatis: siq; dem ad caput



## LIBER

irino interdum acetum, interdum nitrum adijciendum est: melle inu-  
gi satis est. quidam in posteriore uitio calidis aquis usi, reuatiq;  
quidam sine ulla manifesta causa subito obcaecati sunt. ex quibus non  
nulli cum aliquandiu nihil uidissent, repentina profusione alui, lumē  
receperunt: quo minus alienum uidetur, ex recenti re & interposito  
tempore medicamentis quoq; moliri deiectiones: quæ omnem noxiam  
materiam in inferiora depellant.

### De imbecillitate oculorum.

Ræter hæc imbecillitas oculorum est: ex qua quidam inter-  
diu satis, noctu nihil cernunt: quod in foeminam bene respo-  
dentibus mensuris non cadit: sed sic laborantes inungi oportet  
humore iocineris maxime hircini: si minus, caprini, ubi ad assum  
coquitur, excepto: atq; edi quoq; ipsum iecur debet. Licet tamen etiam  
hisdem medicamentis non inutiliter uti, quæ uel cicatrices, uel aspri-  
tudinem extenuant: quidam contrito semine portulacæ mel adijciunt  
eatenus ne id ex specillo defillet: eoq; inungunt. Exercitationibus, bal-  
neo, frictionibus, gargarizationibus iisdem his quoq; utendum est.

Ad oculos qui extrinsecus offenduntur: cum sanguine suffusi sunt.

T hæc quidem in ipsis corporibus oriuntur. Extrinsecus  
uero interdum si ictus oculum lædit, ut sanguis in eo suffun-  
datur: nihil commodius est: quam sanguine uel columbæ, uel  
palumbi, uel hirundinis inungere: neq; id sine causa fit: cum horum  
acies extrinsecus læsa interposito tempore in antiquum statum rede-  
at, æleberrimq; hirundinis. Vnde etiam locus fabulæ factus est, aut  
per parietes, aut id herba chelidonio restitui: quod per se sanescit: eo-  
rum ergo sanguis nostros quoq; oculos ab externo casu commodissima  
tuetur, hoc ordine, ut sit hirundinis optimus, deinde palumbi, minima  
efficit columbæ & illi ipsi & nobis supra percussum uero oculum  
ad inflammationem leniendam non est alienum imponere etiam  
cataplasmata: sed ammoniacus, uel quilibet alius quam optimus teri  
debet sic, ut ei paulatim oleum adijciatur, donec crassitudo strigmen-  
ti fiat. Id deinde miscendum est cum hordeacea farina: quæ ex mulsio-  
de cocta sit. Facile autem recognitis cibis, quæ medici quoq; prodide-  
runt: apparere cuilibet potest uix ullum ex his, quæ supra comprehē-  
sa sunt: oculi uitium esse, quod non simplicibus quoq; & promptis re-  
medijs submoueri possit.



**A**ctenus in oculis ea reperiuntur, in quibus medicamenta plurimum possint: ideoque ad aures transeundum est, quarum usum proximum à luminibus natura nobis dedit: sed in his aliquanto maius periculum est: nam uitia oculorum intra ipsos nocet. Aurium inflammationes doloresque, interdum etiam ad dementia, mortemque precipitant: quo magis inter initia protinus succurrendum est: ne maiori periculo locus sit. Ergo ubi primum dolorem aliquis sensit: abstinere, & continere se debet. Postero die, si uehementius malum est, caput tondere, idque irino unguento calido perungere, & operire: at magnus cum febre, uigiliaque dolor exigit, ut sanguis quoque mittatur. si id aliqua causa prohibent, alius soluenda est. Cataplasmata quoque calida subinde mutata proficiunt, siue foeni graeci, siue lini, siue alia farina ex mulsio decocta est. recte etiam subinde admoventur spogiae ex aqua calida expressae. tum leuato dolore ceratum circundari debet ex irino, aut cyprino factum. In quibusdam tamen melius, quod ex rosa factum est, proficit. si uehemens inflammatio somnum ex toto prohibet, adijci cataplasmata debent papaueris corticis fricti atque contriti sic, ut ex his pars dimidia sit, eaque tum simul ex passo mixto decoquatur. In aure uero infundere aliquod medicamentum oportet, quod semper ante tepesceri conuenit: commodissimeque per strigilem instillatur. ubi auris repleta est: super lana mollis addenda est, quae humorem intus contineat. & haec quidem communia sunt. Medicamentum uero est & rosa, & radicum harundinum succus, & oleum in quo lumbrici cocti sunt, et humor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali persici expressus. composita uero ad inflammationem, doloremque leniendum haec ferè sunt: castorei, papaueris lacrymae pares portiones conteruntur: deinde adijcitur his passum. uel papaueris lacrymae, croci, myrrhae par modus sic teritur, ut inuicem modo rosa, modo passum instilletur, uel id, quod amarum in aegyptia faba est conteritur, & rosa adiecta: quibus myrrhae quoque paulum à quibusdam miscetur, uel papaueris lacrymae, aut thus cum muliebri lacte, uel amararum nucum cum rosa succo, uel castorei, myrrhae, papaueris lacrymae pares portiones cum passo: uel croci. P. XI. myrrhae, aluminis scissilis, singulorum P. XII. quibus tum teruntur, paulatim miscentur passi cyathi tres, melis minus cyatho: idque ex primis medicamentis est: uel papaueris lacryma ex aceto. Licet etiam compositione uti Themisonis: quae habet castorei opopanax: papaueris lacrymae ex aceto, singulorum. P. XII. spumae lycij. P. XIII. quae contrita passo excipiuntur donec cerati

Aurelij Cor.

n iij



## LIBER

crassitudinem habeant: atq; ita reponuntur. ubi usus requiritur, rur-  
sus idem medicamentum adiecto passo, specillo teritur. Illud perpetuum  
est, quotienscunq; crassius medicamentum est, quàm ut in aurem instil-  
lari possit, adiiciendum cum esse humorem, ex quo id componi debet:  
donec satis liquidum sit. si uero pus quoq; aures habent, recte lycium  
per se infunditur, aut irinum unguentum, aut porri sucus cum melle,  
aut centaureæ sucus cum passo, aut dulcis punici mali sucus in ipsius  
cortice tepefactus, adiecta myrrhæ exigua parte. Recte etiam miscen-  
tur myrrhæ, quam stacten cognominant. P. XI. croci tantundem, nucis  
amaræ. XXV. mellis sesquicyathus, quæ contrita, cum utendum est, in  
cortice punici mali tepefiant. ea quoq; medicamenta. quæ oris exulce-  
rati causa componuntur, æq; ulcera aurium sanant: quæ si uetustiora  
sunt, et multa sanies fluit: apta compositio est, quæ ad auctorem Era-  
sistratum refertur: piperis. P. XI. croci. P. XI. myrrhæ, mysi cocti, sin-  
gulorum. P. XII. æris combusti. P. XII. hæc ex uino teruntur: deinde  
ubi inauerunt, adiunguntur passi heminæ tres, et simul coquuntur:  
cum utendum est, adiicitur his mel, et uinum. Est etiam Itolemæi chi-  
rurgi medicamentum, quod habet lentisci. P. XI. gallæ. P. XI. ompha-  
cij. P. XI. sucum punici mali. Est menophili ualidum admodum, quod  
ex his constat: piperis longi. P. XI. castorei. P. XII. myrrhæ, croci, pa-  
paueris lacrymæ, nardi syriaci, thuris, malicorij, ex ægyptia faba  
partis interioris, nucis amararum, mellis quàm optimi, singulorum.  
P. XIII. quibus cum teruntur, adiicitur acetum quàm acerrimum,  
donec crassitudo in his passi fiat. Est Cratonis, cinnamomi, cassiæ, sin-  
gulorum. P. XI. lycij, nardi, myrrhæ, singulorum. P. XI. aloes. P. XII.  
mellis cyathi tres, uini sextarius, ex quibus uinum cum lycio deco-  
quitur: deinde his alia miscentur: at si multum puris, malusq; odor  
est, æruginis rase, thuris, singulorum. P. XII. mellis cyathi duo, aceti  
quattuor simul incoquuntur: ubi utendum est, dulce uinum misceatur,  
aut aluminis scissilis, papaueris lacrymæ, acaciæ sicut par pondus mi-  
scetur: hisq; adiicitur hyoscyami succi dimidio minor quàm unius ex  
superioribus portio: eaq; trita ex uino diluuntur. per se quoq; hyo-  
scyami sucus satis proficit. Commune uero auxilium aduersus omnes  
aurium casus: iamq; usu comprobatum Asclepiades composuit. In eo  
sunt cinnamomi, cassiæ, singulorum. P. XI. flores iunci rotundi, castorei,  
albi piperis longi, amomi, myrobalani, singulorum scrupuli duo, thu-  
ris masculi, nardi syriaci, myrrhæ pinguis, croci, spumæ nitri, singulo-  
rum. P. XII. quæ separatim contrita, rursus mixta ex aceto conterun-  
tur: atq; ita condita, ubi utendum est, aceto diluuntur. eodem modo cõ-  
mune auxilium auribus laborantibus est. Polybi sphragis ex dulci ui-



no liquata: quæ compositio priore libello continetur. quod si et sanies profluit, et tumor est, non alienum est, mixto uino per oricularium clysterem eluere: et tum infundere uinum austerum cum rosa mixtum: cui spodij paulum sit adiectum, aut lycium cum lacte, aut herbae sanguinalis sucum cum rosa, aut mali punia sucum cum exigua parte myrrhæ: si sordida quoque ulcera sunt, melius mulso eluuntur: et tum aliquod ex his quæ supra scripta sunt, quod mel habeat, infunditur: si magis pus profluit, et caput utique tondendum est, et multa calida aqua perfundendum, et gargarizandum, et usque ad lassitudinem ambulandum, et cibo modico utendum est. si cruor quoque ex ulceribus apparuit, lycium cum lacte debet infundi, uel aqua, in qua rosa decocta sit, succo aut herbae sanguinalis, aut acacie adiecto quod si super ulcera caro increuit, eaque mali odoris sanguine fundit, aqua tepida elui debet: tum infundi id, quod ex thure, et ærugine, et aceto, et melle fit: aut mel cum ærugine incoctum: squama quoque aeris cum sandaraca contrita per fistulam recte insillatur.

#### Aduersus aurium uermes.

Bi uero uermes orti sunt, si iuxta sunt, protrahendi oriculario specillo sunt: si longius, medicamentis enecandi: cauendumque, ne postea nascentur. ad utrumque proficit album ueratum cum aceto contritum: flui quoque aurem oportet uino, in quo marrubium decoctum sit. sic emortui uermes in primam auris partem pronocabuntur: unde facillime educi possunt.

#### Ad compressa aurium foramina.

In foramen auris compressum est, et intus crassa sanies subest, mel quam optimum addendum est: si id parum proficit, mellis cyatho et dimidio, æruginis rase. P. XII. adiacendum est: incoquendumque, et eo utendum. Iris quoque cum melle idem proficit. Item mellis, et rosæ scrupuli duo. Item galbani. P. XII. myrrhæ cum melle, et fellis taurini, singulorum. P. XII. uini quantum satis est ad myrrham diluendam.

#### Ad grauem auditum.

Bi uero grauius aliquis audire cepit, quod maxime post longos capitis dolores euenire consuevit: in primis aurem ipsam considerare oportet. Apparebit enim aut crusta qualis super ulcera innascitur, aut sordium coitus: si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cum melle ærugo, uel porri sucus, aut cum mulso nitri paulum: atque ubi crusta à corpore iam recedit,

n iij



# LIBER

elucenda auris aqua tepida est: quo facilius ea per se diducta, oriculi-  
lario specillo protrahatur. si sordes æque molles sunt, eodem specillo  
eximendæ sunt. at si duræ sunt: acetum, & cum eo nitri paululum  
coniiciendum est. Cumq; emollitæ sunt, eodem modo elui aurem, purga-  
riq; oportet. quod si capitis grauitas manet: attendendum idem, &  
leniter, sed diu perfricandum est, adiecto uel irino, uel laureo oleo sic,  
ut utrilibet paulum aceti misceatur: tum diu ambulandum, leniterq;  
post unctionem aqua calida caput fouendū: Cibisq; utendum ex im-  
becillissima & media materia, magisq; assumendæ dilutæ potiones:  
nonnunq; gargarizandum est. Infundendum autem in aurem casto-  
reum cum aceto, & laureo oleo, & succo radicula corticis: aut cucume-  
ris agrestis suauis adiectis contritis rosæ folijs: immaturæ quoq; uinæ  
suauis cum rosa instillatus aduersus sordiditatem satis proficit.

Ad sonitum aurium intra se ipsas.

Liud uitij genus est: ubi aures intra se ipsas sonant: atq; hoc  
quoq; fit, ne externum sonum accipiant: leuissimum est, ubi  
id ex grauedine est. peius: ubi ex morbis, capitis uel longis do-  
loribus incidit. Pessimum: ubi magnis morbis uenientibus, maximeq;  
comitiali: prouenit. Si ex grauedine est: purgare aurem oportet, et spi-  
ritum continere, donec inde humor aliquis expimet: si ex morbo uel  
capitis dolore, quod ad exercitationem, frictionem, perfusionem, gargariz-  
ationemq; pertinet, eadem faciendæ sunt: cibis nō utendum nisi ex-  
tenuantibus: in aurem dandus radice succus cum rosa, uel cum suc-  
co radice ex cucumere agresti, uel castoreum ex aceto et laureo oleo.  
ueratrum quoq; cum aceto conteritur: deinde melle cocto exapitur, &  
inde collirium factum in aurem demittitur: si sine his cepit, ideoq;  
nouo metu terret, in aurem dari debet castoreum cum aceto uel iri-  
no, uel laureo oleo, aut huic mixtum castoreū cum succo nactu am-  
rarum, aut myrrha & nitrum, cum rosa et aceto. Plus tamen in hoc  
quoq; proficiat uictus ratio: eademq; faciendæ sunt: quæ supra compre-  
hendi: cum maiore quoq; diligentia, & præterea, donec his sonus fi-  
niatur, à uino abstinendum. quod si simul & sonus & inflammatio,  
laureum oleum coniecisse abunde est, aut id quod ex amaris nucibus  
exprimitur: quibus quidam uel castoreum, uel myrrham miscent.

Ad ea, quæ in aurem inciderunt extrahenda.

¶ Olet etiam interdum in aurem aliquid incidere, ut calculus,  
aliquod uel animal. Si pulex intus est: compellendum eò lanæ  
paulum est, quo ipse is subit, & simul extrahitur: si non est secutus,  
aliud uel



aliud'ue animal est, specillum lana inuolutum in resina quam glutinosissimam, maximeq; terebinthinam demittendum, idq; in aurem coniiciendum ibiq; uertendum est. Vtiq; enim comprehendet & eximet: sin aliquid ex aune est: specillo oriculario protrahendum est, aut hamulo retuso, paulum recuruato: si ista nihil proficiunt, potest eodem modo resina protrahi: sternutamenta quoq; admotu id commode elidunt, aut oriculario clystere aqua uehementer intus compulsa: tabula quoq; collocatur media inherens capitibus utrinq; pendentibus, superq; eam homo deligatur in id latus uersus, cuius auris eo modo laborat sic, ut extra tabulam emineat. Tum malleo caput tabulae, qd a pedibus est, feritur: atq; ita concussa aure, id quod inest: excidit.

De narium morbis, & curationibus. Cap. VIII.

Ares uero intus exulceratas fouere oportet uapore aquae calidae, idest spongia expressa atq; admotu: fit & subiecto uase oris angust, calida aqua repleto. Post id sumentum illinenda ulcera sunt, aut plumbi recemeto, aut cerussa, aut argenti spiritum cum quolibet horum aliquis conterit: eiq; dum teritur inuicem uinum & oleum myrteum adijcat, donec mellis crassitudinem fecerit. si autem ea ulcera circa nares sunt, pluresq; crustas, & odorem foedum habent, quod genus graeci ὀσάριον appellant: sciri quidem debet, uix ei malo posse succurri. Nihilominus tamen haec tentari possunt, ut caput ad cutem fondeatur, assidueq; uehementer perfricetur: multa calida aqua perfundatur: multa ei deambulatio sit: abus modicus: neq; acer, neq; ualentissimus: tum in nares ipsam mel cum ex quo modo resinae terebinthinae coniiciatur: quod specillo quoq; inuoluto lana fit, attrahaturq; spiritu is suauis, donec in ore gustus eius sentiat: sub his enim crustae resoluuntur, quae tum per sternutamenta elidi debent: puris ulceribus uapor aquae calidae subiiciendus est: deinde adhibendum, aut lycium ex uino dilutum, aut amurca, aut omphacium, aut menta, aut marrubij suauis, aut atramentum sutorium, quod candens factum, deinde contritum sit, aut interior scyllae pars contrita sic, ut horum cuilibet mel adijciatur: cuius caeteris admodum exigua pars esse debet: in atramento sutorio tanta, ut ea mixtura liquida fiat, cum scylla utiq; pars maior: inuoluendumq; lana specillum est, & in eo medicamento intinguendum, eoq; ulcera implenda sunt: rursumq; linamentum inuolutum, & oblongum eodem medicamento illinendum, demittendumq; in nares est, & ab inferiore parte leniter deligandum: idq; per hyemem & uer bis die, per aestatem & autumnum



## LIBER

num, ter die fieri debet, interdum uero etiam in naribus carunculae quaedam similes muliebribus mammis nascuntur, hæcque in partibus, quæ carnosissimæ sunt inhaerent. Has curare oportet medicamentis adurentibus: sub quibus ex toto consumuntur. Polypus uero est caruncula modo alba, modo subrubra, quæ narium ostii inhaeret, et modo ad labra pendens nares implet, modo retro per id foramen, quo spiritus à naribus ad fauces descendit, adeo increscit, uti post unā conspicia possit, strangulatque hominem maxime austro aut euro flante: fereque mollis est, raro dura, eaque magis spiritum impedit, et nares dilatat: quæ ferè naphthædes est: itaque attingi non debet. illud aliud genus, ferè quidem ferro curatur, interdum tamen increscit: si addita in nares per linamentum, aut penicillum ea compositio est, quæ habet minij sinopici, chalcitis, calcis, sandaracæ, singulorum. P. X. I. atramenti sutorij. P. XII.

## De dentium dolore, et curationibus. Cap. IX.

IN dentium autem dolore, qui ipse quoque maximis tormentis annumerari potest, unum ex toto circumcidendum est. cibo quoque primo abstinendum, deinde eo modico, mollique utendum, ne mandentis dentes irriter: tum extrinsecus admouendus per spongiam uapor aquæ calidæ, imponendumque ceratum ex cyprino, aut irino factum, lanaque id comprehendendum, caputque uelandum est. quod si grauior is dolor est: utiliter et alius ducitur, et calida cataplasmata super maxillas iniiciuntur, et ore humor calidus cum medicamentis aliquibus continetur, sæpiusque mutatur: cuius rei causa et quinq; folij radix in uino mixto coquitur, et hyoscyami radix, uel in posca, uel in uino mixto coquitur sic, ut paulum his salis adiciatur, et papaueris non nimium aridi cortices, et mandragoræ radix eodem modo. sed in his tribus utique uitandum est, ne quod austum erit, deuoretur: ex populo quoque alba cortex radice in hunc usum in uino mixto recte coquitur, et in aceto cornu ceruinum rasum, et nepeta cum teda pingui: ac ficus item pinguis, uel in mulso, uel in aceto, et melle: ex quibus cum ficus decocta est, is humor percolatur. specillum quoque lana inuolutum in calidum oleum demittitur, eoque ipso dens fouetur. quinetiam quaedam quasi cataplasmata in dentem ipsum illinuntur: in quem usum ex malo punico acido, atque arido malicorij pars interior cum pari portione, et gallæ et pinei corticis conteritur, misceaturque his minimum, eaque contrita aqua pluuiali coguntur, aut panacis, papaueris lacrymæ, peucedani, unæ taminie sine seminibus



pares portiones conteruntur, aut galbani partes tres, papaueris lacrymæ pars quarta. Quicquid dentibus admotum est, nihilo minus supra maxillam ceratum, quale supra posui: esse debet: lana obtectum: quidam etiam myrrhæ, cardamomi, singulorum. P. XI. croci, pyretri: fisorum partes: singulorum. P. XIIII. Sinapis. P. XVIII. contrita linteolo illinunt, imponuntq; in humero partis eius, qua dens dolet: si is superior est, à scapulis: si inferior, à pectore: idq; dolorem leuat: & cum leuauit, protinus submouendum est: si uero exesus est dens, festinare ad eximendum eum, nisi res coegit, non est necesse: sed cum omnibus fomentis, quæ supra posita sunt, adiiciendæ quædam ualentiores compositiones sunt, quæ dolorem leuant: quales hæc sunt. habet autem papaueris lacrymæ. P. XI. piperis. P. XII. pforeos. P. XX. quæ contrita galbano excipiuntur, idq; arundatur: aut Menemachi maxime ad maxillares dentes in qua sunt croci. P. XI. cardamomi, thuris, fuliginis: fisorum partes, pyretri, singulorum. P. XIIII. sinapis. P. XVIII. Quidam autem immiscet pyretri, piperis, elaterij, singulorum. P. XI. aluminis scissilis: papaueris lacrymæ, unæ taminie, sulphuris ignem non experti, bituminis, lauri baccarum, sinapis, singulorum. P. XII. Quod si dolor eximi eum cogit, & piperis semen cortice liberatum, & eodem modo baccæ hederæ coniecta in id foramen, dentem findit, isq; forte stans excidet: & plani piscis quædam pastinacæ nostri, *πρωμα* græci uocant, aculeus torretur: deinde conteritur, resinaq; excipitur, quæ denti arundata hunc soluit: & alumen scissile in id foramen coniectum dentem citat: sed id tamen inuoluum in lanula demitti commodius est, quia sic dente seruat dolorem leuat. Hæc à medicis accepta sunt: sed agre stum experimento cognitum est, cum dens dolet, herbam mentastrum cum suis radicibus uelli debere, & in peluem conijci, supraq; aquam infundi, collocariq; iuxta sedentem hominem undiq; ueste contextum: tum in peluem candentes silices demitti sic, ut aqua tegantur, hominemq; eum hiantem ore uaporem excipere, ut supra dictum est undique inclusum. nam & sudor plurimus sequitur, & per os continens pituita defluit, idq; sæpe longiorem, sæpe annuam ualeitudinem bonam præstat.

## De tonsillis, &amp; earum cura. Cap. X.

Si uero tonsillæ sine exulceratione per inflammationem intumuerunt, caput uelandum est extrinsecus: is locus uapore calido fouendus, multa ambulatione utendum, caput in lecto sublime



habendum, gargarizandumq; est ex reprimentibus. radix quoq; ea: quam dulcem appellant contusa & in passo, mulso'ue deacta idem praestat. leniterq; quibusdam medicamentis eas illini non alienū est: quae hoc modo fiunt. ex malo punico dulci succus exprimitur, & eius sextarius in leni igne coquitur, donec ei mellis crassitudo sit: tum croci, myrrhae, aluminis scissilis, singulorum. P. XII. per se conteruntur, paulatimq; his adiunguntur vini lenis cyathi duo, mellis unus: deinde priori succo ista miscentur, & rursus leniter incoquantur: aut eiusdem succi sextarius eodem modo coquitur, atq; eadem ratione trita ei adiunguntur haec nardi. P. XV. omphacij. P. XI. cinnamomi, myrrhae, cassiae, singulorum. P. XI. eadem autem haec & auribus & naribus purulentis accommodata sunt. Cibus quoq; in hac valetudine lenis esse debet ne exasperet, quod si tanta inflammatio est, ut spiritum impediat, in lecto conquiescendum, a cibo abstinendum, neq; assumendum quicquam praeter aquam calidam est: alius quoq; ducenda est: gargarizandum ex fico & mulso: illinendum mel cum omphacio: intrinsecus admonendus, sed aliquanto diutius vapor aquae calidae, donec ea suppurent, et per se aperiantur: si pure substante non rumpuntur hi tumores, incidendi sunt: deinde ex mulso calido gargarizandum ex fico: at si modicus quidem tumor & exulceratio est, furfurum cremori ad gargarizandum paulum mellis adijciendum est: illinendaq; ulcera hoc medicamento. passi quamdulcissimi tres heminae ad una coquantur: tum adijcitur thuris. P. XI. croci, myrrhae: singulorum. P. XI. leniterq; oia rursus feruescunt. ubi pura ulcera sunt, eodem furfurum cremore, uel lacte gargarizandum est. atq; hic quoq; abis lenibus opus est: quibus adijci dulce uinum potest.

De oris ulceribus, & curationibus, & quae antherae sunt. Cap. XI.

Ulcera autem oris, si cum inflammatione sunt, & parum pura ac rubicunda sunt: optime his medicamentis curantur, quae supra posita ex malis punicis fiunt: continendusq; saepe ore reprimens cremor, cui paulum mellis sit adiectum: utendum ambulationibus, et non acri cibo. simulatq; uero pura ulcera esse coeperunt, lenis humor, interdum etiam quam optima aqua ore continenda est. prodestq; assumptum pyrum mitium, pleniorq; cibus, dum acerbis uacet. inspergq; ulcera debent alumine scissili, cui dimidio plus gallae immaturae sit adiectum. si iam crustas habent, quales in adustis esse consuerunt, adhibendae sunt haec compositiones, quas graeci ἀνθηρὰς nominant. Iunci quadrati, myrrhae, sanda-



sandaracæ, singulorum. P. XIII. aluminis pares portiones: aut croci, myrrhæ, singulorum. P. XII. iridis, aluminis, scissilis, sandaracæ: singulorum. P. XIII. iunci quadrati. P. XVIII. aut gallæ, myrrhæ: singulorum. P. XII. aluminis, scissilis. P. XII. rosæ foliorum. P. XIII. quidam autem croci. P. X. aluminis, scissilis, myrrhæ: singulorum. P. XI. sandaracæ. P. XII. iunci quadrati. P. XIII. miscent. Priora arida insperguntur: hoc cum melle illinitur neq; ulceribus tantum, sed etiã tonsillis. Verũ ea longe periculosissima ulcera sunt, quas æp̃thor græci appellant, sed in pueris. hos enim sæpe consumunt: in uiris et mulieribus idem periculum non est. Hæc ulcera à gingiuis incipiunt, deinde palatum, totumq; os occupant: tum ad unã, faucesq; descendunt quibus obsessis non facile fit, ut puer conualescat. ac miserius etiam est: si lactans adhuc infans est: quo minus imperari remedium aliquod potest: sed in primis nutrix cogenda est exerceri ambulationibus, hisq; operibus, quæ superiores partes mouet: mittenda in balneum, iubendaq; ibi calida aqua mammas perfundere: tum alenda cibus lenibus, et his qui facile non corrumpuntur. Potiones, si febricitat puer, aquæ: si sine febre est: uini diluti. Ac si alius nutrici substitit: ducenda est. Si pituita eius in os coit, uomere debet. Tum ipsa ulcera puniendã sunt melle, cui rhus: quem syriacum uocant, aut amaræ nutes adiectæ sunt, uel mixtis inter se rosæ folijs aridis, pineis nucleis, mentæ colliculo, melle: uel eo medicamento, quod ex moris fit: quorum suauis eodem modo quo punia mali ad mellis crassitudinem coquitur: eademq; ratione ei crocum, myrrhã, alumen, uinum, mel miscetur: Neq; quicquam dandum, ad quod humor euocari possit. Si uero iam firmior puer est: gargarizare debet his ferè, quæ supra comprehensa sunt. at si lenia medicamenta in eo parum proficiunt: adhibenda sunt ea, quæ adurẽdo crustas ulceribus induant: quale est scissile, alumen, uel chalatis, uel atramentum sutorium: prodest etiam fames et abstinentia quanta maxime imperari potest. Cibus debet esse lenis. Ad purganda tamen ulcera interdum caseus ex melle recte datur.

## De ginguarum ulceribus. Cap. XII.

Inguæ quoq; ulcera non alijs medicamentis egent, quàm quæ prima parte superioris capitis exposita sunt: sed quæ in latere eius nascuntur: diutissime durant. Videndumq; est num contra dens aliquis acutior sit, qui sanescere sæpe ulcus eo loco non sinit: ideoq; limandus est. solent etiam interdum iuxta dentes in gingiuis tubercula quædam oriri dolentia, τρυπόδοντιδας græci



LIBER

appellant. hæc initio leniter sale contrito perfricare oportet, aut inter se mixtis sale fossili, combusto cupresso, nepeta, deinde eluere os cremore lenticulæ, & inter hæc hiare: donec pituita satis profluat. In maiore uero inflammatione iisdem medicamentis utendum est: quæ ad ulcera oris supra posita sunt, & mollis linamenti paulum inuoluendum aliqua compositione ex his, quas ἀρόνποις uocari dixi, demittendumq; id inter dentem, & gingiuam: quod si durior erit, & id prohibebit, extrinsecus admouendus erit spongiæ uapor calidus, imponendumq; ceratū. Si suppuratio se ostendit: diutius eo uapore utendum erit, & continendum ore calidum mulsū, in quo ficus deacta sit: Itemq; subcrudum incidendum, ne si diutius ibi pus permanferit: os lædat. quod si maior is tumor est, commodius totus exaditur, sic, ut ex utraq; parte dens liberetur. Pure exempto, si leuis plaga est, satis est ore calidam aquam continere, & extrinsecus fouere eodem uapore: si maior est, lenticulæ cremore: ut hisdem medicamentis, quibus cætera ulcera oris curantur: alia quoq; ulcera in gingiuis plerumq; oriuntur: quibus eadem quæ in reliquo ore succurrunt maxime tamen mandere ligustrum oportet, succūq; cum ore continere. Fit etiam interdum, ut ex gingiæ ulcere, siue τρυσός τις fuit, siue non fuit, diutius pus feratur: quod aut dēte corrupto, aut fracto, uel aliter uiciato osse, maximeq; id per fistulam uenire cōsuevit. ubi inadit, locus aperiendus, dens eximendus, testa ossis, si qua ex assit recidenda est: si quid uiciosi est, radendum. post quæ quid fieri debeat, supra in aliorum ulcerum curatione comprehensum est: si uero a dētibz gingiæ recedunt, eadem ἀρόνποι succurrunt. Vtile est etiam pira, aut mala non permatura mandere, & ore cum humorem continere. Idemq; præstare non acce acetum in ore retentum potest.

De uulæ morbo & curatione. Cap. XIII.

Ve uehemens inflammatio terrere quoq; debet: itaq; in hac & abstinentia necessaria est, & sanguis recte mittitur: & si id aliqua res prohibet, aliud utiliter ducitur, apuiq; si per hæc uelandum, & sublimius habendum est: tum aqua gargarizandum, in qua simul rutus, & lenticula deacta sit. Illinenda autem ipsa uina uel omphacio, uel galla, uel alumine scissili sic, ut cuilibet eorum mel adijciatur. Est etiā medicamentum huic aptum, quod Andronium appellatur. constat ex iis: alumine scissili: squama aris rubri: atramento suturio, galla, myrrha, mysi: quæ p se contrita, mixtaq; rursus paulatim adiecto uino austero teruntur, de nec is nullis crassi



tudo sit. ubi horum aliquo illita una est: chelidonie quoque succo per cochlear illita una maxime prodest. Ferè multa pituita decurrit, cumque ea quieuit, ex uino calido gargarizandum: quod si minor in ea inflammatio: laser terere: eique adungere frigidam aquam satis est, eamque aquam cochleario exceptam ipsi unæ subijcere, ac mediocriter eam tumentem aqua quoque frigida eodem modo subiecta reprimat. Ex eadem autem aqua gargarizandum quoque est, quæ uel cum lasere, uel sine eo hac curatione unæ subiecta est.

## De cancro oris. Cap. XV.

Iquando autem ulcera oris cancer inuasit, primum considerandum est, num malus corporis habitus sit, eique occurrendum. deinde ipsa ulcera curanda. quod si in summa parte id uicium est: satis proficit æthere humido ulcери arida inpersa, sicciore, cum exigua parte mellis illita: si paulo altius: chartæ combustæ partes duæ, auri pigmenti pars una: si penitus malum descendit: chartæ combustæ partes tres, auripigmenti, pars quarta, aut pares portiones salis fricti & iridis frictæ: aut item pares portiones chalcitidis, calas, auripigmenti. Necessarium autem est linamentum in rosa tingere: & super adurentia medicamenta imponere, ne uicinum, et sanum locum lædant, quidam etiam in acris aceti heminam frictum salem coniungunt, donec tabescere desinat: deinde id acetum coquunt, donec exsiccetur: cumque salem contritum inpergunt. quotiens autem medicamentum inijciatur, & ante, & post: os diluendum est uel cremore lenticalæ, uel aqua: in qua aut erui, aut oleæ, aut uerbena decoctæ sint sic, ut cuilibet eorum paulum mellis miscetur. acetum quoque ex scylla retentum ore, satis aduersus hæc ulcera proficit: ex aceto cocto sali, sicut supra demonstratum est, rursus mixtum acetum: sed & diu continere utrunlibet, & id bis, aut ter die facere, prout uehemens malum est, necessarium est. quod si puer est, cui id inadit: specillum lana inuolutum in medicamentum demittendum est, & super ulcus tenendum, ne per imprudentiam adurentia deuoret. Et si dolor in gingiuis est, moenturque aliqui dentes: restitui eos oportet: nam curationes uehementer impediunt. si nihil medicamenta proficiunt: ulcera erunt adurenda: quod tamen in labris ideo non est necessarium: quoniam excidere commodius est. et id quidem æque adustum, atque excisum sine ea curatione, quæ corpori manu adhibetur: impleri non potest. Ginguarum uero ossa, quæ hebetia sunt: in perpetuum ustione nudantur. neque enim postea caro increscit. Imponenda tamen adustis lentacula est, donec sanitatem, qualis esse potest, recipiant.



# LIBER

## De parotibus, quæ sub auribus oriuntur. Cap. XVI.

**A**ec in capite ferè medicamentis egent. Sub ipsis uero auri-  
bus oriri παρωτίδες solent, modo in secunda ualitudine ibi  
inflammatione orta, modo post longas febres, illuc im-  
morbi conuerso. Id alius genus est: itaq; nullam nouam curatio-  
nem desiderat: animaduersionem tantummodo hanc habet neccsa-  
riam: quia si sine morbo id intumuit, primum reprimendum experi-  
mentum est: si ex aduersa ualitudine illud inuicatum est, maturariq;  
et q̄ primum aperiri commodius est.

## De umbilici prominentis curatione. Cap. XVII.

**D** umbilicos uero prominentes, ne manu, ferroq; utendum  
sit: ante tentandum est, ut abstineat: alius his ducatur, im-  
ponatur super umbilicum id, quod ex his constat. Cicuta, et  
fuliginis: singulorum. P. XI. cerussæ elotæ. P. XIII. plumbi eloti. P. X  
VIII. ouis duobus: quibus etiam solani succus adiicitur. Hoc dilutius  
impositum esse oportet, et interim conquiscescere hominem: abo modi  
eo uti sic, ut uidentur omnia instantia.

## De obscenarum partium uicijs, et curationibus. Cap. XVIII.

**P**roxima sunt ea, quæ ad partes obscenas pertinent, quarum  
apud græcos uocabula et tolerabilius se habent, et accepta-  
iam usu sunt cum omni ferè medicorum uolumine atq; ser-  
mone iacentur, apud nos fœdiora uerba ne consuetudine quidem ali-  
qua uerecundius loquentium accommodata sunt: ut difficilis hæc ex-  
planatio sit simul et pudorem et artis præcepta seruantibus. neq;  
tamen ea res à scribendo detertere me debuit. Primum ut omnia, quæ  
salutaria accepi, comprehenderem: dein quia in uulgis eorum cura-  
tio etiã præcipue cognoscenda est, quæ inuitissimus quisq; alteri osten-  
dit.

## De colis morbis, et curationibus.

**C**itur si ex inflammatione coles intumuit: reduciq; summa  
cutis, aut rursus induci non potest, multa calida aqua fouen-  
dus locus est. Vbi uero glans contacta est, oriculario quicq;  
clystere inter eam cutemq; aqua calida inferenda est. Si mollita sic  
et extenuata cutis ducanti paruit, expeditior reliqua curatio est: si  
tumor



tumor uicit: imponenda est uel lenticula, uel marrubium, uel oleæ fo-  
lia ex uino cocta sic, ut cuilibet eorum, dum teritur, mellis paulum  
adijciatur: sursumq; coles ad uentrem deligandus est. quod in omni  
curatione eius necessarium est, usq; homo continere se debet, & absti-  
nere à cibo, & potione aquæ tantum. siti uindicari. à postero die rur-  
sus adhibendum hisdem rationibus aquæ fomentum est, & cum ui-  
quoq; experiundum, an cutis sequatur: eaq; si non parebit, leuiter  
summa scilicet pello conadeda erit: nã cū sanies profluxerit: extenuabi-  
tur his locus, & facilius cutis ducetur. Siue autē hoc modo uicta erit,  
siue nunquam repugnauerit, ulcera uel in cutis ulteriore parte, uel  
in glande, ultra uel eam in cole reperientur, quæ necesse est, aut pura  
siccæ uel sint, aut humida & purulenta. si siccæ sunt, primum aqua  
calida fouenda sunt: deinde imponendum lycium ex uino est, aut a-  
murca cocta cum eodem, aut cum rosa butyrum: si leuis is humor est,  
uino eluenda sunt: tum butyri & rosæ mollis paulum, & resinæ te-  
rebinthinæ pars quarta adijcienda est, eoq; utendum: aut si pus ex  
his profluit, ante omnia elui mulsio calido debet. tum imponi pipe-  
ris. P. XI. myrrhæ. P. XII. croci, mysi cocti, singulorum. P. XII. quæ ex  
uino austero coquuntur, donec mellis crassitudinem habeant. Eadem  
autem compositio tonsillis, unæ madentiori, nariumq; ulceribus accom-  
modata est. Aliud ad eam, piperis. P. XI. myrrhæ. P. XI. croci. P. XII.  
mysi cocti. P. XI. æris combusti. P. XII. quæ primum ex uino austero  
conteruntur, deinde ubi inaruerunt: iterum teruntur ex passi tribus  
cyathis, & incoquuntur: donec uiscæ crassitudinem habeant. Aerugo  
quoq; cum cocto melle, & ea quæ ad oris ulcera supra comprehensa  
sunt, curant: aut Erasistrati compositio, aut Cratonis recte super puru-  
lenta naturalia imponitur. folia quoq; oleæ ex nouem cyathis uini  
coquuntur. his adijciatur aluminis scissilis. P. XIII. lycij. P. XVIII. mel-  
lis sesquicyathus: ac si plus purus est, id medicamentum ex melle: si  
minus, ex uino diluitur. Illud perpetuum est. post curationem, dum in-  
flammatiō manet, quale supra positum est, cataplasma supra dare:  
& quotidie ulcera eadem ratione curare: quod si pus & multum et  
cum malo odore cœpit profluere, elui cremore lenticulæ debet sic, ut  
ei mellis paulum adijciatur, aut oleæ, aut lentisci folia, uel marrubiū  
decoquendum est. eoq; humore eodem modo cum melle utendum, im-  
ponendaq; eadem, aut etiam omphacum cum melle, aut id quod ex  
ærugine & melle ad aures fit, aut compositio Andronis, aut ἀνδρονί-  
ς, ut ei paulum mellis adijciatur. quidam ulcera omnia, de quibus  
adhuc dictum est, lycio ex uino curant. Si uero ulcus latius atq; altius  
serpit, eodem modo elui debet: imponi uero, aut ærugo, aut omphaciū

Aurelij Cor.

o



cum melle, aut Andronis compositio, aut marrubij, myrrhæ, aut croci, aluminis scissilis cocti, rosæ foliorum aridorum, gallæ, singulorum. P. XI. mñij sinopia. P. XII. quæ per se singula primum teruntur, deinde iuncta iterum melle adiecto, donec liquidi ærati crassitudine habeant: tum in æneo vase leniter coquantur, ne superfluant: cum iā guttæ indurescūt, vas ab igne remouetur, idq; medicamentum tum pro ut opus est, aut ex melle, aut ex uino liquatur. Idem autem per se etiā ad fistulas utile est. Solet etiam interdum ad nervos ulcus descendere: profuitq; pituita multa, sanies tenuis maliq; odoris, non cocta, aut aquæ similis, in qua atro recens lota est. doloresq; is locus, & punctiones habet: id genus quamuis inter purulentum est, tamen lenibus medicamentis curandum est: quale est emplastrum tetrapharmacum ex rosa liquatum sic, ut thuris quoq; paulum ei misceatur: aut id quod ex butyro, rosa, resina, melle fit. supra uero à me positum est. præcipueq; id ulcus multa calida aqua fouendum est, uelandumq; neq; frigori committendum. Interdum autem per ipsa ulcera coles sub cute excusos sic, ut glans excidat. sub quo casu cutis ipsa circumcidenda est. perpetuumq; est, quotiens glans, aut ex cole aliquid, uel excidit, uel absconditur: hanc non esse seruandam, ne confidat, ulceriq; agglutinetur, ac neq; reduci possit postea, & fortasse fistulam quoq; urinæ cludat. Tubercula etiam, quæ quædam græci uocant circa glandem oriuntur, quæ uel medicamentis, uel ferro aduruntur, & cum crustæ exciderunt, squama æris inspergitur, ne quid ibi rursus increseat.

De cancri, qui in cole nascitur, curatione.

Aec circa cancerum sunt, qui cum in reliquis partibus, tum  
 h in his quoq; uel præcipue ulcera infestat. incipit à nigritie, quæ si autem occupauit: protinus specillū subiiciendum, eaq; incidenda est: deinde oræ uulsellaprehendendæ: tum quicquid corruptum est: excidendum sic, ut ex integro quoq; paulum demat, idq; adurendum. quotiens quid ustum est, id quoq; sequitur, ut imponenda lenticula sit: deinde ubi crustæ exciderunt, ulcera sic, ut alia curetur. at si cancer ipsum colem occupauit: inspergenda aliqua sunt ex adurentibus, maximeq; id quod ex calce, chalcitide, auripigmento componitur. si medicamenta uincuntur, hic quoq; scalpello quicquid corruptum est sic, ut aliquid etiā integri trahat, præcidi debet. illud quoq; æq; perpetuum est, ex cæso cancro uulnus esse adurendum: sed siue ex medicamentis, siue ex ferro crustæ ceciderunt, magnum periculum est, ne his decedentibus ex cole profusio sanguinis insequatur: ergo longam quiete & immobili penè corpore opus est, donec ex ipso crustæ



puræ leniter resoluantur. at si uel uolens aliquis, uel imprudens, dum ingrediatur immature, crustas diduxit, & fluit sanguis, frigida aqua adhibenda est: si hæc parum ualet, decurrendum est ad medicamentum, quæ sanguinem supprimunt. si ne hæc quidem succurrunt, aduri diligenter & timide debet, neq; ullo postea motu dandus eidem periculo locus est.

De phagedæna in cole nascentis curatione.

Onnunquam etiam id genus ibi canceri, quod *phagedæna* à grecis nominatur, oriri solet, in quo minime differendum: sed protinus huiusdem medicamenti occurrendum est, & si parum ualent: ferro adurendum. quædam etiam nigrities est, quæ nō sentitur & serpit, ac si sustinuerimus usq; ad uesciam tendit: neq; succurri postea potest. si id in summa glande circa fistulæ urinae est, prius in ea tenue specillum demittendum est, ne claudatur: deinde id ferro adurendum: si uero alte penetrauit, quicquid occupatum est, præcidendum est. cæterum eadem, quæ in alijs canceris, facienda sunt.

De carbunculo qui in cole nascitur.

Cælescit etiam in cole interdum aliquid: idq; omni penè sensu caret: quod ipsum quoq; excidi debet. Carbunculus autem ibi natus, ut primum apparet, oriculario clystere eluendus est: deinde ipse quoq; medicamenti urendus, maximeq; chalcitide cum melle, aut ærugine cum cocto melle, aut ouillo stercore & contrito cum eodem melle: ubi is excidit, liquidis medicamenti utendum est, quæ ad ora ulceris componuntur.

De testiculorum morbis, & eorum curatione.

In testiculis uero si qua inflammatio sine ictu orta est: sanguis ex talo mittendus est: à cibo abstinendum: imponendum ex faba farina ex mulso cocta cum cumino contrito ex melle cocto, aut contritum cuminum cum cerato ex rosa facto: aut lini semen frictum, contritum, & in mulso coctum, aut tritici farina ex mulsa cocta cū cupresso, aut lilij radix contrita, aut si ijdē induruerunt, imponi debet lini uel foeni græci semen ex mulso coctum, aut ex cyprino ceratum, aut similia ex uino contrita, cui paulū croci sit adiectum. si uetustior iā durities est, maxime proficiat cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, dein contrita. si ex ictu tument, sanguinem mitti necessariū est, magisq; si etiā liuens. Imponendū uero utriuslibet ex his quæ cum cumino componuntur, supraq; proposita sunt:

o ū



LIBER

aut ea compositio, quæ habet nitti cocti. P. XI. resinæ pineæ, gummi, singulorum. P. XII. unæ taminie sine seminibus. P. XIII. mellis quantum sat sit ad ea cogenda: quod si ex ictu testiculis aliquid desit, ferè pus quoque crescit, neque aliter suaurri potest, quam si in aso scroto et pus emissum, et ipse testiculus excusus est.

De rhagadijs, et Condylomate, et hæmorrhoidibus, alijsque ani morbis, et curationibus eorum, et primo de rhagadijs.

Nus quoque multa, et diuque plena mala recipit: nec in se multum abhorrentes curationes habet: at primum in co sæpe et quidem pluribus locis cutis exciditur. *ῥαγάδες* græci uocant, id si recens est: quiescere homo debet et in aqua calida desidere. Columbina quoque oua coquenda sunt, et ubi induruerunt, purganda: deinde alterum iacere in aqua bene calida debet, altero calido foveri locus sic, ut inuicem utroque aliquis utatur. Tum tetrapharmacum, aut *ῥοζάδες* rosa diluendum est, aut hyssopum recens misandum cum cerato liquido ex rosa facto: aut eidem cerato liquido plumbum elotum adiungendum: aut resinæ terebinthinæ myrrha: aut stumæ argenti uetus oleum: et quolibet ex his id perungendum: si quicquid læsum est, extra est, neque intus reconditum, eodem medicamento tinctum linamentum super dandum est: et quicquid ante adhibuimus cerato contegendum. In hoc autem casu neque acerbis cibis utendum, neque asperis, nec alium comprimentibus: ne aridum quidem quicquid satis utile est: nisi admodum paulum: liquida, lenia, pingua, glutinosa meliora sunt: uino leni uti nihil prohibet.

De condylomate.

Condyloma autem est tuberculum: quod ex quadam inflammatione nasci solet: id ubi ortum est, quod ad quietem, cibos, potionesque pertinet: eadem seruari debent, quæ proxime scripta sunt: hisdem etiam ouis recte tuberculum id fouetur. sed desidere ante homo in aqua debet, in qua uerbena decocta sunt ex reprimentibus: tum recte imponitur, et lenticula cum exigua nullis parte, et sertula campana ex uino cocta, et rubi folia contrita cum cerato ex rosa facto: et cum eodem cerato contritum, vel cotoneum malum, vel malicorij ex uino cocti pars interior, et chalatis cocta, atque contrita: deinde hyssopo, ac rosa exapta: et ex ea compositione, quæ habet thuris. P. XI. aluminis scissilis. P. XII. cerussæ. P. XIII. stumæ argenti. P. XV. quibus dum teruntur: inuicem rosa et uinum instillatur. uinculum autem ei loco lintecolum, aut panniculus quadratus est: qui ad



qui ad duo capita duas ansas, ab altera uero parte totidem fascias habet, cumq; subiectus est, ansis ad uentrem datis à posteriore parte in eas adductæ fasciæ coniunguntur, atq; ubi artatæ sunt: dexteriori sinistra, sinistriori dextra procedit, circumdatæq; circa aluum inter se nouissime nodo deligantur. sed si uetus condyloma iam induruit, neq; sub his curationibus desidit, aduri medicamento potest, quod ex his constat: æruginis. P. XII. myrrhæ. P. XIII. gummi. P. XVIII. thuris. P. XXII. stibis: papaueris lacrymæ, acaciæ, singulorū. P. XXVI. quo medicamento quidam etiam ulcera, de quibus proxime dixi: renouant. si hoc parum in condylomate proficiat: adhiberi possunt etiam uehementius adurentia. ubi consumptus est tumor: ad medicamenta lenia transeundum est.

## De hæmorrhoidibus.

tertium autem uitium est, ora uenarum tanquam ex capitulis quibusdam surgentia: quæ sæpe sanguinem fundunt, æmorrhoides græci uocant. idq; etiam in ore uulvæ foeminarum incidere consuevit. atq; in quibusdam parum tato supprimitur, qui sanguinis profluvio imbecilliores non fiunt. habet enim purgationem hanc non morbum: ideoq; curati quidā cum sanguinis exitum non haberent: inclinata in præcordia ac uiscera materia subitis, & grauissimis morbis correpti sunt. si cui uero id nocet, is desiderare in aqua ex uerbis debet: imponere maxime malicorium cum aridis rosæ folijs contritum: aut ex his aliqua, quæ sanguinem supprimūt. Solet autem oriri inflammatio, maxime ubi dura alius eum locum læsit. tum in aqua dulci desidendum est, & id fouendum ouis: imponendi uirelli cum rosæ folijs ex passo subacto: idq; si intus est, digito illinendum, si extra super illitum panniculum imponendum est. ea quoq; medicamenta, quæ recentibus scissuris posita sunt, hic idonea sunt. Cibus uero in hoc casu hisdem quibus in prioribus utendum est: si ista parum iuuat, solent imposita medicamenta adurentia, ea capitula absumere. ac si iam uetustiora sunt, sub auctore Dionysio inspargenda sandaracæ est, deinde imponendum, quod ex his constat: squamæ æris, auripigmenti: singulorum. P. XV. saxi calcis. P. XVIII. postero die acu compungendum. adustis capitulis fit cicatrix: quæ sanguinem fundi prohibet. sed quotiens is suppressus est, ne quid periculi afferat, multa exercitatione digerenda materia est. prætereaq; & uiris & foeminis, quibus menstrua non proueniunt, interdum ex brachio sanguis mittendus est.

Aurelij Cor.

• iij



Si anus, uel os uulue procidit, qua curatione utendum sit.

**T** si anus ipse uel os uulue procidit, (nā id quoq; interdum  
**a** fit) considerari debet purum ne id sit: quod prouolutū est,  
an humore mucoso circumdatum. si purum est, in aqua de-  
sidere homo debet, aut salsa, aut cum uerbenis uel malicorio incocta:  
si humidum, uino austero subluendum est, illinendumq; fece uini com-  
busta. ubi utrolibet modo curatum est, intus reponendum est, imponē-  
daq; plantago contrita, uel folia salicis in aceto cocta, tum linteolum  
et super lana æque deliganda cruribus inter se deuinctis.

De ulcere fungo simili in ano.

**V**ngo quoq; simile ulcus in eadem sede nasci solet. id si hy-  
**f** ems est, egelida, si aliud tempus, frigida aqua fouendū est.  
deinde squama æris inspergenda, supraq; ceratū ex myr-  
teo factū. cui paulū squamæ, fuliginis, calas, sit adiectum. si hac rōne  
nō tollitur, uel medicamentis uehementioribus, uel ferro adurendū est.

De digitorum ulceribus. Cap. XIX.

**I**gitorum autem uetera ulcera commodissime curantur, aut  
**d** lyco, aut myrrha cocta: cū utrilibet unum adiectum est. in  
hisdem recedere ab ungue caruncula cum magno dolore cō-  
suevit. mēpū uior græci appellant. oportet alumen melinum rotundum  
in aqua liquare donec mellis crassitudinem habeat: tum quantum  
eius aridi fuit, tantundē mellis insundere, et radicula miscere, do-  
nec similis croco colore fiat, eoq; illinere. quidam ad eundem usum  
decoquere simul malua solent: cū paria pōdera aluminis aridi et mel-  
lis misuerint. si hac ratione ea nō exacerunt: excidēda sunt: deinde  
digni fouēdi aqua ex uerbenis, imponendumq; sup medicamentum  
ita factum. chalcitis, malicorii, squama æris excipiuntur fīco pingui  
leniter cocto ex melle. aut chartæ combustæ, auripigmenti, sulphuris  
ignē nō experti par modus cerato miscetur ex myrteo facto. aut æru-  
ginis rase. P. XI. squamæ. P. XII. mellis cyatho coguntur. aut pares  
portiones miscentur: saxi calas, chalcitidis, auripigmenti quicquid ho-  
rum impositum est, tegendum linteolo aqua madefacto est: tertio die  
digitus resoluendus est. si quid aridi est, iterum excidendum, similisq;  
adhibenda curatio est. si non uincitur, purgandus scalpello, tenuibusq;  
ferramentis adurendus est: et sicut reliqua uista curandus est. at ubi  
scabri ungues sunt, circum aperiri debent: qua corpus contingunt. tūc  
super eos ex hac cōpositione æque imponi sandaracæ, sulphuris, sin-  
gulorum. P. XII. nitri, auripigmenti, singulorum. P. XIII. resinæ lig-  
dæ. P. XVIII. tertioq; id die resoluendū est. sub quo medicamento ui-  
ciosi ungues cadunt, et in eorum locum meliores renascuntur.



De chirurgica, & qui in ea claruerint, & qualis esse chirurgicus debeat, & quid in hoc libro describatur.

Etiam esse medicinae partē: quae manu cures, & vulgo notum, & a me propositum est. ea non quidem medicamenta atq; uictus rationē omittit, sed manu tamen plurimum praestat. estq; eius effectus inter omnes medicinae partes euidentissimus. siquidem in morbis cum multum fortuna conferat: eademq; saepe salutaria, saepe uana sint: potest dubitari secunda ualetudo medicinae, an corporis beneficio contigerit: in his quoq; in quibus medicamentis maxime utimur: quamuis profectus euidentior est: tamen sanitatem & per haec frustra quari, & sine his reddi saepe manifestum est. sicut in oculis quoque deprehendi potest: qui a medicis diu uexati sine his interdum sanescunt. at in ea parte, quae manu curat, euident est, omnem profectum, ut aliquid ab alijs adiunctur, hinc tamen plurimum trahere. Haec autem pars, cum sit uetustissima, magis tamen ab illo parente omnis medicinae Hippocrate, quam a prioribus exulta est: deinde posteaquam diducta ab alijs habere professores suos coepit, in aegypto quoque increuit Philoxeno maxime auctore, qui pluribus uoluminibus hanc partem diligentissime comprehendit. Gorgias quoque, & Sostratus, & Hieron, & Apollonij duo, & Hamomus alexandrinus: multiq; alij celebres uiri singuli quaedam reperierunt. ac Romae quoque non mediocres professores, maximeq; nuper Tryphon pater, & Euelpistus: & ut ex scriptis eius intelligi potest, horum eruditissimus Megetes quibusdam in melius mutatis aliquantum ei disciplinae adiecerunt. Esse autem chirurgus debet adolescens, aut certe adolescentiae propior, manu strenua, stabili, nec unquam intremiscente, eaq; non minus sinistra, quam dextra promptus: acie oculorum acris: claraq; animo intrepidus, immisericors sic, ut sanari uelit eum quem accipit, non ut clamore eius motus, uel magis quam res desiderat: properet, uel minus quam necesse est, secet: sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex uagitibus alterius affectus oriat. Potest autem requiri: quid huic parti proprie uendicandum sit: quia uulnere quoq; ulcerumq; multorum curationes, quas alibi exutus sum: chirurgi sibi uendicant. ego eundem quidem hominem posse omnia ista praestare concipio. atque ubi se diuise-



## LIBER

runt, eum laudo, qui quàm plurimū percipit. Ipse autē huic parti, ea reliquit: in quibus vulnus facit medicus: non accipit: & in quibus ulceribus, ulcēribus'ue plus perfici manu, quàm medicamento credo. tū quicquid ad ossa pertinet: quæ deinceps exequi aggrediar, dilatisq; in aliud uolumen ossibus, in hoc cætera explicabo: præpositisq; his, quæ in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quæ proprias sedes habent: transibo.

## De luxatis. Cap. I.

1 Vxata igitur in quacunq; parte corporis sunt, quàm primum sic curari debent, ut qua dolor est, eà scalpello cutis crebro incidatur: detergaturq; eodem aduerso profluens sanguis. quod si paulo tardius subuenitur, iamq; etiam rubor est, qua rubet corpus, si tumor quoq; accessit, quacunq; is est, id optimum auxilium est. tum super danda reprimētia sunt, maximeq; lana succida ex aceto, & oleo. quod si leuior is casus est: possunt etiam sine scalpello imposita eadem mederi. Et si nihil aliud est, cinis quoq; maxime ex sarmentis. si is non est, quilibet alius ex aceto uel etiā ex aqua coactus.

## De his, quæ per se intumescunt, quomodo excidenda, &amp; curanda sunt. Cap. II.

2 Erum hoc quidem promptum est. in his autem negotiū maius est, quæ per se uicio intus orto intumescunt, & ad suppurationem spectant. ea omnia genera abscessum esse aliās proposui, medicamentaq; eis idonea executus sum. nunc superest ut dicam in hisdem, quæ manu fieri debeant. ergo priusquam indurescant: cutem incidere, & cucurbitulam accommodare oportet: quæ quicquid illuc male, corruptaq; materiæ coijt: extrahat, idq; iterū, tertioq; recte fit, donec omne inditum inflammationis excidat. neq; tamen fas non est nihil cucurbitula agere. interdum enim sed raro quicquid abscedit, uelamento suo includitur. id antiqui tunicam nominabant. Meges quia tunica omnis nervosa est: dicit non nasci sub eo uicio nervum: quo caro consumeretur, sed subiecto iam uetustiore pure callum circumdari. quod ad curationis rationem nullo loco pertinet, quia quicquid dixi, si tunica est, idem, si callus est, fieri debet. neq; ulla res prohibet, etiam si callus est: tamen quia cingit: tunicam nominari. tum pure quoq; maturior hæc interdum esse cōsuevit. ideoq; quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutauit. ergo siue id inci-



dit, sine iam durities est: in hac auxilij nihil est. & ut alijs scripse  
 uel auertenda concurrens eò materia, uel digerenda, uel ad maturi-  
 tatem perducenda est. si priora contigerunt, nihil præter ea necessa-  
 rium est. si pus maturuit, in alis quidem, & in inguinibus raro secū  
 dum est. item ubicunq; mediocris abscessus est. item quotiens in sum-  
 ma cute, uel etiam carne uitium est: nisi festinare curantis imbecilli-  
 tas cogit. satisq; est cataplasmata efficere, ut per se pus aperiatur:  
 nam ferè sine ciatrice potest esse is locus: qui expertus ferrum non  
 est, si autem altius malum est, considerari debet nervosus ne is lo-  
 cus sit: an non sit. nam si sine nervus est, cadenti ferramento ape-  
 riri debet. cuius hæc gratia est, quod exigua plaga diutius ad pus eno-  
 candū patet: paruaq; postea ciatrix fit. at si nervi iuxta sunt: ignis  
 alienum est: ne uel distendantur hi, uel membrum debilitent. necessa-  
 ria uero opera scalpelli est. sed cætera etiam subcruda aperiri pos-  
 sunt. inter nervos uero ultima expectanda maturitas est: quæ cutem  
 extenuet: eiq; pus iungat: quo propius reperiatur. itemq; alia rectam  
 plagam desiderant in carne. quia ferè uehementer cutem extenuat.  
 tota ea super pus excidenda est. Semper autem, ubi scalpellus admove-  
 tur, id agendum est, ut quàm minimæ, & quàm paucissimæ plagæ  
 sint. cum eo tamen, ut necessitati suaturramus, & in modo & in nu-  
 mero. nam maiores sinus latius, interdum etiam duabus aut pluri-  
 bus lineis incidendi sunt. dandaq; opera ut inus sinus exitum ha-  
 beat, ne quis humor intus subsidat, qui proxima & adhuc sana ro-  
 dendo sinuet. est etiam in rerum natura, ut cutis latius excidenda sit:  
 nam ubi post longos morbos totus corporis habitus uitiat, lateq;  
 se sinus diffudit, & in eo pars cutis pallet: scire licet eam iam emor-  
 tuam esse, & inutilem futuram. ideoq; excidere commodius est. ma-  
 xime si circa articulos maiores id euenit, cubantemq; ægrum flu-  
 ens aluus exhaurit: neq; per alimenta quicquam corpori accedit. sed  
 excidi ita debet, ut plagæ ad similitudinem myrtei folij fiat, quo fa-  
 cilius sanescat. idq; perpetuum est. ubicunq; medicus ex quacunque  
 causa autem excidit, pure effuso in alis, uel inguinibus, linamento opus  
 non est. sponsa ex uino imponenda est. in cæteris partibus si æque  
 ea linamenta superuacua sunt: purgationis causa paulum mellis in-  
 fundendum, dein glutinantia super danda. si illa necessaria sunt:  
 super ea quoq; similiter dari sponsa eodem modo ex uino expressa  
 debet. quando autem linamenti opus sit: quando nō sit: alijs dictum  
 est. cætera eadem incisa suppuratione facienda sunt. quæ ubi per me-  
 dicamenta rupta est, facienda esse proposui.



## LIBER

De bonis, malis'ue signis exlucetorum.

## Cap. III.

Rotinus autem quantum curatio efficiat, quantumq; aut spe  
 P rari, aut timeri debeat: ex quibusdam signis intelligi po-  
 test: fereq; hisdem, quæ in vulneribus exposita sunt. nam  
 bona signa sunt: somnum capere: facile spirare: siti non confici: cibum  
 non fœdare, si febricula fuit, ea uacare: itemq; habere pus albū, leue,  
 nō fœdi odoris. Mala sunt, uigilia, spiritus grauitas: sitis: cibi fœditiū:  
 febris: pus nigrum, aut feculentum & fœdi odoris. Item procedente  
 curatione eruptio sanguinis, aut si antequam sinus carne impleatur,  
 oræ carnosæ fiunt: illa quoq; ipsa carne hebetē nec firma deficere ta-  
 men animam uel ipsa curatione uel postea: pessimum omnium est. quā  
 etiam morbus ipse siue subito solutus est: deī suppuratione exorta est,  
 siue effuso pure permanet non iniuste terret. Est q; inter causas timo-  
 ris: si sensus in vulnere rodentiū non est: sed ut hæc ipsa fortuna huc  
 illuc ne discernit: sic medici partum est: eniti ad reperiendam sanita-  
 tem. ergo quotiens ulcus resiliuerit: eluere id: si reprimendus humor ui-  
 debitur: uino ex aqua pluuiatili mixto, uel aqua in qua lenticula  
 cocta sit, debebit. si purgandum erit, mulso, rursusq; imponere eadē.  
 ubi iam repressus uidebitur humor ulcusq; purum erit, produci car-  
 nem conueniet et foueri vulnus pari portione uini ac mellis, superq;  
 imponi spongia ex uino & rosa tincta. per quæ cum atro producta-  
 tur: plus tamen, ut aliās quoq; dixi, uictus ratio eō confert. id est solu-  
 tis iam febribus, & cibi cupiditate reddita: balneum rarium. con dia-  
 na, sed lenis gestatio, cibi potionesq; corpori reficiendo. apteq; omnia  
 quæ per medicamenta suppuratione quoq; rupta sequuntur sed quia  
 magno malo uix sine ferro uideri licet: in hūc locū reſeruata ſunt.

## De fistulis. Cap. IIII.

Duersus fistulas quoq; si altius penetrant ut ad ultimas de-  
 a mitti collirium non possit, si tortuosæ sunt, si multiplices,  
 maius in manu quā in medicamentis præsidium est: mi-  
 nusq; operæ est: si sub cute transuersæ feruntur, quā si rectæ intus  
 tendunt. igitur si sub cute transuersa fistula est: demitti specillum de-  
 bet, supraq; id eā inadi, si flexus reperiuntur, hi quoq; simul specil-  
 lo & ferro persequendi sunt. idemq; faciendum, si plures se quasi ra-  
 muli ostendunt. ubi ad fines fistulæ uentum est, excidendum ex toto  
 callus est, superq; fibulæ dandæ: & medicamentum quo glutinetur:



at si recta subter tendit, ubi quo, maxime ferat, specillo exploratum est, excidi is sinus debet, dein fibula oris cutis iniicienda est, et aequae glutinantia medicamenta super danda sunt. aut si corruptius ulcus, quod interdum osse uitiato fit, ubi id quoque curatum est: pus mouetia. solent autem inter costas fistulae subter exire. quod ubi incidit, eo loco costa ab utraque parte decidenda, et eximenda est, nequid intus corruptum relinquatur. solent, ubi costas transierunt, septum id, quod trasuersum a superioribus uisceribus intestina discernit: uiolare. quod intelligi et ex loco, et ex magnitudine doloris potest: et quia nonnunquam spiritus eo, cum humore quasi bulla intus prorumpit, maximeque si hunc ore ille continuit. in eo medicamentum locus nullus est. in ceteris uero quae circa costas sanabilia sunt: pingua medicamenta inimica sunt. ceteris, quae ad uulnera accommodantur, uti licet. optime tamen siata linimenta, uel si purgandum aliquid uidetur, in melle tincta imponuntur. uentri nullum os subest: sed ibi perniciosae admodum fistulae fiunt, adeo ut sostratus insanabiles esse crediderit. id non ex toto ita se habere usus ostendit. et quidem quod maxime mirum uideri potest: tutior fistula est contra iecur, et lienem, et uentriculum, quam contra intestina, non quo perniciosior res ibi sit, sed quo alteri periculo locum faciat. cuius experimento moti quidam auctores parum modum rei cognouerunt. nam uentre sepe etiam telo perforatur, pro lapsaque intestina conduntur, et oras uulneris suturae comprehendunt. quod quemadmodum fiat mox indicabo. itaque etiam ubi tenuis fistula abdomen perfrangit: excidere eam licet, suturaque oras coniungere. si uero ea fistula intus patuit, excisa necesse est latius foramen relinquat, quod nisi magna uis, utique ab interiore parte sui non potest, qua quasi membrana quaedam finit abdomen: quam *περιτονεον*, graeci uocant. ergo ubi aliquis ingredi ac moueri coepit: rumpitur illa sutura, atque intestina soluntur. quo fit ut pereundum homini sit. sed non omni modo res ea desperationem habet. ideoque tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

## De ani fistulis.

Propriam etiamnum animaduersionem desiderant ea, quae in ano sunt. in has demisso specillo ad ultimum eius caput incidi cutis debet: dein nouo foramine specillum educa lino sequente: quod in aliam eius partem ob id ipsum perforatum coniectum sit. ibi limum prehendiendum, uinciendumque cum altero capite est, ut laxa cutem, quae super fistulam est, teneat. idque limum esse debet.



crudum & duplex, triplexue, sic tortum ut unitas facta sit. Interim autem licet negocia agere, ambulare, lauare, cibū capere perinde atq; sanissimo. tantummodo id līnum bis die saluo nodo ducendum est sic, ut subeat fistulam pars, quæ superior fuerit. neq; committendum est ut id līnum putrescat. sed tertio quoq; die nodus resoluendus est, et ad caput alterum, recens līnum alligandum est, eductoq; uetere, id in fistula cum simili nodo relinquendū. sic enim id paulatim cutem, quæ supra fistulam est: incidit, simulq; & id sanescit, quod à līno relicū est, & id quod ab eo mordetur: inciditur. hæc ratio curationis longa, sed sine dolore est. qui festinat, astringere cutem līno debet, quo celerius fecerit, noctuq; penicillo tenuia quædam intus demittere, ut cutis hoc ipso extenuetur: quod extenditur: sed hæc dolorem mouent. adiutur celeritati sicut tormento quoque: si et līnum, & id quod ex penicillo est, aliquo medicamento illinuntur ex ijs, quibus callum exedi posui. poterit tamen fieri ut ad scalpelli curationem etiam illò loci ueniendum sit, si intus fistula fert, si multiplex est. igitur in hæc genera demisso specillo duabus lineis incidenda cutis est: ut media inter eas habentula tenuis admodum eiciatur, ne protinus ora coeant: sitq; locus aliquis linamentis: quæ quàm paucissima super iniicienda sunt, omniaq; eodem modo facienda, qui in abscissibus positus est. si uero ab uno ore plures sinus erunt: recta fistula scalpello erit incidenda, ab eo cæteræ, quæ iam patebunt līno excipiendæ. si intus aliqua procedet: quo ferrum tuto peruenire non poterit: collirium demittendum erit. cibus autem in omnibus eiusmodi casibus, siue manu, siue medicamentis agatur: dari debet humidus. potio liberalis, diuq; aqua ubi iam caro increscit. tum demum & balneis raris utendum erit, & cibis corpus implentibus.

## De telis è corpore extrahendis. Cap. V.

Elæ quoq; quæ illata corporibus intus hæserunt: magno negotio sæpe eiciuntur. suntq; quædam difficultates ex generibus eorum, quædam ex his sedibus in quas illa penetrarunt. omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte, qua uenit, aut ab ea, in qua tetendit. illic uiam, qua redeat: ipsum sibi facit. hic à scalpello accipit. nam contra mucronē caro inciditur. sed si non alte telū insedit, et in summa carne est, aut. certe magnas uenas, et loca neruosa non transit, nihil melius est: quàm qua uenit id euellere. si uero plus est p quod telo reuertendū quàm quod perrupendum est: iamq; uenas, neruosq; id transit: commodius est aperire quod superest, eaq; extrahere. nam & propius petitur, et tutius euellitur, et in maiore



membro si medium mucro trāsīt, facilius sanescit, quod peruium est. quia utrinq; medicamento fouetur: sed si retro telum recipiendum est: amplianda scalpello plaga est: quo facilius id sequatur: quoq; minor oriatur inflammatio, quæ maior fit: si ab illo ipso telo dum redit, corpus laniatur. Item si ex alia parte vulnus aperitur: laxius esse debet, quàm ut telo postea transeūte ampliatur. Summa autem utraq; parte ita habenda cura est, ne nervus, ne uena maior, ne arteria incidatur. quorum ubi aliquid detectum est, excipiendum hamo retuso est, abducendumq; scalpello. Vbi autem satis incisum est, telum eximendum est: tum quoq; eodem modo, et eadē cura habita, ne sub eo, qđ eximetur, aliquid eorum lædatur: quæ tuenda esse proposui. Hæc cōmunia sunt: propria quædam in singulis telorum generibus subiicienda sunt: quæ protinus subiiciam: nihil tam facile in corpore quàm sagitta conditur, eademq; altissime insedit. hæc autem eueniunt, et quia magna ui fertur illa, et quia ipsa in angusto est. sepius itaq; ab altera parte, quàm ex qua uenit, recipienda est: præcipueq; quia ferè spiculis cingitur, quæ magis laniant, si retro, q̄ si contra trahuntur: sed inde aperta uia cito diduci debet ferramento ad similitudinem facto græcæ litteræ †. Deinde ubi apparuit: si mucro, si harundo inheret propellenda est, donec ab altera parte apprehendi et extrahi possit: si iam illa decedit, solumq; intus ferrum est, mucro uel digitis apprehendi, uel forfice, atq; ita educi debet: neq; alia ratio extrahendi est, ubi ab ea parte qua uenit, euelli magis placuit: nam ampliatio uulnere aut harundo, si inest, euellenda est, aut si ea non est, ferrum ipsum: quod si spicula apparuerunt, eaq; breuia et tenuia sunt: forfice ibi comminui debent, uacuumq; ab his telum educi, si ea maiora, ualentioraq; sunt, fissis scriptorijs calamis cōtegenda: ac nequid lacerent, sic euellenda sunt. Et in sagittis quidem hæc observatio est. Latum uero telum si conditum est, ab altera parte educi nō expedit, ne ingenti uulnere, ipsi quoq; ingens uulnus adiiciamus. euellendum est ergo genere quodam ferramenti, quod diocleum græci graphiscum uocant: quoniam auctorem Dioclen habet: quem inter priores, maximosq; medicos fuisse iam posui. Lamina uel ferrea, uel aenea etiam ab altero capite duos utrinq; deorsum conuersos uncōs habet: ab altero duplicata alteribus, leuiterq; extrema in eam partem inclinata, quæ sinuata est: insuper ibi etiam parte inclinata, quæ perforata est: hæc iuxta telum transuersa demittitur. deinde ubi ad inimum mucronem uentum est: paulum torquetur, ut telum foramine suo excipiat. cum in cauo mucro est, illico duo digiti subiecti partis alterius unās simul et ferramentum id extrahunt, et telum. Tertium genus



## LIBER

telorum est, quod interdum euelli debet, plumbea glans, aut lapis, aut simile aliquid, quod perrupta cute integrū intus insedit. in omnibus his latius vulnus aperiendum, idq; quod inest, eā qua uenit, forfice extrahendum est. Accedit uero aliquid difficultatis sub omni ictu, si telum uel ossi inhæsit, uel in articulo se inter duo ossa demersit: in osse usq; eo mouendum est, donec is locus laxetur, qui mucronem momordit: Et tum uel manu, uel forfice telum extrahendum est: quæ ratio in dentibus quoq; eijciendis est. Et uix unq; ita telum non sequitur. sed si morabitur, excuti quoq; ictum aliquo ferramento poterit. Vltimū est, ubi nō euellitur, terebra iuxta forare, ab eo quoq; foramine ad speciem littere † contra telum os excidere sic, ut lineæ quæ diducuntur, ad telum spectent. eo facto id necesse est labet, Et facile auferatur. Inter duo uero ossa si per ipsum articulum perruptum rit, circa vulnus duo membra fasciis habenis uel deliganda, Et per has in diuersas partes diducenda sunt, ut nervos distendant. quibus extētis laxius inter ossa spaciū est, ut sine difficultate telum recipiatur. illud uidendum est, si cut in alijs locis posui, ne quis nervus, aut uena, aut arteria à telo lœdatur: dum id extra itur: eadem scilicet ratione quæ supra posita est. at si ueneno quoq; telo quis ictus est: hysdem omnibus si fieri potest etiam festinantius actis adijcienda curatio est: quæ uel epoto ueneno, uel à serpente ictis adhibetur. Vulneris autem ipsius extracto telo medicina non alia est, quàm quæ esset si corpore icto nihil inhæssisset. de qua satis alio loco dictum est.

De ganglijs, Et meliceride, Et atheromate, Et steatomate  
capitis tuberculis. Caput VI.

h Accuenire in qualibet parte corporis possunt. reliqua certas sedes habent: de quibus dicam orsus à capite. in hoc multa, uariaq; tubercula oriuntur: ganglia, meliceridas, et atheromata nominant: alijsq; etiam nūm uocabulis quædam alij discernunt, quibus ego steatomata quoq; adijciam. quæ quauis Et in ceruice, Et in alis, et in lateribus oriri solent: per se tamen non posui, cum omnia ista mediocres differentias habeant: ac nec periculo terreant, neq; diuerso genere curentur. Omnia autem ista Et ex paruo incipiunt, Et diu, paulatimq; crescunt: Et tunica sua includuntur: quædam ex his dura, ac renitentia: quædam mollia, cedentiaq; sunt, quædam spacio nudantur: quædam testæ capillo suo permanent: ferèq; sine dolore sunt. quid intus habeat, ut coniectura præagiri potest, sic ex toto cognosci, nisi cum eiecta sunt, non potest. maxime tamen in his quæ renitentur, aut lapillis quædam similia, aut concreti, confertiq;



pili reperiuntur. In his uero quæ cedunt, aut melli simile aliquid, aut tenui pulticula, aut quasi rasæ cartilagini, aut carni hebeti, & cruentæ: quibus aliqui colores esse consuerunt fereq; ganglia reperiuntur. atheromati subest quasi tenuis pulticula. meliceridi liquidior humor: ideoq; pressum circumsistit. steatomati pingue quiddam, idq; latissime patere consuevit, resoluitq; totam cutem superpositam sic, ut ea labet, cum in cæteris sit astrictior. omnia derasa ante si capillis continguntur, per medium oportet incidere: sed steatomatis tunica quoq; secunda est, ut effundatur quicquid intus coit: quia non facile à cute subiecta carne ea separatur: in cæteris ipsa tunica inuiolata seruanda est. Protinus autem alba, & intenta se ostendit. tum scalpelli manubriolo diducenda à cute, & carne est: eijciendaq; cum eo quod intus tenet. si quando tamen ab inferiore parte tunicæ musculus inhaesit, ne is lœdatur, superior pars illius decidenda, alia ibidem relinquenda est. ubi tota exempta est, committendæ oræ, fibulaq; his injicienda, & super medicamentum glutinans dandum est. ubi uel tota tunica, uel aliquid ex ea relictum est: pus mouentia adhibenda sunt.

De oculorum uicijs quæ scalpello, & manu curantur. Cap. VII.

Ed ut hæc neq; genere uicij, neq; ratione curationis inter se multum distant sic, in oculis quæ manum postulant, et ipsa diuersa sunt, & aliter, aliterq; curantur. igitur in superioribus palpebris uesticæ nasci solent pingues, grauesq; quæ uix attollere oculos sinunt: leuesq; pituitæ cursus, sed assiduos in oculis mouent. Ferè uero in pueris nascuntur. Oportet compresso digitis duobus oculo, atq; ita cute intenta, scalpello transversam lineam incidere, suspensa leuiter manu, ne uesticæ ipsa uulneretur: & ut locus ei patefactus est, ipsa prorumpat: tum digitis eam apprehendere oportet, & euellere: facile autem sequitur. deim super ungi collirio debet ex his aliquo, quo lippientes oculi super inunguntur. paucissimisque diebus cicatrix la inducitur. molestius est ubi incisa uesticæ est. Effundit enim humorẽ: neq; postea quia tenuis admodum est, potest colligi: si forte id incidit, eorum aliquid imponendum est, quæ puri mouendo sunt.

De crithe tuberculo palpebrarum.

i Ne eadem palpebra super pilorum locum tuberculũ paruum nascitur, quod à similitudine ordeĩ à græcis *oribon* nominatur tunica quiddam quod difficulter maturescit cõprehensum est. id uel calido pane, uel cera subide calefacta foueri oportet



sic ne nimis is calor sit: sed facile ea parte sustineatur. hac enim ratione sepe discutitur: interdum concoquitur: si pus se ostendit, scalpello dividi debet, & quicquid intus humoris est, exprimi. Eodem deinde uapore postea quoque foueri, & super inungi, donec ad sanitatem perveniat.

De chala<sup>z</sup>ia palpebrarum.

Lia quoque quaedam in palpebris huic non dissimilia nascuntur: sed neque utique figurae eiusdem, & mobilia simul, atque digito huc uel illuc impelluntur: ideoque ea χαλα<sup>z</sup>ia uocant. haec inadi debent: si sub cute sunt ab exteriori parte: si sub cartilagine, ab interiori. dein scalpelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt: ac si intus plaga est: inungendum primo lenibus: deinde acrioribus. si extra, super dandum emplastrum, quo id glutinetur.

De ungue oculorum, quod *μεινύριον* à grecis uocatur.

Unguis uero, quod *μεινύριον* greci uocant: est membranula nervosa oriens ab angulo, quae nonnunquam ad pupillam quoque pervenit, eique officit. saepius à narium, interdum etiam à temporum parte nascitur. hunc recentem non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur: si inueteravit, iamque ei crassitudo quoque accessit: excidi debet. Post abstinentiam uero unius diei, uel aduersus in sedili contra medicum is homo collocandus est, uel sic aduersus, ut in gremium eius caput resupinus effundat. quidam si in sinistro oculo uicium est, aduersum. si in dextro: resupinum collocari uolunt. alteram autem palpebram à ministro diduci oportet, alteram à medico: sed ab hoc: si ille aduersus est, inferiorem, si supinus: superiorem. tum idem medicus hamulum acutum paulum mucrone intus recurvato subijcere extremo ungui debet, eumque infingere, atque eam quoque palpebram tradere alteri, ipse hamulo apprehenso levare unguem, eumque acu trajicere linum trahente: deinde acum ponere: lini duo capita apprehendere, & per ea erecto ungue si qua parte oculo inhaeret manubriolo scalpelli diducere, donec ad angulum ueniat: deinde inuicem modo remittere, modo attrahere, ut sic & initium eius, & finis anguli reperiatur. duplex enim periculum est: ne uel ex ungue aliquid relinquatur, quod exulceratum uix ullam recipiat curationem, uel ex angulo quoque caruncula alscidatur, quae si uehementius unguis ducatur, sequitur. Ideoque decipit: ac si alscissa est, patescit foramen: per quod postea semper humor descendit *πύον*



πάσα græci uocant. Verus ergo anguli finis utiq; noscendus est, qui ubi satis constitit, non nimium adducto ungue scalpellus adhibendus est: deinde excidenda ea membranula, ne quid ex angulo ledatur. Eo deinde ex melle linamentum super dādum est: supraq; linteolum, & aut sponsa, aut lana succida, proximisq; diebus diducendus quotidie oculus est, ne cicatrice inter se palpebræ glutinentur. siquidem id quoq; tertium periculum accedit: eodemq; modo linamentum imponendum, ac nouissime inungendum collirio, quo ulcera ad cicatricem perducuntur. sed ea curatio uerna esse debet, aut certe ante hyemem: de qua re ad plura loca pertinente semel dixisse satis erit. nam duo genera curationum sunt. alia, in quibus eligere tempus non licet, sed utendum est eo, quod incidit, sicut in vulneribus, & in fistulis. alia in quibus nullus dies urget, & expectare tutissimum, & facile est: sicut euenit in ijs, quæ & tarde incrementum, & dolore non cruciant: in his uer expectandum est. aut si quid magis pressit, melior tamen autumnus uel æstas, quàm hyems est. atq; is ipse medius, iam frætis æstatibus, nondum ortis frigoribus. quo magis autem necessaria pars erit quæ tractabitur, hoc quoq; maiori periculo subiecta est. et sepe quo maior plaga facienda, eo magis hæc temporis ratio seruabitur.

## De enchanti tuberculo.

X curatione uero unguis, ut dixi, uicia nascuntur: quæ ipsa alijs quoq; de causis oriri solent. interdum enim fit in angulo, parum ungue exco, uel aliter tuberculum, quod palpebras parum diduci patitur, & hærtis græce nominatur. excidi hamulo, & circumcidi debet, hic quoq; diligenter temperata manu, ne quid ex ipso abscedat. tum exiguum linamentum respergendum est uel admixta, uel atramento sutorio: inq; eum angulum diductis palpebris inferendum: supraq; eodẽ modo deligandum. proximisq; diebus similiter nutriendum tantum, ut primis aqua egelida, uel etiam frigida foveatur.

## De ancyloblepharo oculorum uicio.

i Interdum inter se palpebræ coalescunt: apeririq; non potest oculus. cui malo solet etiam illud accedere, ut palpebræ cum albo oculi coherescant: scilicet cum in utroq; fuit ulcus negligenter curatum. sanescendo enim quod diduci potuit, et debuit, glutinabit: ἀγκυλοβλήφαρος sub utroq; uicio græci uocant. Palpebræ tantum inter se coheretes non difficulter diducuntur, sed interdum fru-

Aurelij Cor.

P



stra: nam rursus glutinantur. Experiri tamen oportet: quia bene res saepius cedit. igitur aduersum specillum inferendum, diducendæq; eò palpebræ sunt, deinde exigua penicilla interponenda, donec exulceratio eius loci finiatur. at ubi albo ipsius oculi palpebra inhæsit: Heraclides tarentinus auctor est, aduerso scalpello subsecare magnam cum moderatione, ut neq; ex oculo, neq; ex palpebra quicquam abscidatur. ac si necesse est, ex palpebra potius. post hæc inungatur oculus medicamentis, quibus aspritudo curatur: quotidieq; palpebra uertatur, non solum ut ulceri medicamentum inducatur, sed etiam ne rursus inhæreat, ipsiq; etiam præcipiatur, ut sæpe eā duobus digitis attollat. ego sic restitutum esse neminem memini. Meges se quoq; multa tentasse, neq; unq̃ profuisse, quia semper iterum oculo palpebra inhæserit, memoria prodit.

De ægylopa fistula oculorum.

Tiam num in angulo, qui naribus propior est, ex aliquo uicio quasi parua fistula aperitur, per quam pituita assidue defillat. αἰγύλωπα græci uocāt: idq; assidue male habet oculum: nonnunquam etiam exeso osse usq; ad nares penetrat, idq; interdum naturam carcinomatis habet. ubi intentæ uenæ & recuruatæ sunt: color pallet: cutis dura est, & leui tactu irritatur: inflātionemq; in eas partes, quæ coniunctæ sunt: euocati. ex his eos, qui quasi carcinoma habent, curare periculosum est. nam mortem quoq; ea res maturat. eos uero quibus ad nares tendit, superuacuum. neq; enim sanescunt. at quibus id in angulo est: potest adhiberi curatio, cum eo ne ignotum sit, esse difficilem: quantoq; angulo propius id foramen est, tanto difficilior est. quoniam per angustum est in quo uersari manus possit. recenti tamen remedi facilius est. sed hamulo summum eius foraminis excipiendum: deinde totum id cauum, sicut in fistulis dixi, usq; ad os excidendum, oculoq; & cæteris iunctis partibus bene obtectis, os ferramento adurendum est uehementius. quod si iam carie uexatum est, quo crassior his squama accedat, quidam adurētia imponunt, ut atramentum sutorium, uel chalcididem, uel æruginem rasam: quod & tardius & non idem facit. osse adusto curatio sequitur eadem, quæ in cæteris uestis.

De pilis palpebrarum oculum irritantibus.

Illi uero, qui in palpebris sunt duabus de causis oculum irritare consueverunt. nam modo palpebræ superioris summa cutis relaxatur et procidit. quo fit ut eius pili ad ipsum oculum con-



uertantur: quia non simul cartilago quoque se remisit. modo sub ordinatur ali pilorum alius ordo subcreſcit, qui protinus intus ad oculum tendit. curationes, hæ sunt. ſi pili nati ſunt qui non debuerunt: tenuis acus ferrea ad ſimilitudinem hæſtæ lata in ignem coniicienda eſt. deinde candens ſublata palpebra ſic, ut eius perniciſi pili in conſpectum curantis ueniant, ſub ipſis pilorum radicibus ab angulo immittenda eſt, ut ea tertiam partem palpebræ tranſueat. deinde iterum, tertioque uſque ad alterum angulum. quo fit ut omnes pilorum radices aduſtæ emoriantur. tum ſuper imponendum medicamentum eſt, quod inflammationem prohibeat. atque ubi cruſtæ exciderunt, ad cicatricem perducendum. facillime autem id genus ſaneſcit. quidam autem acui tranſiuxta pilos in exteriorē partem palpebræ oportere, eamque tranſmitti duplicem capillum muliebrem ducentem, atque ubi acus tranſiit, in ipſius capilli ſinum, qua duplicatur, pilum eſſe coniiciendum, et per eum in ſuperiorem palpebræ partem attrahendum, ibique corpori agglutinandum, et imponendum medicamentum, quo foramen quoque glutinetur. ſic enim fore ut his pilus in exteriorē partem poſtea ſpectet. id primum fieri non poteſt niſi in pilo longiore, cum ferre breues eo loco naſcantur. deinde ſi plures pili ſunt, neceſſe eſt longum tormentum: cum totiens acus tranſuet, magnam inflammationē moueat. Noniſſime cum humor aliquis ibi ſubſit, oculo et ante per pilos, et tum per palpebræ foramina affecto, uix fieri poſſit ut gluten quo uinctus eſt pilus, non reſoluatur. eoque fit ut is, eò unde ut abductus eſt: redeat ea uero curatio, quæ palpebræ laxioris ab omnibus frequentatur, nihil habet dubij. ſiquidem oportet conſpecto oculo mediam palpebræ cutem, ſiue ea ſuperior, ſiue inferior eſt: apprehendere digitis, ac leuare. tum conſiderare quantulo detracto futurum ſit, ut naturaliter ſe habeat. ſiquidem hic quoque duo pericula circumſtant. ſi nimium fuerit exaſum, ne contegi oculus non poſſit. ſi parum, ne nihil actum ſit, et fruſtra ſectus aliquis ſit. qua deinde incidendum uidebitur, per duas lineas atramento notandum eſt ſic, ut de interiorē, quæ pilos continet et propiore ei linea aliquid relinquatur, quod apprehendere acis poſtea poſſit. his conſtitutis ſcalpellus adhibendus eſt. et ſi ſuperior palpebra eſt: ante ſi inferior, poſtea propius ipſis pilis incidendum. initiumque faciendum in ſiniſtro oculo, ab eo angulo, qui tempore in dextro, ab eo qui naribus propior eſt, idque, quod inter duas lineas eſt. excidendum. deinde oræ uulneris inter ſe ſimplicia futura committenda, operiendusque oculus eſt, et ſi parum palpebra deſcendet, laxanda utique: ſi nimium, aut aſtringenda, aut etiam rurfus tenuis habennula ab ulteriore orā excidenda. ubi ſecta eſt, aliæ



## LIBER

sutura adijcienda, quæ supra tres esse non debent. Præter hæc in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiore parte ducti pili sursum spectent. idq; si levis inclinatio est, etiam solum satis tætur. inferior palpebra eo non eget. his factis spongia ex aqua frigida expressa super deliganda est. postero die glutinans emplastrum injiciendum. quarto sutura tollenda est: & collirio, quod inflammationes reprimat, superinungendum.

### De lagophthalmo oculorum.

Nonnunquam autem nimium sub hac curatione excisa cute  
n evenit ut oculus non contegatur. idq; interdum etiam alia de causa fit: *λαγόφθαλμος* græci appellant in quo si nimium palpebræ deest, nulla id restituere curatio potest. si exiguum, mideri licet: paulum infra supercilium cutis incidenda est, lunata figura cornibus eius deorsum spectantibus. altitudo esse plagæ usq; ad cartilagineam debet, ipsa illa nihil læsa. nam si ea incisa est, palpebra concidit: neq; attolli postea potest. cute igitur tantum ducta sit, ut paulum intra oculi ora descendat: hiantem scilicet super plagam, in quam linamentum coniiciendum est: quod & coniungi ductam cutem prohibeat: & in medio carunculam ciet: quæ ubi eum locum implevit, postea recte oculus operitur.

### De ectropio.

Superioris autem palpebræ vitium est, quod parum descendit, ideoq; oculus non contegitur: sic inferioris, quod parum sursum attollitur, sed pendet, & hiat, neq; potest cum superiore committi. atq; id quoq; evenit interdum ex simili vitio curationis, interdum etiam senectute: *ἐκτροπίον* græci vocant. si ex mala curatione est, eadem ratio medicinæ est, quæ supra posita est: plagæ tantum cornua ad maxillas non ad oculum convertenda sunt. si ex senectute est, tenui ferramento id totum extrinsecus adurendum est, deinde melle inungendum. at quarto die uapore aquæ calidæ fovendum, inungendumq; medicamentis ad cicatricem perducentibus.

### De staphylomate oculi.

h Aec ferè circa oculum in angulis, palpebræq; incidere consuerunt. in ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica siue ruptis intus membranis aliquibus, siue laxatis, & si-



milis figura acino fit. unde id  $\sigma\epsilon\pi\upsilon\lambda\omicron\mu\alpha$  græci uocant. curatio duplex est. altera ad ipsas radices per medium transuere, ac duo linea ducente. deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius ex inferiore astringere inter se: quæ paulatim secundo id excidunt. altera in summa parte eius ad lenticulæ magnitudinem excidere: deinde spodium, aut cadmiæ infriatre. utrolibet autem facto album oui lana excipiendum & imponendum, posteaq; uapore aquæ calidæ fouendus oculus, & lenibus medicamentis unguendus est.

## De clauis oculorum.

Clauis autem uocantur, callosa in albo oculi tubercula, quibus nomen à figuræ similitudine est. hos ad imam radicem perforare ac commodissimum est, infraq; eam excidere, deinde lenibus medicamentis inungere.

## De natura oculorum, &amp; eorum suffusione.

Suffusionis iam aliàs feci mentionem, quia cum recens indidit, medicamentis quoq; sæpe discutitur: sed ubi uetustior facta est, manus curationem desiderat, quæ inter subtilissimas haberi potest. de qua antequam dico, paucis ipsius oculi natura indicanda est. cuius cognitio cum ad plura loca pertineat, tum uel præcipue ad hunc pertinet. is igitur summas habet duas tunicas: ex quibus superior à græcis  $\kappa\epsilon\pi\alpha\tau\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$  uocatur. ea, qua parte alba est satis crassa: pupillæ loco extenuatur. huic interior adiuncta est media parte: qua pupilla est: modico foramine concava, circa tenas ulteriores partibus ipsa quoq; plenior. quæ  $\chi\omicron\phi\omicron\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$  à græcis nominatur. hæ duæ tunice cum interiora oculi cingant: rursus sub his coeunt: extenuataq; & in unum coactæ per foramen quod inter ossa est: ad mēbra nam cerebri perueniunt, eoq; inhaerescunt. sub his autem, qua parte pupilla est, locus nactus est. deinde infra rursus tenuissima tunica quam Herophilus  $\alpha\pi\alpha\chi\omicron\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$  nominauit. Ea media subsidit, eoq; continuo continet quiddam, quod à uitri similitudine  $\upsilon\alpha\lambda\omicron\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$  græci uocant. id neq; liquidum, neq; aridum est: sed quasi concretus humor, ex cuius colore pupillæ color uel niger est, uel cæsius, cum summa tunica tota alba sit. Id autem superueniens ab interiore parte membranis la includit sub his gutta humoris est oui albo similis, à qua uidendi facultas proficiat,  $\kappa\upsilon\varsigma\alpha\lambda\lambda\omicron\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$  à græcis nominatur. igitur uel ex morbo, uel ex ictu concreuit humor sub duabus tunicis, qua locum nactus esse proposui: isq; paulatim indurefcens interiori potentie se opponit. uicijq; eius plures species sunt: quædam sanabiles: quædam

Aurelij Cor.

p ij



quæ curationem non admittunt. nam si exigua suffusio est, si immobilis: colorem uero habet marinæ aquæ, uel ferri nitentis, & à latere sensum aliquem fulgoris relinquit spes super est. si magna est, si nigra pars oculi amissa naturali figura in aliam uertit, si suffusioni color ceruleus est, aut auro similis, si labat, & hac, atq; illac mouetur, uix unquam succurritur. ferè uero peior est: quo ex grauiore morbo, maioribus uel capitis doloribus, uel ictu uehementiore orta est. neq; idonea curatio, si senilis ætas est, quæ sine nouo uicio tamen acie hebetem habet. at ne puerilis quidem, sed inter hæc media ætas. oculus quoq; curationi neq; exiguus, neq; conatus, satis oportunus est, atq; ipsius suffusionis quædam maturitas est. expectandum igitur est donec iam non fluere, sed durities quædam concreuisse uideatur. ante curationem autem modico cibo uti, bibere aquam triduo debet: pridie ab omnibus abstinere. post hæc in aduerso sedili collocandus est loco lucido, lumine aduerso sic: ut contra medicus paulo altius sede at. à posteriore autem parte caput eius, qui curabitur, minister continet, & immobile id præstet. nam leui motu eripi acies in perpetuum potest. quin etiam ipse oculus qui curabitur: immobilior faciendus est, super alterum lana imposita & deligata. curari uero sinister oculus dextra manu, dexter sinistra debet. tum acus admouenda est, aut acuta, aut forte non nimium tenuis, eaq; demittenda: sed recta est per summam duas tunicas medio loco inter nigrum oculi, & angulum temporis propiorem è regione mediæ suffusionis, sic ne qua uena lædatur. neque tamen timide demittenda est, quia inani loco excipitur, ad quem cum uentum est, ne mediocriter quidem peritus falli potest: quia prementi nihil renititur. ubi eò uentum est, inclinanda acus ad ipsam suffusionem est, leuiterq; ibi uerti, & paulatim eà deducere infra regionem pupillæ debet. ubi deinde eam transit, uehementius imprimi, ut inferiori parti insadat. si hæsit, curatio expleta est. si subinde redit, eadē acu magis conadenda, & in plures partes dissipanda est: quæ singulæ & facilius conduntur, & manus late efficiunt. post hæc educenda acus recta est, imponendumq; est lana molli exceptum oui album, & supra: quod inflammationem coerceat: atque ita deuinciendum. post hæc opus est quiete, abstinentia, lenium medicamentorum inunctionibus, cibo, qui postero die satis mature datur, primum liquido, ne maxillæ laborent, deinde inflammatione finita tali, qualis in uulneribus propositus est. quibus, ut aqua quoq; diutius bibant, necessario accedit.



**d** E pituita quoque tenuis cursu, qui oculos infestat, quatenus medicamentis agendum est, iam explicui. nunc ad ea ueniam: quae curationem ex manu postulant. animaduertimus autem quibusdam nunquam siccescere oculos, sed semper humore tenui madere, quae res asperitudinem continuat, ex leuibus momentis inflammationes et lippitudines excitat, totam denique uitam hominis infestat. idque in quibusdam nulla ope adiunari potest, in quibusdam sanabile est. quod primum discrimen est nosse oportet, ut alteri succurratur, alteri manus non iniiciatur. ac primum supernacra curatio est in his, qui ab infantibus id uicium habent, quia necessario marsum est usque ad mortis diem: deinde non necessario etiam in his, quibus non multa, sed acris pituita est. siquidem manu nihil adiunatur. medicamentis et uictus ratione, quae crassio rem pituitam reddit, ad sanitatem perueniunt. lata etiam capita uix medicinae patent. tum intere uenae pituitam emittant: quae inter caluariam et cutem sunt, an quae inter membranam cerebri et caluariam. superiores ferè per tempora oculos rigant: inferiores per eas membranas, quae ab oculis ad cerebrum tendunt. potest autem adhiberi remedium his: quae supra os fluunt, non potest his, quae sub osse. ac ne his quidem succurritur, quibus pituita utrinque descendit. quia lenata altera parte nihilominus altera infestat. quid sit autem hoc ratione cognoscitur. raso capite ea medicamenta, quibus in lippitudine pituita suspèditur, à super alijs usque ad uerticem illini debent. si sicut oculi esse coeperunt, apparet per eas uenas, quae sub cute sunt, irrigari. si nihilominus madent, manifestum est sub osse descendere. si est humor, sed leuior, duplex uicium est. plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur: quos superiores uenae exerceant, ideoque pluribus etiam opitulari licet. idque non in graecia tantummodo, sed in alijs quoque gentibus celebre est, adeo ut nulla medicinae pars magis per nationes quoque exposita sit. reperi in graecia sunt qui nouem lineis cutem capitis inciderent, duabus in occipitio rectis: una super eas transuersa, deinde duabus super aures, una inter eas item transuersa, tribus inter uerticem et frontem rectis. reperi sunt qui à capite recte eas lineas ad tempora diducerent: cognitisque ex motu maxillarum musculorum inijs, leuiter super eos cutem inciderent. inductisque per retusos hamos oris infererent linamenta, ut neque inter se cutis antiqui fines committerentur, et in medio atro incretceret, quae uenas ex quibus humor ad oculos transiret, astringeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt à



media aure ad mediam alteram aurem: deinde à naribus ad uerticem. tum ubi lineæ committebantur, scalpello inciderunt, & post sanguine fuso os ibidem adusserunt. nihilominus autem: et in temporibus & inter frontem atq; caluariam eminentibus uenis idem candens ferrum admovent. frequens curatio est uenas in temporibus adurere, quæ ferè quidem in eiusmodi malo tument, sed tamen ut inflentur, magisq; se ostendant. cervice ante modice deliganda est, tenuibusq; ferramentis & reclusis uenæ adurendæ, donec in oculis pituitæ cursus conquiescat. id enim signum est quasi ex cæcatorum itinerum per quæ humor ferebatur. ualentior tamen medicina est: ubi tenues conditæq; uenæ, ideoq; legi non possunt. eodem modo cervice deligata: retentoq; ab ipso spiritu, quo magis uenæ prodeant: atramento notare eas contra tempora et inter uerticem ac frontem: deinde cervice resoluta quæ notæ sunt uenas incidere & sanguinem mittere. ubi satis fluxit, tenuibus ferramentis adurere. contra tempora quidem timide, ne subiecti muscoli, qui maxillas tenent, sentiant: inter frontem uero et uerticem, uehementer, ut sic squama ab osse recedat. efficacior tamè etiam num est asporum curatio, qui uerticem usq; ad os adurunt sic, ut squamam remittat. sed nihil melius est quàm quod in gallia quoq; comata fit. ubi uenas in temporibus et in superiore capitis parte legunt. adusta quomodo curanda sint iam explicui. nunc illud adijcio, neq; ut crustæ decidant: neq; ut ulcus impleatur adustis uenis esse properandum. ne uel sanguis erumpat, uel cito pus supprimatur, cum per hoc scitescere eas partes opus sit: per illud exhauriri opus non sit. si quando tamen sanguis eruperit, infricanda medicamenta esse, quæ sic sanguinem supprimant, ne adurant. quemadmodum autem uenæ deligendæ sint: quidq; lectis his faciendum sit, cum uenero ad crurum uarices dicam.

De aurium morbis, qui manu & scalpello curantur. Cap. VIII.

¶ Erum ut oculi multiplicem curationem etiam manus exigunt: sic in auribus admodum pauca sunt: quæ in hac medicinæ parte tractentur. solet tamen euenire uel à primo natali die protinus, uel postea facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, ut foramen in ea nullum sit, ideoq; audiendi usque careat. quod ubi incidit: specillo tentandum est, alte ne id repletum, an in summo tantum glutinatum sit. nam si alte est: prementi non cedit. si in summo, specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet, ne sine effectus spe distentio oriatur neruorum, & ex ea mortis periculum sit. hoc facile curatur. nam quæ cauum esse debet, uel medicamen

tum



tum aliquod imponendum est ex adurentibus, uel candente ferro aper-  
riendum, uel etiam scalpello incidendum. cumq; id patefactum, &  
iam ulcus purum est: coniicienda eo pinna est illita medicamento cicat-  
ricem inducente, circaq; idem medicamentum dandum, ut cutis circa  
pinnam sanescat: quo fit ut ea remota postea facultas audiendi sit: at  
ubi aures in uiro putæ perforatæ sunt, & offendunt, traicere id ca-  
uū celeriter candente acu satis est, ut leniter eius ora exulcerentur, aut  
etiam adurentem medicamentum idem exulcerare: postea deinde impo-  
nere id quod purget, tum quod eum locum repleat, & sic cicatricem  
inducat. quod si magnū id foramen est, si cut solet esse in his, qui maio-  
ra pondera auribus gesserunt: incidere quod superest ad extremum  
oportet, supra deinde oras scalpello exulcerare, & postea suere, ac  
medicamentum, quo id glutinetur, imponere. tertium est: si quid ibi  
curti est, sarcire. quæ res cum in labris quoq; & naribus fieri pos-  
sit: eandem autem rationem habeat, simul explicanda est.

*Curta in auribus, labrisq; ac naribus, quomodo sarciri &  
curari possint. Cap. IX.*

Uita igitur in his tribus, ac si qua parua parua sunt: cura-  
ri possunt: si qua maiora sunt, aut non recipiunt curationem  
aut ita per hanc ipsam deformantur, ut minus indecora  
ante fuerint. atq; in aure quidem & naribus deformitas sola time-  
ri potest. in labris uero si nimium contracta sunt, usus quoq; necessa-  
rius iactura fit. quia minus facile & cibis assumitur, & sermo expli-  
catur. neq; enim creatur ibi corpus: sed ex uicino adducitur: quod in  
leui mutatione & nihil eripere, & fallere oculum potest: in magna  
non potest: neq; senile autem corpus, neq; quod mali habitus est, neq;  
in quo difficulter ulcera sanescunt, huic medicinæ idoneum est: quia  
nusquam celerius cancer occupat, aut difficilius tollitur. ratio curatio-  
nis eiusmodi est. id quod curatum est in quadratum redigere. ab in-  
terioribus eius angulis lineas transuersas incidere, quæ ceteriore par-  
tem ab ulteriore ex toto diducant: deinde ea quæ sic resoluimus, in  
unum adducere: si nō satis iunguntur, ultra lineas, quas ante fecimus,  
alias duas lunatas, & ad plagam conuersas immittere, quibus sum-  
ma tantum cutis diducatur. sic enim fit ut facilius quod adducitur, se-  
qui possit: quod non ui cogendum est, sed ita adducendum, ut ex facili  
subsequatur, & demissum non multum recedat. interdum autem ab  
altera parte cutis haud omnino adducta, deformem quem reliquit lo-  
cum: reddit. Huiusmodi loci altera pars incidenda, altera intacta ha-



## LIBER

benda est. ergo neq; ex imis auribus, neq; ex medio naso imis uenarum partibus, neq; ex angulis labrorum quicquam attrahere tentabimus. utrinq; autem petemus: si quid summis auribus, si quid imis, si quid aut medio naso, aut medijs naribus, aut medijs labris deierit. quæ tamen interdum etiam duobus locis curata esse consuerunt. sed eadem ratio curandi est. si cartilago in eo quod incisum est, eminet: excidenda est. neque enim aut glutinatur, aut acutototrajatur. neq; longe tamen excidi debet: ne inter duas oras liberæ cutis, utrinq; coitus puris fieri possit. tum iunctæ oræ inter se suendæ sunt utrinq; ante apprehensa, et qua priores lineæ sunt: ea quoq; suturæ iniiciendæ sunt. sicutis locis, ut in naribus, illita spuma argenti satis proficit. in ultiores uero lunatasq; plagas linamentum dandum est, ut caro increpescens uulnus impleat, summaq; cura quod ita sutum est, tuedum esse apparere ex eo potest, quod de cancro supra posui. ergo etiam tertio quoq; die fouendum erit uapore aquæ calidæ: rursusq; idem medicamentum iniiciendum, fereq; septimo die glutinatum est. tum suturæ eximi, et ulcus ad sanitatem perducendum debent.

## De polypi curatione per ferrum. Cap. X.

**P**olyptum uero, qui in naribus nascitur, præcipue ferro curari iam alias posui. ergo etiam hunc ferramento acuto in modum spathe factæ resolueri ab osse oportet adhibita diligentia, ne infra cartilago lædatur, in qua difficilis curatio est. ubi abscissus est, uno ferramento extrahendus est. tum implicitum linamentum, uel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis suppressitur: eoq; nares leniter implendæ. sanguine suppresso, linamento ulculum purgandum est. ubi purum est, eo pinna eodem modo quo in aure supra positum est, medicamento illita, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat.

## De ozæna. Cap. XI.

**I**dem uerum, quod ὀζæνα à græcis uocatur, si medicamentis non cederet, quemadmodum manus curandum esset, apud magnos chirurgos non reperi. Credo quia res raro ad sanitatem satis proficit: cum aliquod in ipsa curatione tormentum habeat. apud quosdam tamē positum est uel sutilem fistulam, uel eodem scriptorium calamus in narem esse coniiciendum, donec sursum ad os perueniat: tum per id tenue ferramentum candens dandum



esse ad ipsum os: deinde adustum locum purgandum esse ærugine & melle. ubi purus est: lyctio ad sanitatem perducendum. uel narem incidendam esse ab ima parte ad os, ut & conspici locus possit, & facilius candens ferramentum admoeri. tum sui narem debere, & adustum quidem ulcus eadem ratione curari. suturam uero illini uel spuma argenti uel alio glutinante.

De ore uicijs, quæ manu & ferro curantur.

Cap. XII.

De dentibus.

N ore quoque quædam manu curantur. ubi in primis dentes nonnunquam mouentur, modo propter radicem imbecillitatem, modo propter gingivarum arescentium uiciū. oportet in utrolibet candens ferramentū gingiuis admoeri, ut leuiter attingat, non ut insadat. adustæ ginguæ melle illinendæ, & mulso eluendæ sunt. ut pura ulcera esse ceperunt, arida medicamēta infricanda sunt ex his quæ reprimunt. si uero dens dolores mouet, eximique eum, quia medicamēta nihil adiuvant, placuit, circumradi debet, ut gingua ab eo resoluiatur. tum is concutiendus est. eaque facienda donec bene moueatur. nam dens hærens cum summo periculo euellitur, ac nonnunquam maxilla loco mouetur. idque etiam maiore periculo in superioribus dentibus fit, quia potest tempora oculis uel cōcutere. tum si fieri potest manu, si minus, forfice dens excipiendus. ac si exesus est, ante id foramen, uel linamento, uel bene accommodato plumbo replendum est ne sub forfice confringatur: recta uero forfex ducenda est, ne inflexis radicibus: os earū, cui dens inhaeret, parte aliqua frangatur. neque ideo nullum eius rei periculum est, utique in dentibus breuibus, qui ferè longiores radices, habent. sæpe enim forfex cum dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehendat, os ginguæprehendit & frangit. protinus autem ubi plus sanguinis profluit, scire licet aliquid ex osse fractum esse. ergo specillo conquirenda est testa, quæ recessit & uolsella protrahenda est. si non sequitur, inadi gingua debet, donec labans ossis testa recipiatur. quod si fractum statim non est, indurescat extrinsecus maxilla, ut is hiare non possit. sed imponendū aliud ex farina et fisco cataplasma est, donec ibi pus moueatur. tum incidi gingua debet. pus quoque multum profluens ossis fracti nota est. itaque etiam tum id extrahi conuenit. nonnunquam etiam eo leso, fistula fit quæ eradi debet. Dens autem scaber, qua parte niger est, radēdus est, illinendusque rose flore contrito, cui galle quarta pars & altera myrrhæ sit adiecta. continendumque ore crebro uinum meracum. atque



in eo casu uelandum caput, ambulatione multa, frictione capitis: cibo non acri utendum est. at si ex ictu uel alio casu aliqui labant dentes, auro cum his, qui bene haerent, uinciendi sunt. continendaq; ore reprimenda, ut uinum in quo malicorium decoctum, aut in quo galla candens coniecta sit. Si quando etiam in pueris alter dens nascitur, quam prior excidat, is qui cadere debuit circum purgandus, & euellendus est. is qui natus est in locum prioris quotidie digito adurgendus, donec ad iustam magnitudinem perueniat. quotienscunq; dente excepto radix relicta est, protinus ea quoq; ad id facta forfice, quam p' /<sup>3</sup> ar graeci uocant: eximenda est. Tonsillas autem quae post inflammationes induruerunt: arthrides autem graecis appellantur: cum sub leuitunica sint, oportet digito circum radere & euellere: si ne sic qdem resoluntur, hamulo excipere, & scalpello excidere: tum ulcus aceto eluere, & illinere uulnus medicamento, quo sanguis supprimatur.

## De uia.

Va si cum inflammatione descendit, doloriq; est, & subrubicundi coloris: praecidi sine periculo non potest. solet enim multum sanguinem effundere. itaq; melius est his uti, quae alias proposita sunt. si uero inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra iustum modum a pituita deducta est, & est tenuis, acuta, alba, praecidi debet. itemq; si ima, liuida & crassa, summa, tenuis est. neq; quicquam commodius est quam uolsella prehendere, sub eaq; quod uolumus, excidere. neq; enim ullum periculum est, ne plus minusue praecidatur: cum liceat tantum infra uolsellam relinquere: quantum inutile esse manifestum est: idq; praecidere quo longior uia est, quam esse naturaliter debet. post curationem eadem facienda sunt, quae in tonsillis proxime posui.

## De lingua.

Inguis uero quibusdam cum subiecta parte a primo natali die iuncta est, qui ob id ne loqui quidem possunt. horum extrema lingua uolsella prehenda est, sub eaq; membrana incidenda magna cura habita, ne uenae quae iuxta sunt: uolentur, et profusione sanguinis noceant. reliqua curatio uulneris in prioribus posita est: & pleriq; quidem, ubi consanuerunt, loquuntur. ego autem cognoui qui sucisa lingua, cum abunde super dentes eam promerret, non tamen loquendi facultatem consecutus est. adeo in medicina etiam ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est id, quod sequi conuenit.



**S**ub lingua quoque interdum aliquid abscedit, quod ferè consistit in tunica: doloresque magnos mouet. quod si exiguum est, incidi semel satis est: si maius, summa cutis usque ad tunicam excidenda est: deinde utrinque orae hanculus excipiendae, et tunica undique circumdata liberanda est, magna diligentia per omnem considerationem habita, ne qua maior uena incidatur.

De labris.

**I**bra autem saepe finduntur, eaque res habet cum dolore etiam hanc molestiam, quod sermo prohibetur: qui subinde eas rimas cum dolore diducendo sanguinem citat: sed has, si in summo sunt, medicamentis curare comodius est, quae ad ulcera oris fiunt. si uero altius descenderunt, necessariū est tenui ferramento adurere: quod spatula simile quasi transcurrere, non imprimi debet. postea facienda eadem sunt, quae in auribus adusis exposita sunt.

De cernicis uicijs, et curatione. Cap. XIII.

**I**n cernice inter cutem, et asperam arteriam tumor incre-  
**a**scit: ῥοχοίαν graeci uocant. quo modo atro hebes, modo humor aliquis melli, aquae uel similis includitur: interdum etiam minutis ossibus pili immixti, ex quibus quicquid est quod tunica continetur, potest adurentibus medicamentis curari, quibus summa cutis cum superiecta tunica exæditur. quo facto siue humor est, profluit: siue quid densius, deinde digitis educatur: tum ulcus sub linamentis sanescit: sed scalpelli curatio breuior est. Medio tumore una linea inciditur usque ad tunicam: deinde uiciosus sinus ab integro corpore digito separatur: totusque cum uelamento suo eximitur. tum aceto, cui uel sale, uel nitrum aliquis adiecit, eluitur. oraeque una sutura iunguntur: caeteraque eadem quae in alijs futuris super injiciuntur. Leniter deinde, ne fauces urgeat, deligatur. si quando autem tunica eximi non potuerit, intus inspergenda adurentia: linamentisque id curandum est caeteris praeuentibus.

De umbilici uicijs. Cap. XIII.

**S**unt etiam circa umbilicum plura uicia, de quibus propter raritatem inter auctores parum constat. uerisimile est autem id a quoque praetermissum, quod ipse non cognouerit: a nullo, id quod



non uiderat, fictum commune omnibus est, umbilicum indecore promerere. causae requiruntur. meges tres has posuit. modo intestinum eò irumpere. modo omentum. modo humorem. Sostratus nihil de omento dixit. duobus hisdem adiecit, carnem ibi interdum increescere, eamq; modo integram esse, modo carcinomati similem. Gorgias ipse quoque omenti mentionem omisit. sed eadem tria causatus spiritum quoq; interdum eò dixit irumpere. Heron omnibus his quatuor positis, & omenti mentionem habuit, & eius quod simul & omentum & intestinum habuerit. quid autem horum sit, his indicijs cognoscitur. ubi intestinum prolapsum est, tumor neque durus neque mollis est omni frigore comminuitur, non solum sub omni calore, sed etiam retento spiritu crescit. sonat interdum, atq; ubi resupinatus est aliquis delapso intestino ipse desedit. ubi uero omentum est, cetera similia sunt, tumor mollior & ab una parte latus extenuatum in uentrem est. si quis apprehendit, elabatur. ubi utrunque est, inditia quoque mixta sunt, & inter utrunque mollities. at caro durior est, semperq; etiam resupinato corpore tumet, prementiq; non cedit, prioribus facile cedentibus. si uiciosa est easdem notas habet, quas in carcinomate exposui. humor autem si premitur, circumfluit. at spiritus pressus cedit, sed protinus redit resupinato quoq; corpore tumorem in eadem figura tenet. ex his id quod ex spiritu uicium est, medicinam non admittit. caro quoq; carcinomati similis cum periculo tractatur. itaq; omittenda est. sana excidi debet, idq; uulnus linamentis curari. humorem quidam uel inciso summo tumore effundunt, & uulnus hisdem linamentis curant. in reliquis uariae sententiae sunt. ac resupinandum quidem corpus esse res ipsa testatur, ut in uterum, siue intestinum, siue omentum est, delabatur. sinus uero umbilici tum uacuus à quibusdam duabus regulis exceptus est, uehementerq; earum capitibus deligatis ibi emoriatur. à quibusdam id uicium acu traiecitatur duo lina ducente. deinde utriusq; lini duobus capitibus diuersae partes astringuntur. quod in una quoq; oculi fit. nam sic id quod supra uinculum est, moritur. adiecerunt quidam, ut antequam uincirent: summum una linea incidere, exciderentq; quo facilius digito demisso, quod illuc irrupisset, depellerent. tum deinde uinxerunt. sed abunde est, iubere spiritum continere, ut tumor quantus maximus esse potest, se ostendat. tum imam basim eius atramento notare, resupinatoq; homine, digitis tumorem cum premere, ut si quid delapsum non est: manu cogatur. post haec umbilicum attrahere, & qua nota atramenti est lino uehementer astringere. deinde partem superiorem aut medicamentis aut ferro adurere donec emoriatur. atq; ut cetera uista uicium nutri-



re: idq; non solum ubi intestinum uel omentum, uel utrumque est, sed etiam ubi humor est: optime proficit: sed ante quædam uisenda sunt, ne quod ex uinculo periculum sit. nam curationi neque infans, neque aut robustus annis, aut senex aptus est, sed à septimo ferè anno ad quartumdecimum. deinde ei corpus idoneum est id, quod integrum est. at quod mali habitus est, quodq; papulas, impetigines, similiaq; habet idoneum non est. leuibus quoq; tumoribus facile subuenitur. at in eorum, qui nimis magni sunt, curatione periculum est. Tempus autem anni & autumnale & hibernum uitandum est. uer idoneum maxime est. ac prima æstas non aliena est. præter hæc abstinere pri die debet. neq; id satis est. sed alius quoq; ei ducenda est, quo facilius omnia quæ excesserunt, intra aluum considant.

Quomodo aqua hydropicis emittatur.  
Caput quintumdecimum.

Quam his qui hydropici sunt emitti oportere alijs dixi. a nunc quemadmodum id fiat dicendum est. quidam autem sub umbilico ferè quattuor interpositis digitis à sinistra parte. Quidam ipso umbilico perforato facere consueverunt. quidam cute primum adusta, deinde interiore abdomine inciso. quia quod per ignem diuisum est, minus celeriter coit. ferramentum autem demittitur: magna cura habita ne qua uena inadatur. id tale esse debet, ut ferè tertiam digiti partem latitudo mucronis impleat. demittendumq; ita est: ut membranam quoque transeat: qua cæro ab interiore parte finitur: eò tum plumbea aut ænea fistula coniicienda est, uel recuruatis in exteriorem partem labris, uel in media circum surgente, quadā mora ne tota intus delabi possit. huius ea pars quæ intra paulo longior esse debet, quàm quæ extra, ut ultra ulteriorem membranam procedat, per hanc effundendus humor est. atq; ubi maior pars eius euocata est, cludenda demisso linteolo fistula est, & in uulnere, si id uisum non est: relinquenda. deinde per insequentes dies circa singulas heminas emittendum, donec nullum aquæ uestigium appareat. quidam tamen etiam non uisita cute protinus fistulam recipiunt, & super uulnus spongiam expressam deligant. deinde postero die rursus fistulam demittunt: quod recens uulnus paulum ductum patitur, ut si quid humoris superest, emittatur: idq; bis ita fuisse contenti sunt.



n Onnunquam autem uenter ictu aliquo perforatur: sequi-  
 turq; ut intestina euoluantur. quod ubi incidit, protinus con-  
 siderandum est, an integra ea sint, deinde an his color suus  
 maneat. si tenuius intestinum perforatum est, nihil profici posse iam  
 retuli. latius intestinum sui potest, non quod certa fiducia sit, sed quod  
 dubia spes, certa desperatione si potior. interdum enim glutinatur. tū  
 se utrumlibet intestinum liuidum, aut pallidum, aut nigrum est, qui-  
 bus illud quoq; necessario accedit, ut sensu careat: medicina omnis ina-  
 nis est. si uero adhuc ea sui coloris sunt, cum magna festinatione suc-  
 currendum est. Momento enim alienantur externo, & insueto spirita  
 circumdata. Resupinandus autem homo est coxis erectioribus. & si  
 angustus uulnus est, quam ut intestina commode refundantur, inci-  
 dendum est donec satis pateat. Ac si iam scitiora intestina sunt, perlu-  
 enda aqua sunt: cui paulum admodum olei sit adiectum. tum mini-  
 ster oras uulneris leuiter diducere manibus suis, uel etiam duobus  
 hamis membranæ interiori iniectis debet. medicus priora semper in-  
 testina quæ posteriora prolapsa sunt, condere sic, ut orbium singulorū  
 locum seruet: repositis omnibus, leuiter homo concutiendus est. quo fit  
 ut per se singula intestina in suas sedes diducantur: & inibi considāt.  
 his conditis omentum quoq; considerandum est: ex quo si quid iam  
 nigri, & emortui est, forficæ excidi debet. si quid integrum est, leuiter  
 super intestina diduci. futura autem neq; summæ cutis, neq; interioris  
 membranæ per se satis proficit, sed utriusq;. & quidem duobus linis  
 uincienda est spissior quam alibi, quia & rumpi facilius motu uen-  
 tris potest, & non æque magnis inflammationibus pars ea exposita  
 est. igitur in duas acus fila coniicienda, eaq; duabus manibus tenenda:  
 & prius interiori membranæ futura iniicienda est sic, ut sinistra  
 manus in dexteriore ora, dextra in sinisteriore à principio uulne-  
 ris orsa, ab interiori parte in exteriorem aciem immittat. quo fit, ut  
 ab intestinis ea pars semper aciem longe sit, quæ retusa est: semel  
 utraq; parte traiecta permutandæ acus inter manus sunt, ut ea sit in  
 dextra, quæ fuit in sinistra: ea ueniat in sinistram, quam dextra con-  
 tinuit. iterumq; eodem modo per oras immittendæ sunt. Atq; ita ter-  
 tio, et quarto: deinæpsq; permutatis inter manus acibus includenda  
 plaga. post hæc eadem fila, eademq; acus ad cutem transferendæ.  
 similiq; ratione ei quoq; parti utraq; futura iniicienda semper ab in-  
 teriore parte acibus uenientibus semper inter manus traiectis. dein  
 glutinantia iniicienda, quibus aut spongiam, aut succidam lanam ex  
 aceto



aceto impressam accedere debere manifestus est, quàm ut semper dicendum sit. *impositis his leuiter deligari uenter debet.*

De interiore parte abdominis rupta, et qua ratione curanda sit. Cap. XVII.

*N*terdum tamen uel ex ictu aliquo, uel retento diutius spiritu, uel sub graui fasce interior abdominis membrana superiore cute integra rumpitur. quod foeminis quoque ex utero saepe euenire consuevit, sitque praecipue circa ilia. sequitur autem cum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisque intentaculis indecore intumescat. atque id quoque aliter ab alijs curatur. quidam enim per acum duobus lineis ad imam basim immisissis, sic utrinque deuinciunt, quemadmodum et in umbilico, et in uina positum est, ut quicquid super uinculum est, emoriatur. quidam medium tumorem excidunt ad similitudinem myrtacei folij. quod semper eodem modo seruandum esse iam posui, et tum oras sutura iungunt. commodissimum est autem resupinato corpore, experiri manu qua parte is tumor maxime cedat: quia necesse est ea parte rupta membrana sit, quaeque integra est, ea magis obnitatur. tum qua rupta uidebitur, immittendae scalpello duae lineae sunt: ut exciso medio interior membrana utrinque recentem plagam habeat. quia quod uetus est: sutura non coit loco patefacto. si qua parte membrana non nouam plagam, sed ueterem habet: tenuis excidenda habena est, quae tantum ora eius exulceret. cetera, quae ad suturae reliquam curationem pertinent, supra comprehensa sunt.

De uaricibus uentris.

*P*raeter haec euenit, ut in quorundam uentribus uarices sint, quarum, quia nulla alia curatio est: quàm quae in cruribus esse consuevit, tum eam partem explanaturus hanc quoque ediffero.

De testiculorum natura, et morbis eorum. Cap. XVIII.

*E*nio autem ad ea: quae in naturalibus partibus circa testiculos oriri solent: quae quo facilius explicem, prius ipsius loci natura paucis proponenda est. igitur testiculi simile quiddam medullis habent. nam sanguinem non emittunt, et omni sensu carent. dolent autem in ictibus et inflammationibus tunicae, quibus hi continentur. dependent uero ab inguinibus per singulos nervos quos *νεμωσι* per graeci nominant: cum quorum utroque binae descendunt

Aurelij Cor.

9



& uenae, & arteriae. haec autem tunica continguntur tenui, nervosa, si-  
 ne sanguine alba, quae iuxta poeidiis a graecis nominatur. super ea ua-  
 lentior tunica est: quae interiori uehementer in a parte inheret, & p-  
 tot graeci uocant. Multae deinde membranulae uenas et arterias, eosque  
 nervos comprehendunt: atque inter duas quoque tunicas superioribus par-  
 tibus leues, paruulaeque sunt. haecenus propria utriusque testiculo & ue-  
 lamenta, & auxilia sunt. communis deinde utriusque, omnibusque interio-  
 ribus sinus est, qui iam conspicitur a nobis, & xēor graeci, scrotum no-  
 stri uocant, isque ab in a parte medijs tunicis leuiter innexus est, a supe-  
 riore tantum circumdatus est. sub hoc igitur plura uicia esse consue-  
 runt. quae modo ruptis tunicis, quas ab inguinibus incipere proposui,  
 modo his integris fiunt. siquidem interdum uel ex morbo primum  
 inflammatur, deinde postea pondere abrupitur. uel ex ictu aliquo  
 protinus rumpitur tunica, quae diducere ab inferioribus partibus in-  
 testina debuit. tum pondere eo deuoluitur, aut omentum, aut etiam in-  
 testinum. atque ibi reperta uia, paulatim, aut ab inguinibus inferiores  
 quoque partes nisum subinde nervosas tunicas, & ob id eius rei patien-  
 tes diducit ἐντερονόλην, & ἐπιπλοκοίλην graeci uocant, apud nos in-  
 decorum, sed commune his herniae nomen est. deinde si descendit omē-  
 tum, nunquam in scroto tumor tollitur. siue in media fuit, siue corpus huc il-  
 luc uel conuersum, aut aliquo modo colloatum. itemque si retentus est spi-  
 ritus, non magnopere increscit. tactu uero inaequalis est, & mollis, et  
 lubricus. at si intestinum quoque descendit, humor his sine inflamma-  
 tione modo minuitur, modo increscit. estque ferè sine dolore, & cum  
 conquiescit aliquis aut iacet, interdum ex toto desinit, interdum sic di-  
 uiditur, ut in scroto exiguae reliquiae maneant. at si clamore & facie-  
 tate, & si sub aliquo pondere is homo nixus est, crescit: frigore omni  
 contrahitur: calore diffunditur. estque tum scrotum, & rotundum, &  
 tactu leue: idque quod subest: lubricum est, si pressum est, ad inguen re-  
 uertitur, demissumque iterum cum quodam quasi murmure deuoluitur.  
 & id quidem in leuioribus malis euenit. nonnunquam autem stercore  
 accepto nascus, tumet, retroque compelli non potest: affertque tum dolore,  
 & scroto, & inguinibus, & abdomini: nonnunquam stomachus quoque  
 affectus, primum ruffam bilem per os reddit, deinde uiridem, qui-  
 busdam etiam nigram. integris uero membranis interdum eam par-  
 tem humor distringit. atque eius quoque species duae sunt: nam uel inter  
 tunicas is increscit, uel in membranis quae ibi circumuenas & arteri-  
 as sunt, ubi haec grauitate oculauerunt. ac ne ei quidem humori, qui  
 inter tunicas est, una sedes est. nam modo inter summam et mediam,  
 modo inter mediam & imam consistit: graeci communi nomine quic-



quid est ὁ ὄγκος ἰσχυρὸς appellant. nostri ut scilicet nullis discriminibus satis cognitis, hæc quoque sub eodem nomine, quo priora habent signa autem quædam communia sunt, quædam propria communia quibus humor apprehenditur. propria: quibus locis humorem subesse dicimus. si tumor est nunquam ex toto se remittens: sed interdum leuior, aut propter famem, aut propter febriculam, maximeque in pueris, hisque mollis est, si non nimius humor subest. at si his uehementer increuit, renititur sic, ut uter repletus, et arte astrictus. uenæ quoque in scroto instantur, et si digito pressimus, addit humor, circumfluensque id quod non premitur: attollit, et tanquam in uitro cornuue per scrotum apparet: usque quantum in ipso est, sine dolore est. sedes autem eius sic apprehenditur: si inter summam, mediamque tunicam est, cum digitis duobus pressimus, paulatim humor inter eos reuertens subit. scrotum ipsius et albidius est. si ducitur, aut nihil, aut paruum intenditur. testiculus ea parte neque visu, neque tactu sentitur. at si sub media tunica est, intentum scrotum magis se attollit, adeo ut superior coles sub tumore eodem deliteat. præter hæc æque integris tunicis ramæ innascitur, ἡ ὄγκος ἰσχυρὸς græci appellant. uenæ intumescunt, hæc quoque intortæ, conglomeratæque ad superiorem partem, uel ipsum scrotum implent, uel mediam tunicam, uel imam: interdum etiam sub ima tunica circa ipsum testiculum, neruumque eius increunt. ex his ea quæ in ipso scroto sunt, oculis patent. hæc uero quæ nudæ, imæ uel tunice insident, ut magis conditæ, non æquæ quidem cernuntur, sed tamen etiam uisui subiectæ sunt, præterquam quod et tumoris aliquid est pro uenarum magnitudine et modo, et id prementi magis renititur, ac per ipsos uenarum toros inæquale est, et qua parte id est, testiculus magis iusto dependet. cum uero etiam super ipsum testiculum, neruumque eius id malum increuit, aliquanto longius testiculus ipse descendit, minorque altero fit, ut pote alimento amisso. Raro sed aliquando caro quoque inter tunicas increuit, ὁ ὄγκος ἰσχυρὸς græci uocant. interdum etiam ex inflammatione tumet ipse testiculus, ac febres quoque affert, et nisi celeriter ea inflammatio conquieuit, dolor ad inguina atque ilia peruenit: partesque hæc intumescunt. neruus, ex quo testiculus dependet, plenior fit, simulque indurescit super hæc, inguen quoque nonnunquam uarices implent: ὁ ὄγκος ἰσχυρὸς appellant.

De testiculorum curationibus communibus, et primo de incisione, et curatione inguinis, uel scroti. Caput. XIX.

**h** Is cognitis de curatione dicendum est, in qua quædam communia omnium sunt, quædam propria singulorum. prius de com-



munibus dictam. loquar autem nunc de his, quæ scalpellum desiderant: nam quæ uel sanari non possint, uel aliter nutriri debeant, dicendum erit simul cum ad species singulas uenero. inciditur autem interdum inguen, interdum scrotum. in utraq; curatione homo ante tri-  
dum bibere aquam pridie: abstinere etiam à cibo debet, ipso autem die collocari supinus, deinde si inguen incidendum est, idq; iam pube contegitur, ante radendum est, & cum extento scroto, ut cutis inguinis intenta sit: id incidendum sub imo uentre, qua cum abdomine tunica inferiores committuntur. aperiendum autem audacter est donec summa tunica, quæ ipsius scroti est, incidatur: perueniaturq; ad eam, qua media est plaga facta. foramen deorsum uersus subest. in id demittendus est sinistræ manus digitus index, ut diductis interuenientibus membranulis simul laxet. minister autem sinistra manu comprehenso scroto sursum uersus eum debet extendere: & quàm maxime ab inguini-  
bus abducere, primum cum ipso testiculo, dum medicus omnes mem-  
branulas quæ super mediam tunicam sunt: si digito diducere non po-  
test, scalpello abscedat: deinde sine eo, ut is delapsus ipsi plagæ iunga-  
tur, digitoq; inde promatur, & super uentrem cum duabus suis tuni-  
cis collocetur. inde si qua uiciosa sunt, circuncidenda sunt. in quibus cum  
multæ uenæ discurrant, tenuiores quidem præcidi protinus possunt: maiores uero ante longiore lino deligandæ sunt, ne periculose sangui-  
nem fundant. si in media tunica uexata erit, aut sub ea malum incre-  
uerit, excidenda erit sic, ut alte ad ipsum inguen præcadatur. infra  
tamen non tota demenda est. nam quod ad basim testiculi uehementer  
cum ima tunica connexum est, excidi sine summo periculo nõ potest.  
itaq; ibi relinquendum est. idem in ima quoq; tunica, si læsa est, faci-  
dum est. sed non à summa inguinis plaga, uerum infra paulum ea  
abscedenda, ne læsa abdominis membrana inflammationes moueat.  
neq; tamen nimium ex ea sursum relinquendum est, ne postea sinue-  
tur, & sedem eidem malo præstet. purgatus ita testiculus per ipsam  
plagam cum uenis, & arterijs, & neruo suo leuiter demittendus est,  
uidendumq; ne sanguis in scrotum descendat, ne ue concretus aliquo  
loco maneat. quæ ita fient, si uenis uinciendo medicus prospexerit. li-  
na quibus capita earum continebuntur, extra plagam dependere de-  
bebunt. quæ pure orto sine ullo dolore excidēt. ipsi autem plagæ ini-  
ciendæ duæ fibulæ sunt, & insuper medicamentum, quo glutinentur.  
solet interdum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi, ut cicat-  
rix maior & latior fiat. quod ubi incidit, linamenta super non ful-  
cienda, sed leuiter tantum ponenda sunt, supraq; ea quæ inflamma-  
tionem repellant, idest ex aceto, uel lana succida, uel spongia. cætera  
eadem



eadem: quæ ubi pus moueri debet, adhibenda sunt. at cum infra inci-  
di oportet, resupinato homine subiicienda sub scroto sinistra manus est,  
deinde id uehementer apprehendendum & incidendum. si parum-  
lum est quod nocet, modice: ut tertia pars integra ad sustinendum tes-  
ticulum infra relinquatur. si maius est, etiam amplius, ut paulum  
tantummodo ad imum, cui testiculus insidere possit: integrum mane-  
at. sed primo rectus scalpellus quàm leuissima manu teneri debet, do-  
nec scrotum ipsum diducat. tum inclinandus mucro est, ut transversa  
membrana secet, quæ inter summam, mediamq; tunicam sunt. at si  
uiuium in proximo est, mediam tunicam attingi non oportet. si sub il-  
la quoq; conditur, etiam illa incidenda est sic, ut tertia quoq; si illa ui-  
cium tegit. ubicunq; repertum malum est, ministrum ab inferiore par-  
te exprimere moderate scrotum oportet, medicum digito, manubriolo,  
uel scalpello diductam inferiorem partem tunica extra collocare: de-  
inde eam ferramento quo ad similitudinem curuum uocant, incide-  
re sic, ut in eandem intrare duo digiti index & medius possint. his  
deinde coniectis excipienda reliqua pars tunica, & inter digitos scal-  
pellus immittendus est: eximendumq; aut effundendum quicquid est  
noxium: quancunq; autem tunicam quis violauit, illam quoq; debet  
excidere, ac mediam quidem, ut supra dixi, quàm altissime ab ingui-  
ne, imam autem paulo infra. ceterum anteq; excidantur, hæ quoque  
uinci lino summe debent, & eius lini capita extra plagam relin-  
quenda sunt, sicut in alijs quoq; uenis, quæ id requisierint. eo facto tes-  
ticulus intus reponendus est, oraq; scroti suturis inter se committen-  
dæ, neq; paucis, ne parum glutinentur, & longior fiat curatio, neque  
multis, ne inflammationem augeant. atq; hic quoq; uidendum est, ne  
quid in scroto sanguinis maneat. tum imponenda glutinantia sunt.  
si quando autem in scrotum sanguis defluxit, aliquid uel concretum ex  
eo decidit, incidi subter id debet, purgatoq; eo spongia acris aceto ma-  
dens circumdari. deligatur autem uulnus omne, quod ex his causis fa-  
ctum est. si dolor nullus est, quinque primis diebus non est resoluen-  
dum, sed his die tantum aceto irroranda lana uel spongia. si dolor  
est: tertia die resoluendum, et ubi fibulae sunt, hæ incidendæ, ubi lina-  
mentum id mutandum est, rosasq; & uino madefaciendum id, quod  
imponitur. si inflammatio increseat, adiiciendum prioribus catapla-  
sma ex lenticula & melle, uel ex malicorio, quod in austero uino co-  
ctum sit, uel ex his mixtis. si sub his inflammatio non cõquirit post  
diem quintum multa calida aqua uulnus fouendum, donec scrotum  
ipsum & extenuetur & rugosius fiat. tum imponendum catapla-  
sma ex triticea farina, cui resina pinea adiecta sit. quæ ipsa si robu-

Aurelij Cor.

q iij



stus curatur, ex aceto: si tener, ex melle coquenda sunt. neq; dubium est quodcunq; initium fuit, si magna inflammatio est, quin ea, quæ pus mouent, imponenda sint. quod si pus in ipso scroto ortum est, paulum id incidi debet, ut exitus detur. linamentumq; eatenus imponendum est, ut foramen tegat. inflammatione finita propter nervos priore cataplasmate, dein cerato utendum est. Hæc proprie ad eiusmodi vulnera pertinent. cætera & in curatione, & in victu similia his esse debent, quæ in alio quoq; vulnere genere præcepimus.

## De intestini curatione.

## Cap. XX.

h Is propositis ad singulas species ueniendum est: ac si cui parvulo puero intestinum descendit, ante scalpellum experientia iunctura est. fasciæ eius rei causa fit: cui imo loco pile affuta est ex panniculis facta, quæ ad repellendum intestinum ipsi illi subijcitur: deinde reliqua fasciæ pars arcuè circumdatur. sub quo sæpe & intus compellitur intestinum: & inter se tunice glutinatur. rursus si ætas processit, multumq; intestini descendisse ex tumore magno patet, adiungunturq; dolor, & uomitus quæ ex stercore, & ex cruditate eo delapso ferè accidunt, scalpellum adhiberi sine perniciæ non posse manifestum est. leuandum tantummodo malum, & per alias curationes extrahendum est. sanguis mitti ex brachio debet: deinde si vires patiuntur, imperanda tridui abstinencia est: si minus certe pro vi corporis quamlongissime. eodem uero tempore super habendum cataplasma ex lini semine, quod ante aliquis ex mulso decoxerit. Post hæc & farina hordeacea cum resina iniicienda, & his demittendus in solium aquæ calidæ, cui oleum quoq; adiectum sit: dandumq; aliquid cibi lenis calidi. quidam etiam aluum ducunt. id ducere aliquid in scrotum potest: educere ex eo non potest. per ea uero quæ supra scripta sunt, leuato malo si quando aliàs dolor reuerterit, eadem erunt facienda. sine dolore quoq; si multa intestina prolapsa sunt, secari superuacuum est: non quo excludi à scroto non possint, nisi tamen id inflammatio prohibuit: sed quo repulsa inguinibus immorentur: ibiq; tumorem exatent: atq; ita fiat mali non finis, sed mutatio. at in eo, quem scalpello curari oportebit, simul atq; ad mediam tunicam vulnus in inguine factum peruenerit, duobus hamulis ea iuxta ipsas oras apprehendi debet, dum eductis omnibus membranulis medicus eam liberat. neq; enim cum periculo læditur, quæ excidenda est, cum intestinum esse nisi sub ea non possit. ubi deducta autem erit ab inguine, usq; ad testiculum incidi debet sic, ne his ipse læda-



tur: tum excidi. ferè tamen hanc curationem puerilis ætas & modicum malum recipit. sic uir robustus est, maiusq; id uicium est, extra hi testiculum non debet: sed in sua sede permanere. id hoc modo fit. inguen eadem ratione usq; ad mediã tunicam scalpello aperitur: eaq; tunica eodem modo duobus hamis exapitur sic, ut à ministro testicululus eatenus contineatur, ne per uulnus exeat: tum ea tunica deorsum uersus scalpello inciditur: sub eaq; index digitus sinistræ manus ad imum testiculum demittitur, eumq; ad plagam compellit: deinde dextre manus duo digiti pollex, atq; index uenam, & arteriam, & nervum, tunicamq; eorum à superiore tunica diducunt. quod si aliqua membranula prohibent, scalpello resolvuntur, donec ante oculos tota iam tunica sit. excisis quæ excidenda sunt, repositoq; testiculo ab ora quoq; eius uulneris, quod in inguine est, demenda habenula paulo latior est, quo maior plaga sit, & plus creare carnis possit.

## De omenti curatione.

## Cap. XXI.

¶ T si omentum descendit, eodẽ quidem modo, quo supra scriptum est, aperiendum inguen, diducendæq; tunica sunt. considerandum autem est, maior ne is modus, an exiguus sit. nam quod parvulum est, super inguen in alium uel digito, uel auerso specallo repellendum est. si plus est, sinere oportet dependere quantum ex utero prolapsum est: idq; adurentibus medicamentis illinere, donec emoriatur, & exadat. quidam hic quoq; duo lina acutius trahunt, binisq; singulorum capitibus diuersas partes astringunt. sub quo æque, sed tardius emoriatur. adiucatur tamen hic quoq; celeritati, si omentum super uinculum illinitur medicamentis, quæ sic exedunt ne erodant, omnia græci uocant. Fuerunt etiam qui omentum forfice præciderent: quod in paruulo nõ est necessarium. si maius est, potest profusionem sanguinis facere: siquidem omentum quoq; uenis quibusdam etiam maioribus illigatum est. neq; uero si disscisso uentre id prolapsum forfice præciditur, cum & emortuum sit, & aliter tutius aueli non possit: inde huc exemplum transferendum est. uulnus autem curari. si relictum omentum est, sutura debet. si id amplius fuit, & extra emortuum est, excisis oris, sicut supra propositum est. si uero humor intus est, incidendum est: in pueris quidem inguen, nisi in his quoq; liquoris eius maior modus prohibet: in uiris uero, & ubicunq; multus humor subest scrotum. deinde si inguen inasum est, eo protrahitis tunicis humor effundi debet. si scrotum, & sub hoc protinus uicium est, nihil aliud quam humor est effundendus: abscedendæq; mē-



branae sunt, si quae eum continuerunt, deinde eluendum id ex aqua, quae uel sale adiectum, uel nitrum habeat. si sub media, imae uenit: tota haec extra scrotum collocanda, excidendaque sunt.

## De ramidis curatione.

## Cap. XXII.

Amex autem, si super ipsum scrotum est, adurendus est tenuibus & acutis ferramentis: quae ipsis uenis insigantur: cum eo, ne amplius quam has urant, maximeque ubi inter se implicatae glomerantur, eod ferrum id admouendum est: tum super farina ex aqua frigida subacta iniicienda est: utendumque eo uinculo, quod idoneum esse ani curationibus posui. tertio die lenticula cum melle imponenda est. post eiectis crustis ulcera melle purganda: rosa implenda, ad cicatricem aridis linamentis perducenda sunt. quibus uero super mediam tunicam uenae tumunt incidendum inguen est, atque tunicae promouenda, ab eaque uenae digito uel manabriolo scalpelli separanda. qua parte uero inharebunt: & ab superiore, et ab inferiore parte lino uincienda: tum sub ipsis uinculis praecidenda, reponendusque testiculus est. at ubi supra tertiam tunicam ramex insedit, media excidi necesse est: deinde si duae, tres uel uenae tumunt, & ita pars aliqua obsidetur, ut maiore uicio uacet, idem faciendum, quod supra scriptum est, ut ab inguine & a testiculo deligatae uenae praecidantur: usque condatur. sin totum id ramex obsederit: per plagam demittendus digitus index erit: subiiciendusque uenis sic, ut paulatim protrahat aequae adducendo, donec is testiculus par alteri fiat. tum fibulae oris sic uincienda, ut simul eas quoque uenas comprehendant. id hoc modo fit. acus ab exteriori parte oram uulneris perforat. tum non per ipsam uenam, sed per membranam eius immittitur: per eamque in alteram oram compellitur uenae uulnerari non debent, ne sanguinem fundant. membrana semper inter has uenas est. ac neque periculum affert, & filo comprehensas illas abunde tenet. itaque etiam satis est duas fibulas esse. tum uenae quaecumque protractae sunt in ipsum inguen aduerso specillo comprehendi debent. soluendi fibulas tempus inflammatione finita, & purgato uulnere est, & una simul, & oras, & uenas cicatrix deuinciat. ubi uero inter imam tunicam et ipsum testiculum, neruumque eius ramex ortus est, una curatio est, quae totum testiculum abscedit. nam neque ad generationem quicquam is confert et omnibus indecore, quibusdam etiam cum dolore dependet. sed totum quoque inguen incidendum media tunica promouenda: atque excidenda est: idem in ima faciendum, neruusque ex quo testiculus dependet praecidendus. post id uenae



et arteriæ ad inguen lino deligandæ et infra uinculum abscedendæ sunt.

De carne, quæ inter tunicas testiculorum concreuit,  
et de neruo indurato. Cap. XXIII.

Aro quoq; si quando inter tunicas concreuit: nihil dubij est,  
quin eximenda sit: sed id ipso seroto inciso fieri commodius  
est. at si neruus induruit, curari res neq; manu, neq; medi-  
camento potest. Vrgent enim febres ardentes, et aut uirides, aut nigri  
uomitibus, præter hæc ingens sitis et linguae aspritudo, ferèq; a die ter-  
tio spumans bilis aluo cum rosione redditur. atq; neq; assumi facile ci-  
bus, neq; contineri potest, neq; multo post extremæ partes frigescent:  
tremor oritur: manus sine ratione extenduntur. deinde in fronte fri-  
gidus sudor, eumq; mors sequitur.

De ramice inguinis. Cap. XXIII.

Bi uero in ipso inguine ramex est, si tumor modicus est, se-  
mel incidi, si maior, duabus lineis debet, ut medium exci-  
datur: deinde non extracto testiculo: sicut intestinis quoque  
prolapsis interdum fieri docui: colligendæ uenæ uinciendæq; ubi tuni-  
cis inherebunt, et sub his modis præcidendæ sunt. neq; quicquam  
nouæ curationis uulneris eius requirit.

Ad tegendam glandem colis si nuda est. Cap. XXV.

B his ad ea transeundum est, quæ in cole ipso fiunt: in quo  
si glans nuda est, nullq; aliquis eam decoris causa tegere,  
fieri potest, sed expeditius in puero quàm in uiro: in eo, cui  
id naturale est, quàm in eo, cui quarundam gentium more circunci-  
sus est, in eo cui glans parua iuxtaq; eam cutis, spatiosior uero ipse  
coles est, quàm in quo contraria his sunt. Curatio autem eorum, qui-  
bus id naturale est, eiusmodi est. cutis circa glandem apprehenditur,  
et extenditur, donec illam ipsam condat, ibiq; deligatur. deinde iuxta  
pubem in orbem tergo inciditur: donec coles nudetur, magna q; cura  
cauetur ne uel urina iter, uel uenæ, quæ ibi sunt, incidantur. eo facto  
cutis ad uinculum inclinatur, nudaturq; atq; pubem uelut circulus:  
eoq; linamenta dantur, ut caro increseat et id impleat, satisq; uela-  
menti supra latitudo plagæ præstat. sed donec cicatrix sit, uinctum  
esse id debet, in medio tantum relicto exiguo urinae itinere. at in eo



qui circumcissus est sub circulo glandis scalpello diducenda cutis ab inferiore cole est. non ita dolet, quia summo soluto deducta deorsum usque ad pubem manu potest. neque ideo sanguis profluit. Resoluta autem cutis rursus extenditur ultra glandem. tum multa frigida aqua fouetur: emplastrumque circa datur, quod valentem inflammationem reprimat. proximisque diebus ut prope à fame victus est, ne forte eam partem facietas excitet. ubi iam sine inflammatione est, deligari debet à pube usque circum. super glandem autem aduerso emplastro imposito induci. sic enim fit, ut inferior pars glutinetur: superior ita sanescat, ne inhaereat.

Quomodo glans penis contacta aperiri possit.

Contra si glans ita contacta est, ut nudari non possit: quod uicium graeci φίσωσι appellunt, aperienda est. quod hoc modo fit. Subter à summa ora cutis inciditur recta linea usque ad frenum: atque ita superius tergus relaxatum cedere retro potest. quod si parum sic profectum est, aut propter angustias, aut propter duritiem tergoris, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte excidenda est sic, ut uertex eius ad frenum basis in tergo extremo sit. tum super danda linamenta sunt: aliaque medicamenta, quae ad sanitatem producant. necessarium autem est, donec cicatrix sit, conquiescere. nam ambulatio atterendo, ulcus sordidum reddit.

Infibulandi ratio.

Infibulare quoque adolescentulos, interdum uocis, interdum uoletudinis causa quidam consueverunt: eiusque haec ratio est. cutis quae super glandem est, extenditur: notaturque utrinque lateribus atramento qua perforatur: deinde remittitur. si super glandem notae reuertuntur, nimis apprehensum est, et ultra notari debet. si glans ab his libera est, is locus idoneus fibulae est: tum qua notae sunt. cutis acu filum ducente transiit: eiusque filii capita inter se deligantur: quotidieque id mouetur, donec circa foramina cicatriculae fiant. ubi haec confirmatae sunt, exempto filo fibula additur: quae quo melior, eo leuior est: sed hoc quidem saepius inter supernuacua, quam inter necessaria est.

De urinae reddendae difficultate, et de calculo, curationibusque eorum. Cap. XXVI.

Es uero interdum cogit emoliri manu urinam, cum illa non redditur, aut quia senectute iter eius collapsum est: aut quia calculus, uel concretum aliquid ex sanguine intus se opposuit. ac me-



diocris quoq; inflammatio sæpe eam reddi naturaliter prohibet. idq; non in uiris tantummodo, sed in foeminis quoq; interdum necessarium est. ergo aeneæ fistulae fiunt, quæ ut omni corpori ampliori, minori; sufficiant. ad mares tres, ad foeminas duæ medico habendæ sunt. ex uirilibus maxima decem et quinque est digitorum, media duodecim, minima nouem. ex mulieribus, maior nouem, minor sex. incuruas uero esse eas paulum, sed magis uiriles oportet, leuesq; admodum ac neq; nimis plenas, neq; nimis tenues. homo tum resupinus eo modo quo in curatione ani figuratur, super subsellum, aut lectum collocandus est. Medicus autem à dextro latere sinistra quidem manu colem masculi continere, dextra uero fistulam demittere in iter urinae debet. atq; ubi ad ceruicem uesicæ uentum est, simul cum cole fistulam inclinatam in ipsam uesicam compellere, eamq; urina reddita recipere. Foemina breuius urinae similiter, et rectius iter habet. quod mæmule simile inter imas oras super naturale positum non minus sæpe auxilio eget. aliquanto minus difficultatis exigit. nonnunquam etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, qui subinde ea extenuatur, non longe ab exitu inhaerescit. cum si fieri potest, oportet uellere, uel oriculario specillo, uel eo ferramento, quo in sectione calculus protrahitur. si id fieri non potuit, cutis extrema quam plurimum attrahenda, et condita glande lino uincienda est: deinde à latere recta plaga coles incidendus, et calculus eximendus est. tum cutis remittenda. sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat: et urina naturaliter profluat.

*Quæ curatio calculosis adhibeatur.*

Ubi uesicæ uero, calculiq; facta mentio sit, locus ipse exigere uidetur ut subiiciam, quæ curatio calculosis, cum aliter succurri non potest, adhibeatur. ad quam festinare cum præceps sit, nullo modo conuenit. ac neq; omni tempore, neq; in omni ætate, neq; in omni uicio id experiendum est: sed solo uere, in eo corpore quod iam nouē annos, nondum quatuordecim excessit: et si tantum mali subest, ut neq; medicamentis uinci possit, neq; etiam trahi posse uideatur, quo minus interposito aliquo spacio interimat. non quo non interdum etiam temeraria medicina proficiat: sed quo sæpius utiq; in hoc fallat, in quo plura et genera, et tempora periculi sunt, quæ simul cum ipsa curatione proponantur. Igitur ubi ultima experiri statutum est, ante aliquot diebus uictu corpus præparandum est, ut modicos, ut salubres cibos, ut minime glutinosos assumat, ut aquam bibat. ambulandi uero



## LIBER

inter hæc exercitatione utatur, quo magis calculus ad uesicæ cervicē descendat. quod an inaderit, digitis quoq; sicut in curatione docebo, demissis cognoscitur. ubi eius rei fides est, pridie u puer in ieiuno continendus est, & tum loco calido curatio adhibenda, quæ hoc modo ordinatur. homo prævalens & peritus in sedili alto confidit, supinumq; eum & aduersum super genua sua coxis eius collocatis cōprehendit, reductisq; eius cruribus ipsum quoq; iubet manibus ad suas poplites datis, eos quam maxime possit attrahere, simulq; ipse sic eos continet. quod si robustius corpus eius est qui curatur, duobus sedilibus iunctis duo ualentes insidunt: quo & sedilia & interiora crura inter se deligantur, ne diduci possint. tum is super duorum genua eodem modo collocatur, atq; alter prout consedit sinistrum crus eius, alter dextrum, simulq; ipse poplites suos attrahit. siue autem unus, siue duo continent: super humeros eius suis pectoribus incumbunt. ex quibus euenit, ut inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit extensus, & in angustum compulsa uesica facilius calculus capi possit. Præter hæc etiam num. i lateribus duo ualentes obijciuntur, qui circumstantes leuare uel unum, uel duos qui puerum continent non sinunt. Medicus deinde diligenter unguibus circumsis atq; sinistra manu duos eius digitos indicem & medium leniter prius unum, deinde alterum in anum eius demittit, dextræq; digitos super inum abdomen leniter imponit: ne si utrinq; digiti circa calculum uehementer cōcurrerint, uesicam lædant. neq; uero festinanter in hac re, ut in plerisq; agendum est. sed ita ut quam maxime id tuto fiat. nam læsa uesica nervorum distentiones cum periculo mortis excitat. ac primum circa cervicem queritur calculus. ibi repertus minore negotio expellitur. & ideo dixi ne curandum quidem: nisi cum in hoc inditijs suis cognitum est. si uero aut ibi non fuit, aut recessit retro, digitum ad ultimam uesicam dantur, paulatimq; dextra quoque manus eius ultra translata subsequitur. atque ubi repertus est calculus, qui necesse est in manus inadat, eò curiosius deducitur. quo minor, leniorq; est, ne effugiat, id est ne sæpius agitanda uesica sit. ergo ultra calculum dextra semper manus eius opponitur, sinistræ digitum deorsum eum compellit donec ad cervicem peruenitur. in quâ si oblongus est, sic compellendus est, ut pronus exeat. si planus sic, ut transuersus sit. si quadratus, ut duobus angulis sedeat. si altera parte plenior sic, ut prius ea, qua tenuior sit, euadat. in rotundo nihil interesse ex ipsa figura patet, nisi si lenior altera parte est, ut ea antecadat. cum id eò uenit, ut incidi super uesicæ cervicem iuxta anū cutis, plaga lunata usq; ad cervicē uesicæ debeat cornibus ad coxas spectantibus



paulum: deinde ea parte, qua strictior ima plaga est etiam num sub  
 cute altera transversa plaga facienda est, qua cervice aperiatur: donec  
 urina iter pateat sic, ut plaga paulo maior quam calculus sit. nam  
 qui menti fistula, quam illo loco *χορδα* graeci vocant, parum patefa-  
 ciunt: cum maiore eodem periculo reuoluntur: quia calculus iter, cum  
 ui promittitur, facit: nisi accipit: idque etiam perniciosius est, si figura quoque  
 calculi, uel asperitudo aliquid eo contulit. ex quo et sanguinis profu-  
 sio, et distentio nervorum fieri potest. quae si quis euasit, multo tamen  
 patientiorem fistulam habiturus est rupta cervice, quam habuisset in-  
 cisa. cum uero patefacta est, in conspectum calculus uenit, in cuius cor-  
 pore nullum discrimen est. ipse si exiguus est, digitis ab altera parte  
 propelli, ab altera protrahi potest. si maior: iniiciendus a superiore  
 ei parte uncus est eius rei causa factus. is est ad extremum tenuis, in  
 semicirculi specie reuolue latitudinis, ab exteriori parte laevis, qua cor-  
 pori iungitur, ab interiori asper, qua calculum attingit. isque longior  
 potius esse debet. nam breuis extrahendi uim habet. ubi iniectus est,  
 in utrumque latus inclinandus est, ut appareat calculus, et teneatur,  
 quia si apprehensus est, ille simul inclinatur: ideoque eo minimo opus  
 est. ne cum adduci uncus coeperit, calculus intus effugiat, hic in oram  
 uulneris incidat, eamque conuulneret. in qua re quod periculum esset.  
 iam supra proposui. ubi satis teneri calculum patet, eodem penes mo-  
 mento triplex motus adhibendus est in utrumque latus, deinde extra,  
 sic tamen ut leniter id fiat, paulumque primo calculus attrahatur. quo  
 facto attollendus uncus extremus est, uti intus magis maneat, facili-  
 usque illum producat. quod si aliquando a superiore parte calculus pa-  
 rum commodè comprehendetur, a latere erit apprehendendus. haec  
 est simplicissima curatio. sed uarietas rerum quasdam etiam num  
 animaduersiones desiderat. sunt enim quidam non asperi tantum-  
 modo, sed spinosi quoque calculi, qui per se quidem delapsi in cervice  
 sine ullo periculo eximuntur. in uestigia uero non tuto uel hi conquirun-  
 tur, uel attrahuntur. quoniam ubi illam conuulnerant, ex disten-  
 sione nervorum mortem maturant, multoque magis si spina aliqua ue-  
 sicæ inhaeret: eamque, cum duceretur, duplicauit. colligitur autem eo quod  
 difficilius urina redditur, in cervice calculum esse: eo quod cruenta de-  
 stillat, illum esse spinosum: maximeque id sub digitis quoque experiri-  
 dum est, neque adhibenda manus, nisi id constiterit. ac tum quoque leniter  
 intus digiti obijciendi, ne uolenter promouendo conuulnerent. tum  
 in adedum. multi hic quoque scalpello usi sunt. Meges, quoniam is infir-  
 mior est: potestque in aliqua prominentia inadere, incisoque super illam  
 corpore: qua cunum subest non secare, sed relinquere, quod iterum



incidi necesse sit, ferramentum fecit rectum in summa parte labrosum, in ima semicirculatum, acutumq; id receptum inter duos digitos indicem ac medium super pollice imposito sic deprimebat: ut simul cum carne, siquid ex calculo prominebat: incideret. quo confesquebatur, ut semel quantum satis esset, aperiret. quocumq; autem modo cervix ea parte facta est, leniter extrahi quod asperum est, debet: nulla propter festinationem vi admota.

Signa calculorum, uel harenosorum, uel mollium.

**T** calculus harenosus, & ante manifestus est: quoniam & urina quæ redditur, harenosa est, & in ipsa curatione, quoniam inter subiectos digitos neque æque leniter renititur, & insuper dilatatur. item mollis calculus, & ex pluribus minutisq; sed inter se parum astrictis compositus indicatur, in se attrahens quasdam quasi squamulas. hos omnis leniter permutatis subinde digitorum uicibus sic oportet abducere, ne uesicam lædant, ne uel intus aliqua dissipatæ reliquie maneat. quæ postmodum curationi difficultatem faciant. quicquid autem ex his in conspectum uenit uel digitis, uel unco eximendum est. at si plures calculi sunt, singuli protrahi debent, sic tamen, ut si quis exiguus supererit, potius relinquatur. si quidem in uesica difficulter inuenitur. inuentusq; celeriter effugit. ita longa inquisitione uesica læditur: excitatq; inflammationes mortiferas, adeo ut quidam secti cum diu frustra; per digitos uesica esset agitata, decesserint. quibus accedit etiam quod exiguus calculus ad plagam urina postea promouente excidit. si quando autem is maior non uidetur nisi rupta ceruice extrahi posse, findendus est. cuius reperiuntur Ammonius ob id  $\alpha\iota\sigma\tau\omicron\mu\omicron\varsigma$  cognominatus est: id hoc modo fit. unguis iniicitur calculo sic, ut facile eum concussim quoque teneat, ne is retro reuoluatur. tum ferramentum adhibetur crassitudinis modicæ prima parte tenui, sed retusa, quod admodum calculum ex altera parte ictum findit: magna cura habita, ne aut ad ipsam uesicam per ferramentum perueniat, aut calculi fractura ne quid incidat.

De calculis foeminarum.

**A**e uero curationes in foeminis quoque similes sunt, de quibus tamen parum proprie quædam dicenda sunt. siquidem in his ubi paruulus calculus est, scalpellus supernaculus est, quia is urinam in ceruicem non compellit: quæ & breuior quàm in ma



ribus, & laxior est. ergo et per se sepe excidit, & si in primo quod est angustus inhaeret, eodem tamen uno sine ulla noxa educitur. at in maioribus calculis necessaria eadem curatio est. sed uirgini subijci digiti tanquam masculo mulieri per naturalia eius debent. tum uirgini quidem sub ima sinistiore ora. Mulieri uero inter urinae iter, & os pubis incidendum est sic, ut utroque loco plaga transuersa sit, neque terreri conuenit si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

Quae curatio calculo euulso habenda sit.

Calculo euulso, si ualens corpus est, neque magnopere uexatum, sinere oportet sanguinem fluere, quo minor inflammatio oriatur: atque ingredi quoque eum paulum non alienum est, ut excidat, si quid intus concreti sanguinis mansit. quod si per se non destitit, rursus ne uis omnis intereat, suppressi debet. idque protinus in imbecillioribus ab ipsa curatione faciendum est. si quidem uis distentione neruorum periclitatur aliquis dum uestica eius agitur, sic alter metus excipitur remotis medicamentis, ne tantum sanguinis proficiat, ut occidat. quod ne incidat, desidere his debet in acre acetum, cui aliquantum salis sit adiectum. sub quo & sanguis fere conque- scit, et astringitur uestica, ideoque minus inflammatur. quod si parum proficiat, agglutinanda cucurbitula est, & inguinibus, & coxis, & super pubem. ubi iam satis uel euocatus est sanguis, uel prohibitus, resu- pinus collocandus est sic, ut caput humile sit, coxae paulum excitentur: ac super ulcus imponendum est duplex, aut triplex linteolum aceto madens. deinde interpositis duabus horis in solum is aquae ca- lidæ resupinus demittendus est sic, ut à genibus ad umbilicum aqua teneat, cetera uestimentis circumdata sint, manibus tantummodo, pe- dibusque nudatis, ut & minus digeratur, & ibi diutius maneat. ex quo sudor multus oriri solet, quo spongia subinde facile detergendum est: finisque eius fontis est donec infirmando offendat: tum multo is oleo perungendus, induendusque hapsus lanae mollis tepido oleo re- plendus: qui pubem & coxas & inguina & plagam ipsam contactam eodem ante se linteolo protegit, hisque subinde oleo tepido madefa- ciendus est, ut neque frigus ad uesticam admittat, & neruos leniter molliat. quidam cataplasmatibus calefacientibus utantur: ea plus pon- dere nocent, quae uesticam urgendo uulnus irritant, quod calore pro- ficiunt. ergo ne uinculum quidem ullum necessarium est: proximo die si spiritus diffusius redditur, si urina non excedit, si locus cir- ca pubem mature intumuit. scire licet in uestica sanguinem concretum



# LIBER

remansisse. igitur demissis eodem modo digitis leuiter pertractanda  
 uestica est, et discutienda, si qua coierunt. quo fit ut per vulnus postea  
 procedant. non alienum etiam est oriculario clystere acetum nitro  
 mixtum per plagam in uesticam compellere. nam sic quoque discutiun-  
 tur, si qua cruenta coierunt. eaque facere etiam primo die conuenit. si  
 timemus ne quid intus sit: maximeque ubi ambulando id elicere imbe-  
 cillitas prohibuit, cetera eadem facienda sunt, ut demittatur in solium:  
 ut eodem modo panniculus eadem lana super iniiciatur: sed neque saepe,  
 neque tandiu in aqua calida puer habendus, quam adolescens est, in-  
 firmus, quam ualens: leni quam grauiore inflammatione affectus, is  
 cuius corpus digeritur, quam his cuius astrictum est. inter haec uero  
 si somnus est, et aequalis spiritus, et madens lingua, et sitis modica,  
 et uenter imus, sed et mediocris est cum febre modica dolor, scire  
 licet recte procedere curationem. atque in his inflammatio ferè quinto  
 uel septimo die finitur. qua leuata solium supernacuum est. supini  
 tantummodo vulnus aqua calida fouendum est, ut si quid urinae ro-  
 det, abluatur. imponenda autem medicamenta sunt pus mouentia, et  
 si purgandum ulcus uidebitur, melle linendum. id si rodet, rosa tempe-  
 rabitur. huic curationi aptissimum uidetur euea quod maior empla-  
 strum. nam et seum habet ad pus mouendum, et mel ad ulcus re-  
 purgandum: medulla etiam maximeque uitulina: quod in id ne fistula  
 relinquatur, praecipue proficiat. linamenta uero tum super ulcus non  
 sunt necessaria, super medicamentum ad id continendum recte impo-  
 nuntur. at ubi ulcus purgatum est: puro linamento ad cicatricem per-  
 ducendum est. quibus temporibus tamen, si felix curatio non fuit, ua-  
 ria circa pericula oriuntur. quae praesagire protinus licet: si continua  
 uigilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida est, si sitis uehemens,  
 si uenter imus tumet, si vulnus hiat, si transfluens urina id non ro-  
 dit, si similiter ante tertium diem quaedam liuida excidunt, si is aut  
 nihil, aut tarde respondet, si uehementes dolores sunt, si post die quin-  
 tum magnae febres urgent, et fistidum abi permanet, si cubare in  
 uentrem iocundius est. nihil tamen peius est distentione nervorum, et  
 ante nonum diem uomitus bilis. sed cum inflammationis sit metus,  
 succurri, abstinentia modica et tempestiuis cibis, inter haec fomentis,  
 de quibus supra scripsimus. oportet.

De cancro qui ex afa uestica nascitur, et qua curatione uti debeat.

Caput XXVII.

**P**roximus canceri metus est. is cognoscitur, si et per vulnus, et  
 per ipsum colem fluit sanies mali odoris, cumque eo quaedam a  
 concreto



concreto sanguine non abhorrentia, tenuesq; carunculae lanulis simili-  
les: præter hæc si oræ vulneris aridæ sunt: si dolent inguina: si febris  
non defuit, eaq; in noctem augetur: si inordinati horrores accedunt.  
Cōsiderandum autem est, in quam partem cancer is tendat. si ad co-  
lem indurescat his locus & rubet, & tactu dolorem excitat, testicu-  
liq; intumescunt. si in ipsam uesticam ani dolor sequitur, coxæ dure-  
sunt, non facile crura extendi possunt. at si in alterutrum latus oculis  
id expositum est, paresq; utrinq; easdē notas sed minores habet. pri-  
mum autem ad rem pertinet corpus recte iacere, ut superior pars  
semper eadem sit in quam uicium fertur. ita si ad colem it, supinus  
his collocari debet. si ad uesticam inuentrem, si in latus, in id quod  
integrius est. Deinde ubi uetum fuerit ad curationem, homo in aquā  
demittetur: in qua marrubium decoctum sit, aut cupressus, aut myr-  
tus, idemq; humor clystere intus adiicietur. tum super ponetur lenti-  
cula cum malicorio mixta, quæ utraq; ex uino decocta sint, uel ru-  
bus, aut oleæ folia eodem modo decocta, aliq; medicamenta, quæ ad  
cohibendos, purgandosq; caneros proposuimus. ex quibus si qua erūt  
arida, per scriptorium calamum inspirabuntur. ubi stare coeperit cā-  
cer, mulso uulnus eluetur. uitabiturq; eo tempore ceratum quod ad  
recipiendum id malum corpus emollit, potius plumbum elotum cum  
uino inungetur. super quæ idem linteolo illitum imponetur: sub qui-  
bus perueniri ad sanitatem potest. cum eo tamen quod non ignoremus  
orto cancro sepe affici stomachum, cui cum uestica quoddam consor-  
tium est: exq; eo fieri ut neq; retineatur cibus, neq; si quis retentus est,  
concoquatur: neq; corpus alatur: ideoq; ne uulnus quidem aut pur-  
gari, aut ali possit: quæ necessario mortem maturant. sed ut his suc-  
curri nullo modo potest, sic à primo tamen diu tenenda ratio curatio-  
nis est. in qua quædam observatio ad cibum quoq; potionemq; perti-  
nens necessaria est: nam cibus inter principia non nisi humidus dari  
debet. ubi ulcus purgatum est, ex media materia olera, & salsamen-  
ta semper aliena sunt. potionem opus est non modicā: nam si parum  
bibitur, accenditur uulnus, & uigilia urget, & uis corporis minui-  
tur. si plus æquo assumitur, subinde uestica impletur, eoq; irritatur.  
non nisi aquam autem bibendam esse manifestus est, quā ut subim-  
de dicendum sit. solet uero sub eiusmodi uictu uenire ut alius non  
reddatur. Hæc aqua ducenda est, in qua uel fœnum græcum, uel mal-  
ua decocta sit. idem humor rosa mixtus in ipsum uulnus oriculario  
clystere agendus est: ubi id rodit urina neq; purgari patitur. Ferè ue-  
ro primo per uulnus exit hæc, deinde eo sanescente diuiditur, et pars  
per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur: quod in-

Aurelij Cor.

r



terdum tertio mense, interdum non ante sextum, nonnunquam exacto quoque anno fit: neque desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi ubi aut uehementer rupta ceruix est, aut ex cancro multæ, magnæque caruncule, simulque nervosa aliqua exciderunt. sed ut uel nulla ibi fistula, uel exigua admodum relinquatur, summa cura providendum est. Ergo cum iam ad cicatricem uulnus intendit, extētis iacere foemina, et cruribus oportet: nisi tamen molles, harenosi uel calculi fuerint. sub his enim tardius uestigia purgatur. Ideoque diutius plagam patere necessarium est: et tum demum ubi iam nihil tale extra fertur, ad cicatricem perducere quod si antequam uestigia purgata est: orae se glutinarunt: dolorque, et inflammatio redierunt, uulnus digitis uel aduerso specillo diducendum est, ut torquentibus exitus detur: hisque effusis tum diutius pura urina descendat. tum demum quæ cicatricem inducant, imponenda sunt: extendique ut supra docui pedes quam maxime iuncti. quod si fistulæ metus ex his causis, quas proposui, subesse uidebitur, quo facilius claudatur ea, uel certe coaguletur, in anum quoque danda plumbea fistula est: extentisque cruribus foemina, talique inter se deligandi sunt, donec qualis futura est, cicatrix sit.

Si naturalia foeminarum concubitus non admittunt, quo modo curari conueniat. Cap. XXVIII.

T hoc quidem commune esse maribus, et foeminis potest. e proprie uero quedam ad foeminas pertinere, ut in primis: quod earum naturalia nonnunquam inter se glutinatis oris concubitus non admittunt. idque interdum euenit protinus in utero matris: interdum exulceratione in his partibus facta, et per malam curationem his oris sanescendo iunctis. si ex utero est, membrana ori uulnæ opposita est. si ex ulcere, caro id repleuit. oportet autem membranam duabus lineis inter se transuersis incidere ad similitudinem litteræ X. magna cura habita ne urina iter uioletur. deinde undique eam membranam excidere: ac si caro increuit, necessarium est recta linea patefacere. tum ab ora, uel uulsella, uel hamo apprehensam tanquam habenulam excidere: et intus implicatum in longitudinem linamentum, ῥήκνιον ὅς ἑστί, ἡ ῥήκνιον ἡ ῥήκνιον, in aceto tinctum demittere: superaque succidam lanam aceto madentem deligare: tertio die soluere ulcus, et sicut alia ulcera curare. cumque iam ad sanitatem tendet, plumbeam fistulam medicamento cicatricem inducente illinere, eamque intus dare. supraque idem medicamentum inijcere, donec ad cicatricem plagæ perueniat.



## Qua curatione partus emortuus ex utero excutiat. Cap. XXIX.

Bi concipit autem aliqua si iam propè maturus partus in-  
 tus emortuus est, neq; excedere per se potest, adhibenda cu-  
 ratio est, quæ numerari inter difficillimas potest. nam et  
 summam prudentiam, moderationemq; desiderat: et maximum pe-  
 riculum affert. sed ante omnia uulvæ natura mirabilis, cum in mul-  
 tis alijs, tum in hac re quoq; facile cognoscitur. oportet autem ante om-  
 nia resupinam mulierem transuerso lecto sic collocare, ut feminibus  
 eius ipsius ilia comprimantur. quo fit ut et inus uenter in conspe-  
 ctu medici sit: et infans ad os uulvæ compellatur: quæ emortuo par-  
 tu id comprimit: ex intervallo uero paulum dehiscere. hac occasione  
 usus medicus unciæ manus indicem digitum primum debet inferere,  
 atq; ibi continere, donec iterum ad os aperiatur: rursusq; alterum  
 digitum demittere debet, et per easdē occasionēs alios, donec tota  
 esse intus manus possit. ad cuius rei facultatem multum confert et  
 magnitudo uulvæ, et uis nervorum eius, et corporis totius habitus,  
 et mentis etiam robur: cum presertim intus nonnunq; etiā duæ ma-  
 nus dari debeant. pertinet etiā ad rem quàm alidissimum esse inu-  
 uentrem, et extrema corporis, neq; dum inflammationem cœpisse,  
 sed recenti re protinus adhiberi medianam. nam si corpus iam in-  
 tumuit, neq; demitti manus, neq; educi infans nisi agerrime potest, se-  
 quiturq; sæpe cum uomitu et cum tremore mortifera nervorum di-  
 stentio. uerum intus emortuo corpori manus iniecta protinus habitū  
 eius sentit. nam aut in caput, aut in pedes conuersum est, aut in trās-  
 uersum iacet: ferè tamen sic, ut uel manus eius, uel pes in propinquo  
 sit. Medici uero propositum est, ut eum manu dirigat uel in manus,  
 uel etiam in pedes. si forte aliter compositus est, ac si nihil aliud est,  
 manus uel pes apprehensus, corpus rectius reddit: nam manus in ca-  
 put, pes in pedes eum conuertit. tum si caput proximum est, demitti  
 debet unciis undiq; leuis acuminis breuis, qui uel oculo, uel auri, uel  
 ori, interdum etiam fronti recte iniicitur, deinde attractus infantem  
 educat: neq; tamen quolibet his tempore extrahi debet. nam si com-  
 presso uulvæ ore indentatum est, nō emittente eo infans abrumpitur:  
 et unci acumen in ipsum os uulvæ delabitur: sequiturq; nervorum  
 distentio, et ingens periculum mortis. igitur compressa uulua, conge-  
 scere hiantē, leniter trahere oportet: et per has occasionēs paulatim  
 eum educere. trahere autē dextra manus uncum, sinistra intus posi-  
 ta infantem ipsum: simulq; dirigere eum debet. Solet etiam euenire,  
 ut is infans humore distendatur: exq; eo profluat fœdi odoris sanies.



quod si tale est, indice digito corpus illud forandum est, ut effuso humore extenuetur. tum id leniter per ipsas manus recipiendum est. nam uncus iniectus facile hebeti corpusculo eleuabitur. in quo quid periculi sit, supra positum. sed in pedes quoque conuersus infans non difficulter extrahitur: quibus apprehensis per ipsas manus commode educitur. si uero transuersus est, neque dirigi potuit, uncus alae iniectus, paulatimque attrahendus est. sub quo ferè cervix replicatur, retroque caput, ac reliquum corpus spectat. remedio est cervix præcisa, ut separatim utraq; pars auferatur, id unco fit, qui priori similis in interiorem tantum partem per totam aciem exacuitur: tum id agendum est, ut ante caput, deinde reliqua pars auferatur: quia ferè maiore parte extracta, caput in uacuum uuluum prolabitur, extrahi que sine summo periculo non potest: si tamen id inadit, super uentrem mulieris duplici panniculo iniecto, ualens homo non imperitus à sinistro latere eius debet assistere, et super imum uentrem eius duas manus imponere, alteraque alteram premere. quo fit ut illud caput ad os uulue compellatur. idque eadem ratione quæ supra posita est, unco extrahitur. at si pes alter iuxta repertus est, alter retro cum corpore est, quicquid protractum est, paulatim abscidendum est: et si clunes os uulue urgere cœperunt, iterum retro repellendæ sunt. conquisitusque pes eius adducendus. aliæque etiam nunc difficultates faciunt, ut qui solidus non exit, concisus eximi debeat. quotiens autem infans protractus est, tradendus ministro est. is eum supinis manibus sustinere, medicus deinde sinistra manu leniter trahere umbilicum debet, ita ne abrumpat, dextraque eum sequi usque ad eas, quas secundas uocat. quod uelamentum infantis intus fuit. hisque ultimis apprehensis uenulas, membranulasque omnes eadem ratione manu diducere à uulua, totumque illud extrahere. et si quid intus præterea concreti sanguinis remanet, tum compressis in unum feminibus, illa conclauis collocanda est, modicum calorem sine ullo præstati habente. super imum uentrem eius imponenda lana succida in aceto, et rosa tincta. reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, et in his uulneribus, quæ in nervosis locis sunt, adhibeatur.

## De ani uicijs, et eorum curatione. Cap. XXX.

Ni quoque uicia ubi medicamentis non uincuntur, manus auxilium desiderant. ergo si qua scissa in eo uetustate induruerunt, iamque callum habent, commodissimum est ducere aluum: tum spongiam calidam admonere, ut relaxentur illa, et foras prodeant. ubi in conspectu sunt, scalpello singula exadere, et ulcera remouere.



remouere. deinde imponere linamentum molle, & super linteolum illitum melle, locumq; eum molli lana implere & ita uincere altero die, deincepsq; cæteris lenibus medicamentis uti: quæ ad recentia eadē uicia necessaria esse aliās proposui: & utiq; per primos dies sorbitionibus eum sustinere paulatim: deinde cibis adijcere aliquid generis tamen eius, quod eodem loco præceptum est. si quando autem ex inflammatione pus in his oritur, ubi primum id apparuit incidendum est, ne anus ipse suppuret. neq; tamen ante properandum est. nam si cridum incisum est, inflammationis multum accedit: & puris aliquanto amplius concitatur. his quoque uulneribus lenibus cibis, hisdemq; medicamentis opus est.

#### De condylomatum curatione.

Tubercula, quæ *νοδὺν ὡματᾶ* appellantur, ubi induruerunt, hac ratione curantur. alius ante omnia ducitur. tum uolsella tuberculum apprehensum iuxta radices exciditur. quod ubi factum est eadem sequuntur, quæ supra post curationem adhibenda esse proposui. tantummodo si quid increſcit squama aeris coercendum est. ora etiam uenarum fundentia sanguinem sic tolluntur. ubi sanguini, qui effluit, sanies adijcitur: alius acrius ducatur, quo magis oræ promoueantur. eoq; fit, ut omnes uenæ, quasi capitula cōspiciantur. tum si capitulum exiguum est, basimq; tenuem habet, astringendum lino paulum supra est, quam ubi cum ano committitur. imponenda spongia aqua calida est, donec id libeat. deinde aut ungue, aut scalpello supra nodum id exulcerandum est. quod nisi factum est, magni dolores subsequuntur. interdum etiam urinae difficultas. si id maius est, & basis latior, hamulo uno aut altero excipiendum est: paulumq; supra basim incidendum: neq; relinquendum quicquam ex eo capitulo: neq; quicquam ex ano demendum est. quod consequitur his, qui neq; nimium, neq; parum hamos ducit. quæ incisum est, acus debet immitti: infraq; eam lino id capitulum alligari: si duo, triaue sunt, imum quodq; primum curandum est. si plura, non omnia simul, ne tempore eodem undiq; teneræ cicatrices sint. si sanguis profluit, excipiendus est spongia: deinde linamentum imponendum. ungenda fœmina, & inguina, & quicquid iuxta ulcus est. ceratumq; super dandum est. farina ordeacea calida implendusq; is locus est. sic deligandus est. postero die is desidere in aqua calida debet: eodemq; cataplasmate foueri. ac bis die, & ante curationem, & post eam ceruices, ac femina liquido cerato perungenda sunt: tepidoq; is loco continendus. interpositis quinq; aut sex diebus oriculario specillo linamenta edn-

Aurelij Cor.

r iij



## LIBER

tenda. si capitula simul non exciderunt, digito promouenda. tum lenibus medicamentis hisdemq; quæ alibi posui, ulcera ad sanitatem perducenda. finito uicio quemadmodum agendum esset, iâ aliâs superius exposui.

## De uaricum curatione. Cap. XXXI.

His ad crura proximus transitus est. in quibus orti uarices non difficili ratione tolluntur. huc autem et earum uenularum, quæ in capite nocent, et eorum uaricum, qui in uentre sunt, curationem distuli: quoniam ubiq; eadem est. igitur uena ois, quæ noxia est, aut adusta tabescit: aut manu exciditur. si recta est, si quantumuis transversa, tamen simplex: si modica est, melius aduritur. si curua est et uelut in orbes quosdam implicatur, pluresq; inter se inuoluuntur, utilius eximere est: adurendi ratio hæc est. cutis super inciditur. tum patefacta uena tenui, et retuso ferramento candente modice prænititur: nitaturq; ne plagæ ipsius oræ adurantur: quas reducere hamulis facile est. id interpositis ferè quaternis digitis per totum uaricem fit: et tum superimponitur medicamentum, quo adusta sanantur: at exciditur hoc modo. cute eadem ratione super uenam incisa hamulo oræ excipiuntur: scalpelloq; undiq; à corpore uena diducitur: caueturq; ne inter hæc ipsa lædatur: eiq; retusus hamulus subiicitur, interpositoq; eodem ferè spacio. quod supra positum est, in eadē uena idem fit, quæ quo tendat, facile hamulo extento agnoscitur. ubi iam idem, quacumq; uarices sunt, factum est, uno loco adducta per hamulum uena præciditur: deinde qua proximus hamus est, attrahitur, et euellitur: ibi rursus absciditur. ac sic undiq; uaricibus crure liberato, tum plagarum oræ committuntur: et super emplastrum glutinans iniicitur.

## Curatio digitorum coherentium. Cap. XXXII.

Si si digiti uel in utero protinus, uel propter communē exulcerationem postea cohæserunt, scalpello diducuntur. dein separatim uterq; non pingui emplastro circundatur. atq; ita per se uterq; sanescit. si uero fit ulcus in digito, posteaq; male indurata cicatrix circum eum reddit, primū malagma tentandum est. dein si id nihil prodest, quod et in ueteri cicatrice, et ubi nerui læsi sunt, euenire consuevit: uidere oportet nerui ne id uicium, an cutis sit. si nerui est, attingi non debet, neq; enim sanabile est. si cutis, tota cicatrix exadenda est: quæ ferè callosa efficit, ut extendi digitum non patiatur: tum rectus sic ad nouam cicatricem perducendus est.



Angrena inter ungues, alasq; aut inguina nasci: Et siquādo medicamenta unctantur, membrū præcidi oportere, alio loco mihi dictum est. sed id quoq; cū periculo summo fit: nam sæpe in ipso opere, uel profusione sanguinis, uel animæ defectio ne moriuntur. uerum hic quoq; nihil interest an satis tutum præsidium sit: quod unicum est. igitur inter sanam, uitiatamq; partem incidenda scalpello caro usq; ad os est sic, ut neq; contra ipsum articulum id fiat: Et potius ex sana parte aliquid excidatur, quàm ex ægra relinquatur. ubi ad os uentum est, reducenda ab eo sana caro, Et circa os subsecanda est, ut ea quoq; parte aliquid os nudetur: dein id ferrula præcidendum est, quàm proxime sanæ carni etiam inherenti. ac tum frons ossis, quam sermula exasperauit, lenanda est, supraq; inducenda cutis, quæ sub eiusmodi curatione laxa esse debet ut quæ maxime undiq; os contegat. quo cutis inducta non fuerit id linamentis erit contegendum, Et super id spongia ex aceto deliganda. cætera postea sic faciēda, ut in mulneribus, in quibus pus moueri debet, præceptum est.

## LIBER OCTAVVS.

## De positu, Et figura totius humani corporis. Caput primum.

Vperest ea pars, quæ ad ossa pertinet. quæ quo facilius accipi possit, prius positus, figurasq; eorum indico. Igitur caluaria incipit ex interiore parte concaua, extrinsecus gibba, utrinq; leuis, Et qua cerebri membranam contegit. Et qua cute capillum gignente contegitur. eaq; simplex ab occipitio Et temporibus, duplex usque in uerticem à fronte est. ossaq; eius ab exterioribus partibus dura, ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt. interq; ea uenæ discurrunt, quas his alimentum subministrare credibile est. raro autem caluaria solida sine suturis est. locis tamen æstuosus facilius inuenitur. Et id caput firmissimum, atq; à dolore tutissimum est: ex cæteris, quo suturæ pauciores sunt, eo capitis uoletudo commodior est. neque enim certus earum numerus est, sicut ne locus quidem: fere tamen duæ super aures, tempora à superiore capitis parte discernunt. tertia ad aures per uerticem tendens, occipitium à summo capite diducit. quarta ab eodem uertice per medium caput ad frontem

r iij



procedit, eaq; modo sub imo capillo desinit: modo frontem ipsam secans inter supercilia finitur. ex his ceterae quidem suturae in ungue committuntur. haec uero quae super aures transuersae sunt, totis oris paulatim extenuantur: atq; ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. crassissimum uero in capite os post aurem est, quia capillus ut uerisimile est, ob id ipsum non gignitur. sub his quoq; musculis, qui tempora connectunt, os medium in exteriorem partem inclinatum positum est. at facies suturam habet maximam, quae a tempore incipiens per medios oculos, naresq; transuersa peruenit ad alterum tempus: in qua breues duae sub interioribus angulis deorsum spectant. et malarum quoq; in summa parte singulae transuersas suturas habent. a medijsq; naribus, aut superiorum dentium gingiuis per medium palatum una procedit: aliaq; transuersa idem palatum secat. et suturae quidem in plurimis haec sunt. foramina autem intra caput maxima oculorum sunt: deinde narium, tum quae in auribus habemus: ex his quae oculorum sunt, recta, simpliciaq; ad cerebrum tendunt. narium duo foramina osse medio discernuntur. siquidem haec primum a supercilijs, angulusq; oculorum osse inchoantur ad tertiam fere partem: deinde in cartilagine uersae quo propius ori descendunt, eo magis cartuncula quoq; molliuntur. sed ea foramina quae a summis adimas nares simplicia sunt, ibi rursus in bina itinera diuiduntur. aliaq; ex his ad fauces peruia spiritum et reddunt, et accipiunt: alia ad cerebrum tendunt. in ultima parte in multa, et tenuia foramina dissipantur, per quae sensus odoris nobis datur: in aure quoq; primo rectum, et simplex iter procedendo flexuosum fit. quod ipsum iuxta cerebrum in multa et tenuia foramina diducitur, per quae facultas audiendi est: iuxtaq; ea duo paruuli quasi sinus sunt. superq; eos finitur os: quod transuersum a genis tendens ab inferioribus ossibus sustinetur: iugale appellari potest ab eadem similitudine a qua id graeci ζυγώδες appellant. Maxilla uero est molle os, eaq; una est, cuius eadem et media, et etiam ima pars mentum est: a quo utrinq; procedit ad tempora: solaq; ea mouetur. nam malarum cum toto osse, quod superiores dentes exigit, immobiles sunt. uerum ipsius maxillae partes extremae quasi biuernes sunt. alter proccensus intra latior uertice ipso tenuatur: longiusq; procedens sub osse iugali subit: et super id temporum musculis illigatur. alter breuior, et rotundior, et in eo sinus qui iuxta foramina auris est, cardinis modo fit: ibiq; huc, et illuc se inclinans, maxillae facultate motus praestat. duriores osse dentes sunt. quorum pars maxillae, pars superiori ossi malarum haeret. ex his quaterni primi quia secant, τεμνινὸι à graecis nominantur. hi deinde



quatuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. ultra quos utrinque  
 ferè maxillares quaterni sunt, præterq; in his, in quibus tres ultimi, q  
 sero gigni solent: non increuerunt. ex his priores singulis radicibus,  
 maxillares utiq; binis, quidam etiam ternis, quaternis ueniantur.  
 Ferèq; longior radix breuiorem dentem edit: rectiq; dētis recta etiā  
 radix, cui flexa est: exq; eadem radice in pueris nouus dēs subit:  
 qui multo sæpius priorem expellit: interdum tamen supra, infra ue  
 rum se ostendit. caput autē spina excipit. ea constat ex uertebis qua  
 tuor & uiginti. septem in ceruice sunt: duodecim ad costas. reliqua  
 quinq; sunt proxima costas. hæc teretes, breuesq; ab utroq; latere pro  
 cessus duos exigunt. mediæ perforatæ, qua spinæ medulla cerebro cō  
 missa descendit. circa quoq; per duos processus tenuibus canis peruiæ,  
 per quæ à membrana cerebri similes membranulæ deducuntur. o  
 mnesq; uertebæ exceptis tribus summis à superiore parte in ipsis  
 processibus parum desidenti sinus habent: ab inferiore alios deor  
 sum uersus processus tenuibus, cuius peruiæ per quæ à membrana ce  
 rebri similes membranulæ deducuntur. omnesq; uertebæ exceptis  
 tribus summis à superiore parte in ipsis processibus parum desiden  
 tis sinus habent: ab inferiore alios deorsum uersus processus exigunt.  
 summa igitur protinus caput sustinet, per duos sinus receptis exiguis  
 eius processibus. quo fit, ut caput sursum deorsum uersum tuberculis  
 exasperetur: secunda superiori parti inferiore. qd ad circuitum perti  
 net, pars summa angustiore orbe finitur. Itaq; superior summæ cir  
 cundata, in latera quoq; caput moueri sinit. tertia eodem modo secun  
 dam excipit: ex quo facilis ceruicæ mobilitas est. ac ne sustinere quidem  
 caput posset, nisi utrinque recti, ualentesq; nervi collum continerent: quos  
 levortao græci appellant. siquidem horum inter omnes flexus alter  
 semper intentus ultra prolabi superiora non patitur. iamq; uerte  
 bræ tertia tubercula quæ inferiori inserantur, exigit. ceteræ proces  
 sibus deorsum spectantibus in inferiores insinuantur: ac per sinus  
 quos utrinque habent, superiores accipiunt: multisq; nervis, & multa  
 cartilagine continentur. ac sic uno flexu modico in promptum dato,  
 ceteris negocijs homo, & rectus insistit: & aliquid ad necessaria ope  
 ra curuatur. infra ceruicem uero summa costa contra humeros sita  
 est: inde undecim inferiores usq; ad imum pectus perueniunt: hæc  
 primis partibus rotundæ, & leniter quasi capitulatæ uertebæ  
 transversis processibus ibi quoq; paulum insinuatæ inhaerent. inde  
 patescunt: & in exteriorem partem recuruatæ, paulatim in cartilagi  
 nem degenerant. eaq; parte rursus in interiora leniter flexe commit  
 tuntur cum osse pectoris. quod ualens, et durum à faucibus incipit, ab



## LIBER

utroq; latere lunatum, & à præcordijs iam ipsum quoq; cartilagine  
mollitum terminatur. sub costis uero prioribus, quinq; quas vocat græ  
ci nominant, breues, tenuioresq; atq; ipsæ quoq; paulatim in cartila  
ginem uersæ, extremis abdominis partibus inhaerescunt. imaq; ex  
his maiore iam parte nihil nisi cartilago est. rursus à ceruice duo la  
ta ossa utrinq; ad scapulas tendunt. nostri scoptula operata, ὠμοπλά  
ται græci nominant. ea in summis uerticibus sinuata, ab his triangu  
la, paulatimq; lateſcentia ad spinam tendunt: & quo latiora quaq;  
parte sunt hoc hebetiora, acq; ipsa quoq; in imo cartilaginosa poste  
riore parte uelut innatae, quoniam nisi in summo nulli ossi inhae  
rescunt. ibi uero ualidis musculis, nervisq; constricta sunt. at à sum  
ma costa paulo interius quàm ubi ea media est, os excrescit: ibi quidē  
tenue, procedens uero quo propius lato scapularum ossi fit, eo plenius,  
latiusq; & paulatim in exteriora curuatum. quod propius, altera  
uerticis parte modice intumescens, sustinet ingulum. id autem ipsum  
recuruum, ac neque inter durissima ossa numerandum: altero capite  
in eo quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossis insidit, paulūq;  
motu brachij mouetur: & cum lato ossē scapularum infra caput, eius  
nervis, & cartilagini connectitur. hinc humerus incipit extremis  
utrinq; capitibus tumidus, mollis, sine medulla cartilaginofus. medius  
teres, durus, medulloſus, leniter gibbus, & in priorem & posteriorem,  
interiorem & exteriorem partem. prior autem pars est quæ à pecto  
re est, posterior quæ ab scapulis, interior quæ ad latus tendit: exteri  
or quæ ab eo recedit. quod ad omnes articulos pertinere in ueteriori  
bus patebit. superius autem humeri caput rotundius quàm cætera  
ossa, de quibus adhuc dixi, uerticillatis scapularum ossibus paruo ex  
cessu inseritur: ac maiore parte ex transitu nervis deligatur. at infe  
rius duos processus habet: inter quos quod medium est, magis etiā ex  
tremis partibus sinuatur. quæ res sedem brachio præstat: quod con  
stat ex ossibus duobus. radius, quam νεῦνδα græci appellant, supe  
rior, breuiorq; & primo tenuior rotundo, & leniter cano, capite exi  
guum humeri tuberculum recipit: atq; ibi nervis, & cartilagine conti  
netur. cubitus inferior, longiorq; & primo plenior in summo capite,  
duobus quasi uerticibus extantibus in sinu humeri, quem inter duos  
processus eius esse proposui, se inserit. primo uero duobus radijs bra  
chij ossa iuncta paulatim dirimuntur: rursusq; ad manū coeunt mo  
do crassitudinis mutato: siquidem ibi radius plenior, cubitus admodū  
tenuis est. dein radius in caput cartilaginofum consurgens, in uerti  
cem eius sinuatur. cubitus rotundus in extremo, parte altera paulū  
procedit. ac ne sæpius dicendum sit, illud ignorari non oportet. plu



rima ossa in cartilagine desinere: nullum articulum non sic finire. neq; enim aut moveri posset, nisi leui immuteretur: aut cum carne, nervisq; coniungi, nisi ea media quædam materia committeret. in manus uero prima palmæ pars ex multis, minutisq; ossibus constat, quorum numerus incertus est. sed oblonga omnia, & triagula structura quædam inter se connectuntur: cum inuicem superior alterius angulus, alterius planities sit: eoque fit ex his unius ossis paulum in interiora concavi species. uerum ex manu duo exigui processus in sinus radij coniunguntur. tum ex altera parte recta quinque ossa ad digitos tendentia palmam explent, à quibus ipsi digiti oriuntur: qui ex ossibus ternis constant: omniumq; eadem ratio est. interius os in uerticem sinuatur: recipitq; exterioris exiguum tuberculum, nerviq; ea continent, à quibus orti ungues indurescunt. ideoq; non ossi, sed carni magis radicibus suis inhaerent. ac superiores quidē partes sic ordinatæ sunt. ima uero spina in coxarū osse discedit, quod transversum, longeq; ualentissimum uulvam, uesciam, rectum intestinum tuetur, idq; ab exteriori parte gibbū ad spinam, resupinatum à lateribus, idest in ipsis coxis sinus rotundos habet: à quibus oritur os quod pectinem uocat. idq; super intestina sub pube transversum uentrem firmat rectius in uiris: recurvatum magis in exteriora in foeminis, ne partum prohibeat. inde foemina oriuntur: quorum capita rotundiora etiam quā humerorum sunt, cum illa ex cæteris rotundissima sine. infra uero duos processus à priore, & à posteriore parte habent. dein dura, et medullosa, & ab exteriori parte gibba habent: rursus ab inferioribus quoq; capitibus intumescunt: superiora in sinus coxæ sicut humeri in ea ossa, quæ scapularum sunt, coniunguntur. tum infra introitus leniter intendunt, quo æqualius superiora membra sustineant. atq; in eo inferiora quoq; capita media sinuantur, quo facilius exapi à cruribus possint: quæ commissura osse paruo molli cartilaginoso tegitur: patellam uocant. hæc super innatans, nec ulli ossi inhaerens, sed carne, et nervis deligata, pauloq; magis ad femoris os tendens, inter omnes crurum flexus iuncturam tuetur ipsum autem crus est ex ossibus duobus. & enim per omnia femur humero, crus uero brachio simile est. adeo ut habitus quoq; & decus alterius ex altero cognoscatur. quod ab ossibus incipiens, etiam in carne respondet. uerum alterum os ab exteriori parte supra positum est, quod ipsum quoque sura recte nominatur. id breuius, supraq; tenuius ad ipsos talos intumescit. alterum à priore parte positum, cui tibiæ nomen est, longius, & in superiore parte plenius, solum cum femoris inferiore capite committitur: sicut cum humero cubitus. atq; ea quoq; ossa infra, supraq; coniun-



## LIBER

Et media ut in brachio dehiscunt. exapitur autē crus infra ossa ex transuerso talorum, idq; ipsum super os calcis situm est, quod quadā parte sinuatur: quadam excessus habet: Et procedentia ex talo recipit: Et in sinum eius inseritur. idq; sine medulla durum, magisq; in posteriorem partem proiectum teretem ibi figuram representat. cætera ossa pedis ad eorum quæ in manu sunt similitudinem instructa sunt. plantæ palmæ, digiti digitis, ungues unguibus respondent.

Ossa uiciata, Et corrupta quibus signis cognoscantur: Et qua ratione curentur. Cap. II.

¶ Mane autem os ubi iniuria accessit, aut uiciatur, aut finditur, aut frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut loco mouetur, id quod uiciatum est, primo ferē pingue fit: deinde uel nigrum, uel cariosum: quæ super natis grauibz ulceribus, aut fistulis: hisq; uel longa uetustate, uel etiam cancro occupatis eueniunt. Oportet autem ante omnia os nudare ulcere exciso: Et si latius eius uicium est, quàm ulcus fuit, carnem subsecare, donec integrum os undiq; pateat: tum id quod pingue est semel, iterum'ue satis est admoto ferramento adurere, ut ex eo statu secedat: aut eradere donec iā aliquid cruoris ostendatur: quæ integrioris nota est. nam necesse est aridum sit id, quod uiciatum est. idem in cartilagine quoq; læsa faciendum est. si quidem ea quoq; scalpello radenda est, donec integrum id sit, quod relinquitur. deinde siue os, siue cartilago rasa est, nitro bene trito respargendum est. neque alia facienda sunt ubi caries, nigrities'ue in summo osse est. si quidem id uel paulo diutius eodem ferramento adurendum, uel radendum est. qui radit hæc, audacter imprimere ferramentum debet, ut Et agat aliquid: Et maturius desinat. finis est, cum uel ad album os, uel ad solidum uentum est. albo finiri ex nigritie uitium, soliditate quadam ex carie manifestum est: accedere etiam cruoris aliquid integro supra dictum est. si quando autem altius descenderit, utrumlibet dubium est: in carie quidem expedita cognitio est. specillum tenue in foramen demittitur. quod magis, minus'ue intrando, uel in summo cariam esse, uel altius descendisse testatur. nigrities colligi quidem potest etiam ex dolore, Et ex febre. quæ ubi mediocria sunt, illa alte descendisse non potest: manifestior tamen ad acta terebra fit. nam finis uicij est, ubi scabris nigra esse desijt. igitur si caries alte descendit, per terebram urgenda crebris foraminibus est: quæ altitudine uicium æquent. tum in ea foramina demittenda candētia ferramenta sunt: donec inde sicum os ex toto fiat. simul enim post hæc Et resoluetur ab infirioe osse quodcumq; uiciatū



est: & his sinus carne replebitur: & humor aut nullus postea fere-  
tur, aut mediocris. sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram  
quoque partem ossis transit, oportet excidi. atque idem in carie quoque  
ad alteram partem ossis penetrante fieri potest. sed quod totum uicia-  
tum, totum eximendum est. si inferior pars integra est, catenus quod  
corruptum est, excidi debet. item siue capitis, siue pectoris os, siue co-  
ssa cariosa est, inutilis uicio est: & excidendi necessitas est. neque audien-  
di sunt qui osse nudato diem tertium expectant, ut tunc excidant. an-  
te inflammationem enim tutius omnia tractantur. itaque quantum fie-  
ri potest eodem momento & cutis incidenda est, & os detegendum: et  
omni uicio liberandum est. longeque perniciosissimum est, quod in osse  
pectoris est: quia nix etiam si recte cessit, curatio uera sanitatem reddit.

Quomodo os excidatur, & de modiolis, & terebra fer-  
ramentis ad id paratis. Cap. III.

Exciditur uero os duobus modis: si paruum est, quod le-  
sum est, modiolis, quem *χοιρίδιον* greci uocant si spaciosus, te-  
rebris. uiriusque rationem proponam. Modiolus ferramentum  
concauum, teres est imus oris ferratum, per quod medium clauus ipse  
quoque interiore orbe cinctus demittitur. Terebrarum autem duo gene-  
ra sunt: alterum simile ei quo fabri utuntur. alterum capituli longo-  
ris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subito latius fit: atque iterum  
ab alio principio paulo minus quam equaliter sursum procedit. si ui-  
cium in angusto est, quod comprehendere modiolus possit, ille potius  
aptatur. & si caries subest, medius clauus in foramen demittitur. si  
nigrities, angulo scalpri sinus exiguus fit, qui clauum recipiat, ut eo  
insistente circumactus modiolus delabi non possit. deinde is habena  
quasi terebra conuertitur. estque quidam premendi modus, ut & fore-  
tur, & circumagatur. quia si leuiter imprimatur, parum proficit. si  
grauiter, non mouetur. neque alienum est instillare paulum rosae uel la-  
ctis, quo magis lubrico circumagatur. quod ipsum tamen si copiosius  
est, aciem ferramenti hebetat. at ubi iam iter modiolis pressum est,  
medius clauus educatur: & ille per se agitur. deinde cum sanitas in-  
ferioris partis scobe cognita est, modiolus remouetur. at si latius uici-  
um est, quam ut illo comprehendatur, terebra res agenda est. ea fo-  
ramen fit in ipso sine uiciosi ossis atque integri: deinde alterum non ita  
longe. tertiumque donec totus is locus, qui excidendus est, his cauis cin-  
ctus sit. atque ibi quoque quatenus terebra agenda sit, scobis significat.  
tunc excisarius scalper ab altero foramine ad alterum malleolo ada-



Etus: id quod inter utrunq; medium est, excidit: ac sic ambitus similis  
 ei fit, qui in angustiore orbem modio imprimitur. utro modo ue-  
 ro id circumductum est, idem exorsus scalper in osse corrupto pla-  
 nus summam quanq; testam laesit, donec integrum os relinquatur.  
 Vix unquam nigrities integrum, caries per totum os perumpit: ma-  
 ximeq; ubi uitiata caluaria est. Id quoq; signi specillo significatur, qui  
 depressus in id foramen, quod infra solidam sedem habet: Et ob id  
 renitens aliquid inuenit, Et madens exit. si peruium inuenit, altius  
 descendens inter os, Et membranam nihil oppositum inuenit: educa-  
 turq; sians, non quo non subsit aliqua vitiosa sanies, sed quoniam  
 ibi, ut in latiore sede diffusa sit. Siue autem nigrities, quam terebra  
 detexit: siue caries, quam specillum ostendit, os transit: modiolus quide-  
 m usus fere supernacius est: quia latius pateat necesse est, quod iam alte  
 processit. terebra uero ea, quam secundo loco posui utendum, eaq; ne  
 nimis incalascit, subinde in aquam frigidam demittenda est. sed tum  
 maiore cura agendum est: cum iam aut simplex os dimidium perfo-  
 ratum est: aut in duplici, superius illud, spacium ipsum, hoc sanguis  
 significat. ergo tum lentius ducenda habena: suspendaq; magis sini-  
 stra manus est, Et saepius attollenda: Et foraminis altitudo conside-  
 randa: ut quandoq; os perumpitur sentiamus: neq; periclitemur,  
 ne mucrone cerebri membrana laedatur: ex quo graues inflammatio-  
 nes cum periculo mortis oriuntur. factis foraminibus eodem modo me-  
 dia saepe, sed multo circumspectius excidenda sunt: ne forte angulus  
 scalpri eandem membranam uolet: donec fiat aditus, per quam me-  
 branae custos immittatur: *μνηστρού λανας* graeci uocant. lamina aenea  
 est firma, paulum resina, ab exteriori parte laeuis, quae demissa est,  
 us exterior pars eius cerebro propior sit. subinde ei subiicitur quod  
 scalpro discutiendum est. ac si excipit eius angulum, ultra transire  
 non patitur: eoq; Et audacius, Et tutius scalprum malleolo subinde  
 medicus ferit, donec excisum undiq; os eadem lamina leuetur: tolliq;  
 sine ulla noxa cerebri potest. Vbi totum os eiecitum est, circum raden-  
 da, leuandaq; sunt ora: Et si quid scobis membranae insedit, colligen-  
 dum. ubi superiori parte sublata, inferior relicta est, non ora tantum,  
 sed os quoq; totum lauandum est: ut sine noxa postea cutis increseat.  
 quae aspero osse innascens protinus non sanitatem, sed novos dolores  
 mouet. patefacto cerebro qua ratione agendum sit, dicam, cum ad fra-  
 cta ossa peruenero. si basis aliqua seruata est, superimponenda sunt  
 medicamenta non pingua, quae recentibus uulneribus accommodan-  
 tur: supraq; imponenda lana succida oleo, atq; aceto madens. ubi te-  
 pus processit, ab ipso ore caro increscit, eaq; factum manu sinum co-



plet. si quod etiam os adustum est, à parte sana recedit: subitq; inter integram atq; emortuam partem carumcula: quæ quod abscissit, expellat. eaq; ferè quia testa tenuis, & angusta est: squama, idest æris à græcis nominatur. Potest etiam euenire, ut ex ictu neq; findatur os, neq; perfringatur: sed summum tamè collidatur, exaspereturq; quod ubi incidit, radi, & lauari satis est. hæc quauis maxime sunt in capite, tamen cæteris quoq; ossibus communia sunt: ut ubicunq; idem incidet, eodem remedio sit utendum atq; cum ea fracta, fissa, forata, collisa sint: quasdam proprias in singulis generibus, quasdam communes in pluribus curationes requirunt. de quibus protinus dicam, initio ab eadem caluaria accepto.

## De caluariæ curatione.

## Cap. IIII.

Citur ubi ea pertusa, protinus requirendum est, num bilis homo uouerit: num oculi eius obcæcati sint: num obmutuerit: num per nares, aures uel sanguis ei effluxerit: num coniderit: num sine sensu quasi dormiens iacuerit. hæc enim non nisi osse fracto eueniunt. atq; ubi inciderunt, scire licet necessariam, sed difficilem curationem esse. si uero etiam torpor accessit, si mens non constat, si neruorum uel resolutio, uel distentio secuta est: uerisimile est etiam cerebri membranam esse uiolatam: eoq; in angusto magis spes est. at si nihil horum secutum est, potest etiam dubitari an os fractum sit. & protinus considerandum est, lapide, an ligno, an ferro, an alio telo percussum sit. et hoc ipso leni, an aspero, mediocri, an uastiore: uehementer, an leniter. quia quo mitior ictus fuit, eo facilius os ei resitisse credibile est. sed nihil tamen melius est, quàm certiore id nota explorare. ergo qua plaça est, demitti specillum oportet, neq; nimis tenue, neq; acutum: ne cum in quosdam sinus naturales incidet, opinionem fracti ossis frustra faciat: neq; nimis plenum, ne paruule rimule fallant. ubi specillum ad os uenit, nihil nisi lene, & lubricum occurrit: integrum id uideri potest. si quid asperi est, utique quasuture non sint, fractum os esse testatur. à futuris se deceptum esse Hippocrates memoriæ prodidit more scilicet magnorū uirorū, & si duca magnarū rerum habentium. nam leuia ingenia, quia nihil habent: nihil sibi detrahunt. magno ingenio, multaq; nihilominus habeturo conuenit etiā simplex ueri erroris confessio, præcipueq; in eo ministerio quod utilitatis causa posteris traditur. ne qui deapiatur eadē rōne, qua quis ante deceptus est. sed hæc quidem aliquā memoria magis professoris uti interponeremus effect. potest aut futura eo na-



## LIBER

mine fallere. quæ æque aspera est, ut aliquis hanc esset, etiam si rima est, existimet eo loco, quo subesse hanc uerisimile est. ergo eo nomine decipi non oportet: sed os aperire tutissimum est. nam neque utique certa sedes ut supra posui, futurarum est: et potest idem, et natura liter commissum, et ictu fissum esse: iuxta uero aliquid fissum habere. Quin aliquid etiam, ubi ictus fuerit uehementior, quamuis specillo nihil inuenitur: tamen aperire commodius est. at si ne tum quidem rima manifesta est, inducendum super os attramentum scriptorium est: deinde scalpro id detrahendum. nigritiem enim continet si quid fissum est. solet etiam euenire, ut altera parte fuerit ictus, et os altera fiderit. itaque si grauiter aliquis percussus est, si mala inditia subsecuta sunt, neque ea parte qua cutis discissa est, rima reperitur: non incommodum est parte altera considerare, nunquis locus mollior sit, et tumeat: eumque aperire. si quidem ibi fissum os reperietur. nec tamen magno negotio cutis sanescit, etiam si frustra detecta est. os fractum nisi suatursum est, grauibz inflammationibus affici: difficiliusque postea tractatur. raro, sed aliquando tamen euenit, ut os quidem totum integrum maneat: intus uero ex ictu uena aliqua in cerebri membrana rupta, aliquid sanguinis mittat. isque ibi concretus magnos dolores moueat: oculos quibus obcecet. sed fere contra id dolor est, et eo loco cute incisa pallidum os reperitur. ideoque id quoque os excidendum est. quacumque autem de causa curatio hæc necessaria est, si nondum satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec quicquid læsum est, in conspectu sit. in quo ipso uidendum est, nequid ex ipsa membrana, quæ sub cute caluariam cingit, super os relinquatur. si quidem hæc scalpro, et rebris uel lacerata uehementes febres cum inflammationibus excitat. itaque eam commodius est ex toto ab osse diduci. plagam, si ex uulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus. si manu facta est, ea fere commodissima est, quæ duabus transversis lineis litteræ X. figuram accipit: ut deinde à singulis procedentibus lingulis cutis subsequatur. inter quæ si sanguis fertur, spongia subinde in aceto tincta cohibendus est: occupandusque obiectis linamentis. et caput altius excitandum. neque id uicium ullum metum, nisi inter musculos, qui tempora continent, affert: sed ibi quoque nihil tutius fit. In omni uero fisso, fracto uel osse protinus antiquiores medici ad ferramenta ueniebant: quibus id exciderent. sed multo melius est, ante emplastra experiri, quæ caluariæ causa componuntur: eorumque aliquid oportet ex aceto molitum per se super fissum, fractum uel os imponere. deinde super id aliquanto latius quam uulnus est, eodem medicamento illitum linteolū, et præterea suadam lanam aceto tinctam. tunc uulnus deligare, et quotidie



quotidie resolvere, similiterq; curare usq; ad diem quintum. à sexto die etiam uapore aquæ calidæ per spongiam fouere. cætera ex eadem facere. quod si caruncula increfcere cœperit, et febricula, aut soluta erit, aut leuior et cupiditas abi reuerterit, satisq; somni accedet: in eodem medicamento erit perseverandum. Procedente deinde tempore emolliendum id emplastrum adiecto cerato ex rosa factò, quo facilius carnem producat. nam per se reprimendi uim habet. hac ratione sepe rimæ callo quodam impletur, estq; ea, ossis uelut cicatrix. et latius fracta ossa, si qua inter se non cohærebant, eodem callo glutinantur: estq; aliquanto melius uelamentum cerebro, quam caro quæ exciso osse increfcit. si uero sub prima curatione febris intenditur, breuesq; somni, et idem per somnia tumultuosi sunt, ulcus madet: neq; alitur: et in ceruicibus glandulæ oriuntur: magni dolores sunt: ubiq; super hæc fastidium increfcit: tum demum ad manum, scalprumq; ueniendum est. duo uero sub ictu caluariæ pericula sunt, ne uel findatur, uel medium desinat: si fissum est, possunt oræ esse compressæ: uel quia altera super alteram excessit: uel etiam quia uehementer rursus se commiserunt. ex quo euenit ut humor ad membranam quidem descendat, exitum uero non habeat: ac sic eam irriter, et graues inflammationes moueat. ubi medium desedit, eandem cerebri membranam os urget. interdum etiam ex fractura quibusdā uelut aculeis pungentibus: his ita succurrendum est, ut tamen quam minimum ex osse dematur. ergo si ora alteri infedit, satis est id quod eminet plano scalpro excidere. quo sublato iam rima hiat quantum curationi satis est. at si oræ inter se comprimuntur, à latere eius interposito digiti spacio, terebra foramen faciendum est: ab eoq; scalper duabus lineis ad rimam agendus ad similitudinem. C. litteræ, sicut uertex eius à foramine basis ad rimas it: quod si rima longius patet, ab altero foramine rursus similis sinus fieri debet: et ita nihil latens in eo esse concitum est: abundeq; exitus datur intus lædentibus. ne si fractum quidem os desedit, totum excidi necesse est. sed siue totum perfractum est, et ab alio ex toto recessit, siue circumpositæ caluariæ inhæret, exigua parte ab eo quod naturaliter se habet, scalpro diuidendum est. deinde in eo quod desedit, iuxta rimam quam fecimus, foramina addenda sunt. si in angusto noxa est, duo. si latius patet, tria, septaq; eorum excidenda: et tum scalper utrinque ad rimam agendus sic, ut lunatum sinum faciat: imaq; pars eius intus ad fracturam, cornua ad os integrum spectent. deinde si qua labent, et ex facili remoueri possunt, forfice ad id facta colligenda sunt, maximeq; ea quæ acuta membranam infestant: si id ex facili fieri non po-

Aurelij Cor.

f



est: subiicienda lamina est, quam custodem eius membranae esse pro-  
positum: et super eam quicquid spinosum est, et intus eminet, excide-  
dum est, eadem lamina quicquid deorsum infedit, attollendum. hoc  
genus curationis efficit, ut qua parte fracto ossa tamen inhaerent, soli-  
dentur. qua parte abrupta sunt, sine ullo tormento sub medicamento  
tempore excidant, spatiumque inter haec satis illi magnum ad extra-  
hendam sanem relinquatur: plusque in osse propugnaculi cerebrum  
habeat, quam habiturum fuit eo exciso. his factis ea membrana acri-  
aceto respergenda est, ut siue aliquid sanguinis ex ea profluit, cohibe-  
atur: siue intus concretus cruor remanet, discutatur. tum idem me-  
dicamentum eodem modo, qui supra positus est, mollium ipsi mem-  
branae imponendum est. ceteraque eodem modo facienda sunt, quae ad  
linetulum illitum, et lanam succidam pertinent. collocandusque is loco  
intepido: et curandum quotidie vulnus, his etiam aestate. quod si me-  
brana per inflammationem intumuerit, infundenda erit rosa tepi-  
da si usque eo tumebit, ut super ossa quoque emineat: coercebit eam bene-  
trita lentacula, uel folia uitis contrita, et cum recenti uel butyro, uel  
adipe anserino mixta, ceruixque molliori debebit liquido cerato ex iri-  
no facto. at si parum pura membrana uidebitur par modus eius em-  
plastri, et mellis miscendus erit, idque superinfundendum, eiusque con-  
tinendi causa unum, aut alterum linamentum iniiciendum, et super  
linetolo, cui emplastrum illitum sit, contegendum. ubi plus pura mem-  
brana est, eadem ratione adiciendum emplastro ceratum, ut carne  
producat quod ad abstinentiam uero et primos, ultioresque cibos, po-  
tionesque pertinet. eadem quae in uulneribus praecipi, seruanda sunt:  
eo magis, quo periculosius haec pars afficitur. quin etiam cum iam non  
solum sustineri, sed aliis quoque apparebunt: tamen erunt uitanda  
quae cumque mandenda sunt. item fumus, et quicquid excitat sternuta-  
mentum spem uero certam facium membrana mobilis ac sui coloris,  
atro increscens rubicunda, facili motus maxillae, atque ceruicis. mala  
signa sunt. membrana immobilis nigra, uel liuida, uel aliter coloris  
corrupti, dementia, acris uomitus, nervorum uel resolutio, uel disten-  
tio: atro liuida, maxillarum rigor, atque ceruicis. ceteraque quae ad so-  
mnium, cibi desiderium, febrem, puris colorem attinent: eadem quae  
in ceteris uulneribus, uel salutaria, uel mortifera sunt: ubi bene res-  
cedit, inapit ab ipsa membrana, uel si os eo loco duplex est, inde  
quoque atro increscere: eaque id, quod inter ossa natum est, replet. non-  
nunquam etiam super caluariam excrescat. quod si incidit, insper-  
genda squama aeris est, ut id reprimat, cohibeatque, ea carni superda-  
do quae ad cicatricem perducant. omnibusque ea locis commode induca-



tur, excepta frontis ea parte, quæ paulum super id est, quod inter supercilia est. ibi enim vix fieri potest, ut non per omnem ætatem sit exulceratio, quæ lintolo medicamentum habente contingenda sit: illa utiq; capite fracto seruanda sunt: ut donec iam valida cicatrix erit soluenda, uidentur frequens balneum, maior uini modus.

De narium fracturarum curatione. Cap. V.

¶ In nariibus uero et os, et cartilago frangi solet, et quidem modo aduersa, modo à latere: si aduersa fracta sunt, alterum uel ex his, nares desidunt, difficulter spiritus trahitur. si à latere os fractum est. is locus cauius est. si cartilago, in altera partem nares declinantur. quicquid in cartilagine incidit, excitandū leniter est, aut subiecto specillo, aut duobus digitis utrinq; compressis. deinde in longitudinem implicata linamenta et molli pellicula circumdata, circumfusaq; intus adijcienda sunt. aut eodem modo composita aliquid ex arido penicillo. aut grandis pinna gummi, uel fabuli glutine illita, et molli pellicula circumdata, quæ desidere cartilaginem non sinat. sed si aduersa ea fracta est, æqualiter utraq; naris implenda est. si à latere, crassius esse debet ab ea parte in qua natus iacet, ab altera tenuius in id quod inferitur. extrinsecus autem circumdanda habena est mollis media illita mixtis inter se simula, et tursi fuligine. eaq; ultra aures ducenda, et fronti duobus capitibus agglutinanda est. id enim corpori quasi gluten inhaerescat: et cum induruit nares commodè continet sin quod intus inditum est, ledit: sicut maxime fit, ubi interior cartilago perfracta est, excitata nares eadem tantummodo habena continendæ sunt. deinde post quatuordecim dies id ipsum demendum est. resoluitur autem aqua calida: eaq; tum is locus quotidie fouendus est. sin os fractum est, id quoq; digitis in suam sedem reponendum est. atq; ubi aduersum, ut dictum est, utraq; naris implenda est. ubi à latere, ea inquam os impulsum est. imponendūq; ceratum, et paulo uehementius deligandum est: quia callus eo loco non ad sanitatem tantummodo, sed etiam ad tumorem increscit. à tertio die fouendum id aqua calida est: tantoq; magis, quanto propius esse sanitati debet. quod si plura erunt fragmenta, nihilominus extrinsecus singula in suas sedes digitis erunt compellenda: imponendaq; extrinsecus eadem habena, et super eam ceratum, neq; ultra fascia adhibenda est. at si quod fragmentum undique resolutum cum cæteris non glutinabitur, intelligitur quidem ex humore, qui multus ex ulnere fertur: uolSELLA uero extrahetur. finis



tisq; inflammationibus imponetur aliquod medicamentum ex ijs, quæ leniter reprimunt. peius est ubi aut ossi, aut cartilagini fractæ cutis quoq; vulnus accessit. id admodum raro fit: si incidit, illa quidem nihilominus eadem ratione in suas sedes excitanda sunt. cuti uero super imponendum emplastrum aliquod ex his, quæ recentibus vulneribus accommodata sunt: sed insuper nullo uinculo deligandum est.

De aurium fractarum curatione. Cap. VI.

**I**n aure quoq; interdum rumpitur cartilago. quod si incidit, antequam pus oriat, imponendum glutinans medicamentum est. sæpe enim suppurationem prohibet, & aurem confirmat. illud & in hac, & in naribus ignorari non oportet: non quod cartilagine ipsam glutinari, circa tamen carnem incrementum, solidariq; eum locum. itaq; si cum cute cartilago rupta est, cutis utrinq; sinitur. nunc autem de ea dico, quæ cute ita frangitur. in ea uero si iam pus natum est, aperienda altera parte cutis: & ipsa cartilago contra lunata plaga excidenda est. deinde utendum est medicamento leniter suppressante, quale lycium est aqua dilutum, donec sanguis fluere desinat. tum imponendum linteolū cum emplastro sic, ut pingue omnis nitetur: & à parte posteriore lana mollis auri subijcienda est: quæ, quod est inter hanc & caput, compleat. tum ea leniter deliganda est: & à tertio die uapore, ut in naribus posui, fouenda. atq; in his quoq; generibus abstinentia primi temporis necessaria est, donec inflammatio finiatur.

De maxillæ fractæ curatione, deq; quibusdam ad omnia ossa pertinentibus. Cap. VII.

**A** his ad maxillam uenturus indicanda quædam puto communiter ad omnia ossa pertinentia, ne sæpius eadem dicenda sint. Omne igitur os modo rectum ut lignum in longitudinem finditur: modo frangitur transversum: interdum obliquum, atq; id ipsum nonnunquam retusa habet capita: nonnunquam acuta. quod genus pessimum est: quia neq; facile committuntur, quæ nulli retuso inuidentur, & carnem vulnerant: interdum nervum quoque, aut musculum: quin etiam aliquando plura fragmenta à fragmento fiunt. sed in alijs quidem ossibus ex toto sæpe fragmentum à fragmento recedit. Maxillæ uero semper aliqua parte, etiam uexata ossa inter se coherent. igitur in primis digitis duobus utrinq; prementibus, & ab ore, & ab cute omnino ossa in suam sedem compellenda sunt. deinde



inde si trasversa maxilla fracta est, sub qua casu ferè dēs super proximum dentem excedit: ubi ea in suam sedem collocata est: duo proximi dentes, aut si hi labant, ultiores inter se seta deligandi sunt. id in alio genere fracturæ supernacuum est. cetera eadem facienda sunt. nam linteolum duplex madens uino, & oleo super iniiciendum cum eadem simla, & eadem turis fuligine est. deinde aut fasciæ, aut mollis habena media in longitudinem inosa, ut utrinq; mentum complectatur, & inde capita eius supra caput adducta ibi deligantur. illud quoq; ad omnia ossa pertinens dictum erit: sanum primum esse necessariam: deinde à die tertio humidum cibum, sublata inflammatione paulo plenorem: eumq; qui carnem alat, per omne tempus uinum esse alienum. deinde tertio die resolui debere: foveriq; per spongram uapore aquæ calidæ: eademq; quæ primo fuerunt super dari. item die quinto fieri, & donec inflammatio finiatur: quæ uel octauo die, uel septimo ferè resoluitur. ea sublata, rursus ossa esse tractanda, ut si quod fragmentum loco suo non est, reponatur. neq; id esse soluedum, nisi duæ partes eius temporis, intra quod quæq; ossa conseruntur, transierint. fere uero intra quartumdecimum & unum et uigesimalium diem sanescunt maxilla, malæ, iugulum, pectus, latus, os scapularum, costæ, spina uoxarum, os tali, calx, manus, planta. inter uigesimalium & trigesimalium diem crura, brachiaq; inter septimū & uigesimalium & quadragesimum humeri, & femina. sed in maxilla illud quoq; adiiciendum est, quod humidus abusus diu assumendus est. atq; etiam cum tempus processit, in lagano, similibusq; alijs perseuerandum, donec ex toto maxillam callus firmarit. item utique primis diebus habendum silentium.

## De iuguli fracti curatione. Cap. VIII.

Iugulum uero si transversum fractum est, nonnunquam per se rursus recte coit: & nisi mouetur, sanari sine iunctura potest. nonnunquam uero, maximeq; ubi motum est, elabitur fereq; id quod à pectore, sub id quod ab humero est, in posteriorem partem inclinatur. cuius ea ratio est, quod per se non mouetur: sed cum humeri motu consentit. itaq; eo subsistente sub id humerus angitur. raro uero ad modum in priorem partem iugulum inclinatur: adeo ut magni professores nunquam se uidisse memorie mandarent. sed locuples tamen eius rei auctor Hippocrates est. uerū ut dissimilis uterq; casus est, sic quædam dissimilia requirit. ubi ad scapulas iugulum tendit, simul dextra manu planè propellendus in posteriorem partem humerus est, & illud in priorem attrahendum. ubi ad

Aurelij Cor.

s ij



pectus conuersum est: ipsum quidem retro dandum: humerus autem in priorem partem adducendus est. ac si is inferior est, non id quod à pectore est, deprimendum est, quia immobile est: sed humerus ipse attollendus. si casu superior est, id quod à pectore est: implendum lana: & humerus ad pectus deligandus est. si acuta fragmenta sunt, incidi contra cutis debet: ex ossibus ea, quæ carnem vulnerant, præcidenda sunt. tunc retusa ossa cõmittenda sunt. si quod ab aliqua parte eminet, opponendum ei triplex linteolum est in uino, & oleo tinctum. si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula facto canaliculo, eodemq; intus incerato, ne fasciæ diducatur. quæ ingulo composito circumdanda est sæpius, potius quàm ualentius. quod ipsum quoq; in omnibus ossibus fractis perpetuum est. à dextro uero ingulo, si id fractum est, ad alam sinistram: à sinistro ad dextram: rursumq; sub ala sua fasciari debet. post hæc si ingulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus. si in partem priorem, ad ceruicem deligandum est. supinusq; homo collocandus: cæteraq; eadem facienda, quæ supra comprehensa sunt. sunt uero plura ossa ferè immobilia uel dura, uel cartilaginosa, quæ uel franguntur: uel forantur: uel colliduntur: uel finduntur. ut malæ, pectus, latus, os scapularum, costæ, spina costarum, os tali, calx, manus, planta. horum omnium eadem curatio est, si supra uulnus est, id suis medicamentis nutriendum est. quo sanescente rimas quoq; ossis, aut si quod ferrumen est, callus implet. si cutis integra est, & os læsum esse ex dolore colligimus: nihil aliud, quàm quiescendum: imponendumq; ceratum est, & leniter deligandum, donec sanitate ossis dolor finiatur.

## De costarum fracturarum curatione. Cap. IX.

Proprie tamen quædam de costa dicenda sunt: quia iuxta uiscera est: grauioribusq; periculis is locus expositus est. hæc quoq; igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars eius, quæ rara est, lædatur: interdum fit, ut eā totam is casus perruperit. si tota fracta nō est, nec sanguis expuitur: nec febricula sequitur: nec quicquam suppurat, nisi admodum rare, nec dolor magnus est: tactu tamen is locus leniter indolescit: abunde est eadem, quæ supra scripta sunt, facere: & à media fasciæ incipere deligare, ne in alterutram partem hæc cutem inclinet. ab uno uero & uigesimo die quo utiq; os esse debet glutinatum, id agendum. cibis uberioribus est utendum, ut corpus quamplenissimū fiat: quo melius os uestiat. quod illo loco tenerū, adhuc iniuriæ sub tenui cute ex=



positum est. per omne autem tempus curationis uitandus clamor, sermo quoque, tumultus, ira, motus uehementior corporis, fumus, puluis: et quicquid uel tussim, uel sternutamentum mouet. ne spiritum quidem magnopere continere expedit. at si tota costa perfracta est, casus asperior est. nam et graues inflammationes, et febris, et suppuratio, et saepe uitae periculum sequitur: et sanguis spuitur. ergo si uires patiuntur ab eo brachio, quod super eam astitam est, sanguis mittendus est. si non patiuntur, alius tamen sine ullo acri ducenda est: diutiusque inedia pugnandum. panis uero ante septimum diem non assuendus: sed una sorbitione uiuendum: imponendumque ei loco ceratum ex lino factum: cui cocta quoque resina adiecta sit: aut Polyarchi malagma, aut panacis ex uino, et rosa, et oleo: superque imponenda lana succida, mollis, et duae fasciae a medijs orsa, minimaque astrictae. Multo uero magis omnia uitanda, quae supra posui, adeo ut ne spiritus quidem saepius mouendus sit. quod si tussis instabit, ad id potio sumenda erit, uel ex tryx agne, uel ex ruta, uel ex herba stychia de, uel ex cumino, et pipere. Grauioribus uero doloribus urgentibus cataplasma imponi quoque conueniet, uel ex lolio, uel ex hordeo, cui pinguis sit tertia pars sit adiecta. et id quidem interdum superiacebit noctu uero idem aut ceratum, aut malagma, aut pannus: quia potest cataplasma decedere. ergo quotidie quaeque resoluetur, donec iam cerato, aut malagmate possimus esse contenti. et decem quidem diebus extenuabitur fame corpus. ab undecimo uero alii incipit. ideoque etiam laxior quamprimum fasciae circumligabitur: fereque ea curatio ad quadragesimum diem perueniet: quae si modus erit suppurationis, plus malagma quam ceratum ad digerendum proficiet. si suppuratio uicerit neque per quae superscripta sunt discuti potuerit, omnis mora uitanda erit, ne os infra uicietur. sed qua parte maxime tumebit, demittendum erit candens ferramentum, donec ad pus perueniat: idque effundendum. si nusquam caput se ostendit: ubi maxime pus subit, sic intelligimus: creta amolia totum locum illinimus, et sicari patimur. quo loco maxima humor in ea perseverauit, ibi pus proximum erit: eaque uti debet. si latius aliquid abscedet, duobus aut tribus locis erit perforandum: demittendum erit linamentum, aut aliquid ex peniallo. quod summum lino sit deuinctum ut facile educatur. reliqua eadem, quae in ceteris adustis facienda sunt. ubi purum erit ulcus, aliud corpus debet, ne tabes perniciose futura id malum subsequatur. non nunquam etiam leuius ipso osse affecto et inter initia neglecto, non pus, sed humor quidam mucosus similis intus coit: mollescitque contra citis, in qua simili uestione utendum est.

S iij



## LIBER

### De spinæ curatione.

N spinæ quoque est quod proprie notemus. nam si id quod ex uertebra excedit, aliquo modo fractum est: locus quidē concavus fit: punctiones autem in eo sentiuntur, quia necesse est ea fragmenta spinosa esse. quo fit ut homo in interiorem partem subinde nitatur. hæc noscendæ rei causa sunt. medicamentis vero hisdem opus est: quæ plurima parte huius capitis exposita sunt.

De humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fracturâ, uel euiusorum, communibus curationibus. Cap. X.

Imiles rursus ex magna parte casus curationes quæ sunt humeris, & femoribus: communia etiam quedam humeris, brachijs, femoribus, cruribus, digitis. siquidem ea minime periculose media franguntur. quò propior fractura capiti uel superiori uel inferiori est: eò prior est. nam & maiores dolores affert: & difficilius curatur. ea maxime tolerabilis est simplex, transversa. peior ubi fragmenta, atque ubi obliqua. pessimum ubi eadem acuta. nonnunquam autem fracta in his ossa in suis sedibus remanent: multo sæpius excidunt: aliudque super aliud effertur. idque ante omnia cōsiderari debet. & sunt notæ certæ. si suis sedibus mota, resima, punctiōisque sensum representant, tactu inæqualia sunt. si uero non aduersa, sed obliqua iunguntur, quod fit, ubi loco suo non sunt: membrum id altero latere brevius est: & musculi eius tument. ergo si hoc depressum est, protinus id membrum oportet extendere. nam nervi, musculique intenti per ossa contrahuntur: neque in suum locum veniunt: nisi illos per uim aliquis intendit. rursus si primis diebus id obmissum est, inflammatio oritur: sub qua & difficile, & periculose uis nervis adhibetur. nam distentio nervorum uel cæcer sequitur: uel certum, ut mitissime alatur, pus. itaque si ante reposita ossa non sunt, postea reponenda sunt. intendere autem digitum, uel aliud quoque membrum: si adhuc tenerum est, etiam unus homo potest, cum alteram partem dextra, alteram sinistra prendit. ualentius membrum duobus eget: qui in diuersa contendunt. si firmiores nervi sunt, ut in uiris robustis, maximeque eorum feminibus, & cruribus euenit: habenis quoque uel linteis fascijs utrinque capita articularum deliganda, & per plures in diuersa ducenda sunt. ubi paulo longius quam naturaliter esse debet membrum uis fecit. tunc demum ossa manibus in suam sedem compellenda sunt: inditiumque ossi repositi est dolor sublatus. & membrum alteri parti æquatum inuoluendum duplicibus triplicis panni, & in uino, & oleo tinctis:



quos lineos esse commodius est. ferè uero his sex opus est. prima bre-  
uissima adhibenda, quæ circa fracturam ter uoluta sursum uersum  
feratur, & quasi in coctea serpat: satisq; est eam ter hoc quoq; modo  
circuire. altera dimidio longiore, eaq; qua parte os eminet, ab ea si to-  
tum æquale est, undelibet super fracturam debet incipere priori  
aduersa: deorsum tendere, atq; iterum de fractura reuersa in superio-  
re parte ultra priorem fasciam desinere. super has iniiciendum latio-  
re lineo ceratum est, quod eas contineat. ac si qua parte os eminet,  
triplex ea pannus obijciendus eodem uino & oleo madens. hæc ter-  
tia fasciæ comprehendenda sunt: quartaq; sic, ut semper insequens  
priori aduersa sit: & tertia tantum inferiore parte tres in superio-  
re faciant: quia satius est sæpius circuire, quàm adstringi. siquidem  
id quod adstrictum est, alienatur: & cancro opportunum est: articulum  
autem quamminime uincire opus est. sed si iuxta hunc os fractum est,  
necesse est. deligatum uero membrum in diem tertium continendum  
est. eaq; iunctura talis esse debet, ut primo die nihil offenderit: non  
tamen laxa uisa sit: secundo laxior: tertio iam penè resoluta. ergo tunc  
rursum id membrum deligandum: adijciendaq; prioribus quinta fa-  
sciæ est: iterumq; quinto resoluendum est: & sexta fasciæ inuoluen-  
dum sic, ut tertia & quinta infra cetera supra finiantur. quotiens-  
cunq; autem soluitur membrum, calida aqua fouendum est. sed si iux-  
ta articulum fractura est: diu instillandum uinum est. exigua por-  
te olei adiecta, eademq; omnia facienda donec adeo inflammatio sol-  
uatur: uel leuius quoq; quàm ex consuetudine id membrum fiat. quod  
si septimus dies non dedit, certe nonus exhibet. tum facillime ossa tra-  
ctantur. rursus ergo si parum commissa sunt, committi debent. si qua  
fragmenta eminent, in suas sedes reponenda sunt. deinde eodem mo-  
do membrum deligandum, ferulaq; super accomodanda sunt: quæ si  
fasciæ circumpositæq; ossa in sua sede contineant: & in quam partem  
fractura inclinat, ab ea laxior, ualentiorq; ferula imponenda est.  
easq; omnes citra articulum esse oportet resimas, ne hunc lædant: nec  
ultra astringi, quàm ut ossa contineant, & cum spatio laxentur: tertio  
quoq; die paulum habentis suis coartari: ac si nulla prurigo, nullus do-  
lor est, sic manere donec duæ partes eius temporis quod quoq; os cõ-  
seruet, compleantur: postea leuius aqua calida fouere: quia primo di-  
geri materiam opus est: tum euocari. ergo cerato quoq; liquido id ple-  
niter est unguendum: perfricandaq; summa cutis est: laxiusq; id deli-  
gandum est. tertio quoq; die soluendum sic, ut remota calida aqua ce-  
tera eadem fiant. tantummodo singulæ fasciæ quotiens resolutæ fue-  
rint subrahantur.



## De fracti humeri curatione.

**N**ec communia sunt illa propria. siquidem humerus fractus non sic, ut membrum aliud intenditur. sed homo collatur alto sedili: medicus autem humilior aduersus: una fascia brachium amplexa ex ceruice ipsius, qui laesus est, id su sineat. altera ab altera parte super caput data, ibi accipit nodum. Tertia iuncto imo humero deorsum demittitur, ibi quoque capitibus eius inter se iunctis: deinde ab occipito ipsius minister sub ea fascia, quam secundo loco posui: correpto si dexter humerus ducendus est dextro: si sinister, sinistro brachio demissum inter femina eius, qui curatur, baculum tenet. nudicus super eam fasciam de qua tertio loco dixi, planam inicit dextram: si sinister, sinistram, si dexter humerus sumatur. simulque alteram fasciam minister attollit: alteram premittit medicus. quo fit ut leniter humerus extendatur. fasciis uero, si medium aut imum os fractum est, breuioribus opus est: si summum, longioribus. ut ab eo sub altera quoque ala perfectus, et scapulas porrigantur. protinus uero brachium cum deligatur, sic inclinandum est, id quod afficit, ut ante fascias quoque sic figurandum sit, ne postea suspensum aliter aliter cum deligabatur, humerum inclinet. brachioque suspensio ipse quoque humerus ad latus leniter deligandus est. perque fit, ut minime moueatur: ideoque effa sic se habent, ut aliquis composuit. cum ad ferulas uentum est, extrinsecus esse earum longissimae debent, a lacerto breuiores: sed sub ala breuissimae. saepiusque eae resoluendae sunt, ubi in uicinia cubiti humerus fractus est: ne ibi nervi rigeant. et inutile brachium efficiant. quotiens solutae sunt, fractura manu continenda: cubitus aqua calida fouendus, et molli cerato perficiendus: ferulaeque uel omnino non imponendae contra eminentia cubiti: uel aliquanto breuiores sunt.

## De brachij fracti curatione.

**S**i brachium fractum est, in primis considerandum est alterum os, an utrumque comminutum sit: non quo alia in eiusmodi casu curatio admouenda: sed primum ut ualentius extendatur, si utrumque os fractum est: quia necesse est minus nervos contrahi altero osse integro, eosque intendente. deinde ut curiosius omnia in continendis ossibus fiant: si neutrum alteri auxilio est. nam ubi alterum integrum est, plus opis in eo, quam in fasciis, ferulaeque est. deligari autem brachium debet paulum pollice ad pectus inclinato: siquidem is maxime brachij naturalis habitus sit: idque inuolutum scutella commodissime excipitur: quae latitudine ipsi brachio perangu



his capitibus collo inijciuntur: atque ita commode brachium ex cervice suspendum est. idque paulum supra cubiti alterius regionem pendere oportet. quod si ex summo cubito id factum sit, glutinare id uniendo alienum est. sit enim brachium immobile. ac si nihil aliud quam dolori occursum est, idem qui fuit eius usus est.

De crurum femorumque fractorum curatione.

**I**N crure æque ad rem pertinet alterum saltem os integrum manere: commune uero ei femoriq; est. quod ubi deligatum est, in canalem coniiciendum est. is canalis et inferiori parte foramina habet: per quæ si quis humor excesserit, descendat: et a planta moram, quæ simul et sustineat eam: et delabi non patiatur: et a lateribus cana, perque loris datis mora quidem, crus, femurq; ut collocatum est, detineat. esse etiam is debet a planta si crus fractum est, circa popliteum. si femur, usque ad coxam. si iuxta superius caput femoris sic, ut ipsa quoque ei coxa sit. neque tamen ignorari oportet si femur fractum est, fieri brevius: quia nunquam in antiquum statum reuertitur: summisque digitis postea cruris eius insisti. sed multa tamen femori debilitas est: ubi fortune negligentia quoque accessit.

De fracti digiti curatione.

Digitum satis est ad unum firculum post inflammationem deligari.

Communes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitosque confractos pertinentia.

**I**S proprie ad singula membra pertinentibus, rursus illa communia sunt. primis diebus fames: deinde tum cum iam increscere calli oportet, liberalius alimentum. longa a vino abstinentia: fomentum aquæ calidæ. dum inflammatio est, liberale. cum ea desit, modicum. tum etiam longior ulterioribus et liquido cerato membris, et mollis tamen unctio. neque protinus exercendum id membrum: sed ad antiquos usus reducendum est. grauius aliquanto est, cum ossis fracture carnis quoque vulnus accessit: maximeque si id musculi femoris, aut humeri senserunt. nam et inflammationes multo grauiores, et propiores caneros habent. ac femur quidem si ossa inter se cesserunt, ferè præcidi necesse est. humerus uero quoque in periculum uenit: sed facilius conseruatur. quibus periculis etiam magis id expositum: quo d iuxta ipsos articulos ictum est. curiosius igitur agendum est: et musculus quidem per mediam plagam transversus præcidendus. sanguis uero, si parum fluxit, mittendus. corpus media extenuandum: ac reliqua quidem



## LIBER

membra lentius intendenda: & lenius in his ossa in suam sedem reponenda sunt. his uero neq; intendi nervos, neq; ossa tractari satis expedit. ipsiq; homini permittendum est, ut sic ea collocata habeat: quæ admodum minime lædunt. Omnibus autem his uulneribus imponendum primo linamentum est uino madens: cui rosæ paulum admodum adiectum sit. cætera eadem deliganda fasciis sunt, aliquanto quàm uulnus latioribus, laxius scilicet, quàm si ea plaga non esset. quanto facilius & alienari, & occupari cancro uulnus potest numero potius fasciarum id agendum est: ut laxæ quoq; æque contineant. quod in femore, humerog; sic fiet, si ossa forte recte concurrerint. sin aliter se habebunt, eatenus circumdari fasciæ debet, ut impositum medicamentum contineat cætera eadem quæ supra scripsi: faciendæ sunt: præterquam quod neq; ferulus, neq; canalibus, inter quæ uulnus sanescere non potest. sed pluribus tantummodo, & latioribus fasciis opus est: ingerendumq; subinde in eas est calidum oleum, & unum: magisq; in primo, fame utendo uulnus calida aqua fouendum: friguq; omni ratione uitandum: & transeundum ad medicamenta, quæ puri mouendo sunt: maiorq; uulneri quàm ossi cura agenda. ergo quotidie soluendum, nutriendumq; est. inter quæ si quod paruulum fragmentum ossis eminet, id si repositum est, in suam sedem dandum: si acutū, ante acumen eius longius est præcedendum: si breuius limandum: et utrinq; scalpro limandum. tum ipsum recondendum est. ac si id manus facere non potest, uolsella, quali fabri utuntur, iniicienda est. recte se habenti capiti ab ea parte, qua si ma est: ut ea parte qua cibra est, emans os in suam sedem compellat. si id maius est, membranaliquæ cinguntur, sinere oportet ea sub medicamentis resolui: idq; os, ubi iam nudatum est, abscondere: quod maturius scilicet faciendum est: potestq; ea ratione & os coire: & uulnus sanescere. illud suo tempore: hoc promt se habet. nonnunquam etiam in magno uulnere euenit ut fragmenta quædam uelut emoriantur: neq; cum cæteris coeant. quod hic quoq; ex modo fluentis humoris colligitur. quod magis necessarium est, sæpius ulcus resolvere, atq; nutrire. sequitur uero in id os per se post aliquot dies excidat: cum tam misera antea conditio uulneris sit. tamen id interdum maius, diutiusq; facies. sæpe enim integra cutis osse alrumpitur: protinusq; prurigo, & dolor oritur. quæ soluere, si accidit, maturius oportet: & fouere aqua per æstatem frigida: per hyemem egelida: deinde ceratum myrtum imponere. interdum fractura quibusdam uelut aculeis carnem uexat: quo à prurigo ne, & punctionibus cognito, aperire id melius, eoq; aculeos præcedere necesse habet. Reliqua uero curatio in utroque hoc casu eadem



est: quæ ubi ictus protinus intulit puro iam ulcere. cibus hic quoque  
 utendum est carnem producentibus: si breuius adhuc membrum est,  
 & ossa loco suo non sunt, paxillus tenuis quàm leuissimi generis inter  
 ea demitti debet sic ut capite paulum supra ulcus emineat: usq; quo-  
 tidie plenior adigendus est, donec par id membrum alteri fiat. tum  
 paxillus remouendus, vulnus sanandum est: cicatrix inducta fouēda  
 frigida aqua est, in qua myrtus, hederæ, aliæue similes uerbenæ sint:  
 illinendumq; medicamentum, quod siccet: & magis etiam hic quie-  
 scendum, donec id membrum confirmetur. si quando uero ossa non cō-  
 ferbuerunt, quæ sæpe soluta, sæpe mota sunt: in aperto deinde cura-  
 tio est: possunt enim coire. si uetustas occupauit, membrum extenden-  
 dum est, ut aliquid lædatur. ossa inter se manus diuidenda, ut concur-  
 rendo exasperentur, ut siquid pingue est, eradatur: totumq; id quasi  
 recens fiat. magna tamen cura habita, ne nerui, musculiue lædatur.  
 tum uino fouendum est, in quo malicorium decoctum sit: imponen-  
 dumq; id ipsum oui albo mixtum. tertio die resoluendum, fouendūq;  
 aqua, in qua uerbenæ, de quibus supra dixi, decoctæ sint. quinto die  
 idem faciendum, feruleq; circundandæ. cetera & ante, & post eadē  
 faciendæ, quæ suprascripsi. Solent tamen interdum diuersa inter se  
 ossa conferuere: eoq; & breuius membrum, & indecorum fit: & si  
 capita acutiora sunt, assidue punctiones sentiuntur. ob quam causam  
 frangi rursus ossa, & dirigi debent. id hoc modo fit. calida aqua mul-  
 ta membrum id fouetur: & ex cerato liquido perfricatur: intendi-  
 turq; & inter hæc medicus pertractans ossa, ut adhuc tenero callo ma-  
 nibus ea diducit: compellitq; id quod eminet in suam sedem. & si pa-  
 rum ualuit, ab ea parte in qua os se inclinat, inuolutam lanā regulā  
 obijcit. atq; ita deligando assuescere iterum uetustæ sedi cogit. nonnum-  
 quam autem recte quidem ossa cœperunt. superincreuit uero nimius  
 callus: ideoq; locus intumuit. quod ubi incidit, diu, leuiterq; id mem-  
 brum perfricandum est ex oleo, & sale, & nitro: multumq; aqua ca-  
 lida salsa fouendum: & imponendum malagma quod digerat: astri-  
 ctusq; alligandum: oleribusq; et prætere auomitu utendum. per quæ  
 cum carne callus quoq; extenuatur. confertq; aliqd de sinapi quod cū  
 fici in alterum par membrum impositum, donec id paulum erodat,  
 eoq; euocet materiam. ubi his tumor extenuatus est, rursus ad ordi-  
 nem uitæ reuertendum est.

## De luxatis ossibus. Cap. XI.

De fractis quidem ossibus hætenus dictum sit. mouetur au-  
 tem ea sedibus suis duobus modis. nā modo quæ iuncta sunt



## LIBER

inter se dehiscunt: ut cum latum scapularum os ab humero recedit: & in brachio radius à cubito. & in crure tibia à sura: interdum à saltu: calcis os à talo: quod raro tamen fit. modo articuli suis sedibus excidunt. ante de prioribus dicam. quorum ubi aliquid incidit, protinus is locus canus est: depressusq; digitus sinum inuenit. deinde grauis inflammatio oritur: atq; in talis præcipua. siquidē febres quoq; & caneros, & nervorum uel distentiones uel rigores, qui caput scapulis annectunt: mouere consuevit. quorum uitandorum causa facienda eadem sunt, quæ in ossibus mollibus læsis aliquid ubi incidit protinus his locis proposita sunt: ut dolor, tumorq; per ea tollantur. nam diducta ossa nunquam rursus inter se iunguntur. & ut aliquid decoris eo loco sit, nihil usus admittitur. maxilla uero & uertebra, oēsque articuli cum ualidis nervis comprehendantur: excidunt aut ui expulsi, aut aliquo casu nervis, uel ruptis uel infirmatis: faciliusq; in pueris & adolescentulis quàm in robustioribus: hiq; elabuntur in priorem, & in exteriorem partem, quidam omnibus modis, quidam certis: suntq; quedam communia omnium signa: quedam propria sunt cuiusq; siquidem semper ea parte tumor est, in qua os prorumpit. ea sinus, à qua recessit. & hæc quidem in omnibus deprehenduntur, alia uero si in singulis. quæ simul atq; de quoq; dicam, proponenda erunt. sed ut excidere omnes articuli non possunt, sic non omnes reponuntur. caput enim nonnunquam compellitur: neq; in spina uertebra, neq; ea maxilla, quæ utraq; parte prolapsa anteq̃ reponeretur, inflammationem mouit. rursus qui nervorum uicio prolapsi sunt, compulsi quoq; in suas sedes iterum excidunt. at quibus in pueritia exciderunt, neq; reposita sunt: minusq; cæteri crescunt. omniūq; quæ loco suo nō sunt: atro ea increscit: magisq; in proximo membro, q̃ in ulteriore. ut puta si humerus loco suo nō est, maior in eo ipso fit, quàm in brachio: maior in hoc quàm in manus arte. tum pro sedibus & pro casibus qui inciderunt, aut maior, aut minor usus eius mēbri relinquitur: quoq; in eo plus usus superest, eo minus id extenuatur. quæquid autem loco suo motum est, ante inflammationem reponendū est. si illa occupauit, dum conquiescat. tunc lacescendum est. ubi finita est, tentandum est in his membris quæ id patiuntur multum autem eò cōfert & corporis, et nervorum habitus. nam si corpus tenue, si humidum est, si nervi infirmi, expeditius os reponitur. sed & primo facilius excidit: & postea minus fideliter continetur. quæ contraria his sunt, melius continēt. sed id quod expulsū est, difficulter admittunt. oportet autem ipsam inflammationem leuare, super succida lana ex aceto imposita. à cibo si ualentioris articuli casus est, triduo: interdum



etiam quinq; diebus abstinere debet. bibere aquā calidā dū sitim finiat. curiosusq; hæc facere his ossibus motis, quæ ualidis, plenisq; musculis continentur. si uero etiam febris accessit, multo magis deinde ex die quinto fouere aqua calida: remotaq; lana ceratim imponere ex cyprino factum, nitro quoq; adiecto, donec omnis inflammatio finiat. tunc infractionem ei membro adhibere: cibis uti bonis: uti uino modicis: etiamq; ad usus quoq; suos id membrum promouere: quia motus ut in dolore pestifer, sic aliàs saluberrimus corpori est. hæc cōmunia sunt, nunc de singulis dicam.

## De maxillæ luxatæ curatione. Cap. XII.

**M**axilla in priorem partem propellitur: sed modo altera parte, modo utraq; si alteram in contrariam partem, modo utraq; ipsa mentumq; inclinatur: dentes paribus non respondent: sed sub his qui secant canini sunt. At si utraq; totum mentum in exteriorem partem promouetur: inferioresq; dentes longius quàm superiores excedunt: intentiq; super muscoli apparent: primo quoq; tempore homo in sedili colloandus est sic, ut minister à posteriore parte caput eius contineat uel sic, ut iuxta parietem is sedeat, subiecto inter parietem, & caput eius scorteo puluino duro, eoque caput per ministrum urgeatur, quo sit immobilius. tum mediæ digiti pollices limbolis, uel fascijs ne dilabantur inuoluti in os eius coniungendi: cæteri extrinsecus admouendi sunt. ubi uehementer maxilla apprehensa est, si una parte prociat: concutiendum mentum, & ad guttur adducendum est. tunc simul & caput apprehendendum, & exatato mēto maxilla in suam sedem compellenda, & os eius comprimendum est sic, ut omnia penè uno momento fiant. si in utraq; parte prolapsa est, eodem omnia facienda, sed æqualiter retro maxilla agenda est. reposito osse si cum dolore oculorum, & ceruicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. cum omnibus uero quorum ossa mota sunt, primo liquidior cibus conueniat, tum his præcipue, adeo ut sermo quoq; frequenti motu oris per nervos lædat.

## De capite luxato. Cap. XIII.

**E**aput duobus processibus in duos sinus summæ uertebæ demissis super ceruicem contineri in prima parte proposui. hi processus interdū in posteriorem partem exadū: quo fit ut nervus sub occipito extēdatur: mētū pectori agglutinetur, neq; bibere is,



## LIBER

neq; loqui possit: interdum sine uoluntate semen emittit, quibus celerime mors superuenit. ponendum autem hoc esse credidi, non quo curatio eius rei ulla sit, sed ut res inditijs cognosceretur: & non putare sibi medicum defuisse si qui sic aliquem perdidissent.

## De spina luxata.

## Cap. XIII.

**I**dem casus manet eos, quorum in spina uertebra exciderunt. id enim non potest fieri, nisi ex medulla quæ per medium, & duabus membranulis, quæ per duos à lateribus processus feruntur: & nervis, qui continent ruptis. Excidunt autem & in posteriore partem, & in priorem, & supra septum transversum, et infra. si in utraq; partem exciderit, à posteriore parte uel tumor, uel sinus oritur. si super septum id incidit, manus resolvuntur: uomitus, aut distentio nervorum insequitur: spiritus difficulter movetur: dolor urget: & aures obtusæ sunt. si sub septo, fœmina resolvuntur: urina supprimitur: interdum etiam sine uoluntate prorupit. ex eiusmodi casibus ut tardius quam ex capitis, sic tamen intra triduum homo moritur. nam quod Hippocrates dixit uertebra in exteriorem partem prolapsa, primum hominem collocandum esse, & extendendum: tum calce aliquem super ipsum debere consistere: id intus impellere: in his accipiendum est, quæ paulum excesserunt: non in his, quæ toto loco motæ sunt. nonnunquam enim nervorum imbecillitas efficit, ut quantum non exciderit uertebra, paulum tamen in priorem partem promineat: id non iugulat. sed ab interiore parte non contingit quidem posse: ab exteriore, si propulsum est, plerumq; iterum redit: nisi quod admodum rarum est: uis nervis restituta est.

## De humero luxato.

## Cap. XV.

**H**umerus autem modo in alam excidit. modo in partem priorem. si in alam delapsus est, et uictus cubitus recedit ab latere, rursum iuxta eiusdem partis aurē cum humero porrigi non potest: longiusq; altero id brachium est. si in priorem partem summum quidem brachium extenditur, minus tamen quam naturaliter, difficiliusq; in priorem partem q̃ in posteriorem cubitus porrigitur. Igitur si in alam humerus excidit, & uel puerile adhuc est corpus, uel molle certe, & imbecillibus nervis intentum est, satis est collocare id in sedili: & ex duobus ministris alteri imperare, ut caput late scapularum ossibus leniter reducat alteri ut brachium extendat, ipsum



dat, ipsum posteriore parte residentem renum sub ala eius coire: si-  
mulq; & ille os & altera manus brachium eius ad latus impellere.  
At si vastus corpus, nerviue robustiores sunt, necessaria est spatula li-  
gnea: & quæ crassitudinem duorum digitorum habet, longitudine ab  
ala ad digitos pervenit. in qua summa capitulum est rotundum &  
leniter cavum, ut recipere particulam aliquam ex capite humeri pos-  
sit. in ea bina foramina tribus locis sunt inter se spacio distantibus,  
inq; ea lora mollia coniunguntur. eaq; spatha fascia involuta quo mi-  
nus tactu lædat ad alam à brachio dirigatur sic, ut caput eius sum-  
mae alæ subijciatur. deinde loris suis ad brachium deligatur: uno lo-  
co paulum infra humeri caput, altero paulum supra cubitum, tertio  
supra manum, cui rei protinus inter ualla tunc quoq; foraminum  
aptata sunt. sic brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradum  
trahitur, ita alte ut consistere homo ipse non possit. simulq; in alteram  
partem corpus demittitur: in alteram brachium intenditur. eoq; fit  
ut capite ligni caput humeri impulsus in suam sedem modo cum so-  
no, modo sine hoc compellatur. multas alias esse rationes scire facile  
est uno Hippocrate lecto, sed non alia magis usu comprobata est. at  
si in priorem partem humerus exadit, supinus homo collocandus est:  
fasciaq; aut habena media ala circumdanda est: capitumq; eius post ca-  
put hominis ministro tradenda, brachium alteri: præcipiendumq; ut  
ille habenam, hic brachium extendat. deinde medicus caput quidem  
hominis sinistra debet repellere: dextra uero cubitum cum humero  
attollere: & os in suam sedem compellere. faciliusq; id in hoc casu,  
quam in priore reuertitur. reposito humero lana alæ subijcienda est.  
si interiore parte os fuit, ut ei opponatur. si in priore parte, ut tamen  
commodius deligatur: tum fascia primū sub ala obvoluta, caput eius  
debet comprehendere: deinde profectus ad alteram alam: ab eaq;  
ad scapulas: rursusq; ad eiusdem humeri caput tendere. sæpiusq; ad  
eandem rationem circumagi, donec bene id teneat. uinctus hac ratio-  
ne humerus commodius continetur: si adductus ad latus sit. ad id  
quoq; fascia deligatur.

## De cubiti luxati curatione. Cap. XVI.

In cubito autem tria coire: ossa humeri, & radij, & cubiti  
ipsum ex his, quæ prima parte huius uoluminis posita sunt,  
intelligi potuit. sed cubitus qui innexus humero est, ab hoc  
exadit. radius qui adiunctus est, interdum trahitur: interdum subse-  
dit. in omnes uero quatuor partes exadere cubitus potest. sed si in

Aurelij Cor.



priorem prolapsus est, extensum brachium est: neque recuruatur. si in posteriorem, brachium curuum est, neque extenditur: breuiusque altero est. interdum febrem, vomitumque bilis mouet. si in exteriorem, interiore uel brachium porrectum est, sed paulum in eam partem a qua os recessit recuruatum, quicquid incidit, reponendi ratio una est. neque in cubito tantum est: sed in omnibus quoque membris longis, quae per articulum longa testia iunguntur. utrumque membrum in diuersas partes extendere donec spatium inter ossa liberum sit. Tum id os quod excidit ab ea parte in quam prolapsum est, in contrariam impellere. Extendendi tamen alia atque alia genera sunt, prout nervi ualent: aut ossa huc, illuc uel sederunt. ac modo manibus solis utendum est: modo quaedam alia adhibenda. ergo si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duas manus: interdum etiam habenis iniectis satis est. deinde rotundum aliquid a lacerti parte ponendum est. Et super id repente cubitus ad humerum impellendus est. at in alijs casibus commodissimum est eadem ratione brachium extendere quae fracto cubito supraposita est, Et tum ossa reponere. reliqua curatio eadem est, quae in omnibus. celerius tantum et saepius id resoluendum est: multoque magis aqua calida fouendum: diutius ex oleo, et nitro ac sale perfricandum. in cubito enim celerius quam in ullo alio articulo, siue extra remansit, siue intus reuertit, callus arcundatur: usque si per quietem increuit, flexus illius postea prohibet.

## De manu luxata. Cap. XVII.

Anus quoque in omnis quatuor partes prolabitur: si in posteriorem partem excidit, porrigi digiti non possunt: si in priorem, non inclinantur: si in alterutrum latus, manus in contrarium: id est aut ad pollicem, aut ad minimum digitum conuertitur. reponi non difficillime potest super durum locum et renitentem ex altera parte intendi manus, ex altera brachium debet sic, ut prona sit. si in posteriorem partem os excidit, supina: si in priorem, si in interiore, exteriorem uel in latus. ubi satis nervi diducti sunt, si in alterutrum latus procidit manus, brachium in contrarium repellendum est. at his, quae in priorem, posteriorem uel partem prolapsa sunt, superimponendum durum aliquid: idque supra prominens os manu urgendum est: per quod uis adiecta facilius in suam sedem compellit.

## De palma. Cap. XVIII.

In palma quoque ossa interdum suis sedibus promouentur, modo in priorem partem, modo in posteriorem. in latus enim



moueri paribus offibus oppositis non possunt: signum id solum est, quod omnium commune est. tumor ab ea parte, in quam os uenit: si-  
nus ab ea à qua recessit. sed sine intento digito, tantummodo bene pres-  
sum os in suam sedem reuertitur.

## De digitis.

## Cap. XIX.

In digitis totidem ferè casus, eademq; signa sunt: quæ in  
manibus. sed in his extendendis non æque in opus est, cum  
et articuli breuiores, et nerui minus ualidi sunt. super me-  
sam tantummodo intendi debent, qui uel in priorem uel in postero-  
rem partem exacerunt. tum iam palma compelli: atq; id quod in la-  
tus elapsum est, digitis restitui.

## De femore.

## Cap. XX.

Vm de his dixerim: de his quoq; quæ in cruribus sunt, ui-  
deri possum dixisse. siquidem etiam in hoc casu quædam  
similitudo est femori, et humero, et tibiæ, et cubito, pedi  
et manui: quædam tamen separatim quoq; de his dicenda sunt. femur  
in omnes quatuor partes promouetur, sæpius in interiorem, deinde  
in exteriorem, raro admodum in priorem, aut posteriorem. si in in-  
teriorem partem prolapsum est crus, longius aliter, et uelut est. ex-  
tra enim pes ultimus spectat. si in exteriorem, breuius, et arctius fit,  
et intus inclinatur. Calx ingressu terræ non contingit, sed plâta ma-  
meliusq; id crus superius corpus quam in priore casu ferit, minusq;  
baculo eget. si in priore crus extensum est, implicariq; non potest, al-  
teri cruri ad calcem par est sed ima planta minus in priorem par-  
tem inclinatur: dolorq; in hoc casu præcipuus est: et maxime uri-  
na supprimitur. ubi cum dolore inflammatio quieuit, cum mode in-  
grediantur totusq; eorum pes est. sed et si in posteriorem extendi  
non potest crus, breuiusq; est, ubi constitit: calx quoque terram non  
contingit. Magnum autem femori periculum est, ne uel difficulter re-  
ponatur: uel repositum rursus exadat. quidam iterum semper exci-  
dere contendunt. sed Hippocrates, et Diocles, et Philotimus, et Ni-  
leus, et Heraclides Tarentinus, clari admodum authores, ex toto se  
restituisse numoriæ prodiderunt. neque tot genera machinameto-  
rum quoque ad extendendum in hoc casu femur Hippocrates, An-  
dreas, Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraclides, Faber quoque  
quidam repperissent, si id frustra esset. sed ut hæc falsa opinio est:  
sic illud uerum est. cum ibi ualentissimi nerui, musculiq; sint,  
si suum robur habent, nix admittere: si non habent, postea



non contineri. Tentandum igitur est, & si tenerius membrum est, satis est habenam alteram ab inguine, alteram à genu intendi. si ualidius, melius adducent, qui easdem habenas ad ualida bacula deligant: tumq; eorum fissum in eas partes oppositæ mire obiecerint: superioresq; ad se utraq; manus traxerint: etiamnum ualentius intenditur membrum super scannū, cui ab utraq; parte axes sunt: ad quos habenæ illæ deligantur. qui ut in torcularibus conuersi, rūpere quoq; si quis perseuerauerit: non solum extendere nervos, & musculos possunt. collocandus autem homo super id scannum est, aut pronus, aut supinus, aut in latus sic, ut semper ea pars superior sit, in quam os prolapsum est: ea etiam inferior, à qua recessit. nervis extentis si in priorem os uenit, rotundum aliquid super inguen ponendum: subitoq; super id genu adducendum est eodem modo, eademq; de causa, quæ id in brachio fit: protinusq; si complicari femur potest, intus est. In cæteris uero casibus, ubi ossa per uim paulum inter se recesserunt, medicus debet id quod eminet retro cogere: minister contra inde coxam propellere. posito osse nihil aliud noui curatio requirit, quàm ut diutius his in lecto detineatur: ne si motum adhuc nervis laxioribus femur fuerit, rursus erumpat.

## De genu. Cap. XXI.

Enu uero & in exteriorem, & in interiorem, & in posteriorem partem excidere notissimum est: in priore non prolabi pleriq; scripserunt. potestq; id uero proximum esse, cum inde opposita patella, ipsa quoq; caput tibiæ contineat. Meges tamen eum cui in priorem partem excidisset, à se curatum esse memoriæ prodidit. in his casibus intendi nervi rationibus hisdem, quas in femore retuli possunt. & id quidem quod in posteriorem partem excidit, eodem modo rotundo aliquo sup poplitem imposito, adductoq; eo crure, reconditur. cætera uero manibus simul tum ossa in diuersas partes compelluntur.

## De talo. Cap. XXII.

Talus in omnes partes prolabitur. ubi in interiorem partem excidit, ima pars pedis in exteriorem partem conuertitur. ubi huic contrarius talus contrarium etiam signum extat. si in priorem partem erumpit à posteriore, latus nervus durus, & insanus est: minusq; is opus est. si in posteriorem lanx penè conditur, plaga maior fit. Reponitur autem his quoq; per manus, prius in diuersa pede & crure diductis. & in hoc quoq; casu diutius in lectulo perseuerandum.



perseuerandum est: ne his talus qui totum corpus sustinet, parum confirmatis nervis ferendo oneri cedat: rursusq; prorumpat. calciamen-  
tis quoq; humilioribus primo tempore utendum, ne iunctura talum  
ipsum lædat.

## De plantæ. Cap. XXIII.

**P**lantæ ossa hisdē modis quibus in manu prodeunt, his, his-  
demq; conduntur. fascia tantūmodo calcem quoq; debet com-  
prehendere: ne cum mediam plantam, immūq; eius uinciri  
necesse est, liber talus in medio relictus, materiam pleniorē recipiat:  
ideoq; suppuret.

## De digitis. Cap. XXIII.

**I**n digitis nihil ultra fieri debet: q̄ quod in his, qui sunt in  
manu, positum est. Potest tamen conditus articulus medius,  
aut summus canaliculo aliquo contineri. hæc facienda sunt  
in his casibus ubi sine vulnere ossa exciderunt. hic quoq; & ingens  
periculum est: & eo grauius quo maius membrum est: quo uel ualidio-  
ribus nervis, aut muscūlis continetur. ideoq; humeris, femoribusq; me-  
tus mortis est: ac si reposita ossa sunt, spes nulla est. Non repositis ta-  
men, nonnullum periculum est. eoq; maior in utroq; timor est, quo  
propius uulnus articulo est. Hippocrates nihil tuto reponi posse: præ-  
ter digitos, & plantas, et manus dixit. atq; in his quoq; diligenter es-  
se agendum, ne precipitent. Quidā brachia quoq; & crura repo-  
suerunt: & ne cancri, distentionesq; neruorum orirentur, sub quibus  
in eiusmodi casu fieret mors matura: sanguinem ex brachio mise-  
runt. uerum ne digitus quidem, in quo minimum ut malum, sic etiā  
periculum est, reponi debet ante inflammationem: aut postea cum iā  
uetus res est. si quoq; reposito osse nerui distendantur, rursus id protu-  
sus expellendum est. Omne autem membrum, quod cum uulnere loco  
motum, neq; repositum est: sicut accere conuenit, ut maxime cubantem  
iniuat, tantum ne moueatur: ne uel depēdeat. in omniq; tali morbo ma-  
gnū ex longā fame præsidium est. deinde ex curatione eadem quæ  
proposita est ubi ossibus fractis uulnus accessit: si nudum os eminet,  
impedimento semper futurum est. id quod excedit, absidendum est:  
imponendaq; super arida linamenta sunt, & medicamenta non p̄u-  
guia, donec quæ sola esse in eiusmodi re sanitas potest, ueniat. nam &  
debilitas sequitur: & tenuis cicatrix induatur: quæ necesse est, facile  
noxe postea pateat.











Tay  
depe  
Huc  
Firm  
Mem  
Vi f  
Prim

B  
Tum  
vel  
vili  
Puleia  
Ant  
Cau  
Ind  
Spo  
Pro  
Pro  
Si no  
Sape  
Sana  
Si pri

P  
Allia  
Induc  
Allia  
Tritu

E S  
Cum



P

Hæbe salutiferum quod pangimus affere carmen:  
Inuentumq; tuum prompto comitare favore.  
Tuq; potens artis, reduces qui tradere uitæ  
Nostri: atq; in cælum manes reuocare sepultos.  
Qui colis ægæū, qui pergama, quiq; epidaurum:  
Qui quondam placida tectus sub pelle draconis

Tarpeias arces, atq; incluta templa petisti  
Depellens tetros præsentî numine morbos  
Huc ades: & quicquid cupido mihi sæpe rogatus  
Firmasti, cunctum teneris expone papyris.  
Membrorum series certo deducta tenore  
Vt stet, & assimilis medicinae defluat ordo:  
Principio celsa de corporis arce loquamur.  
Capiti medendo.

BALSAMA si geminis instillans auribus addas,  
Tum poteris alacrem capitis reparare uigorem.  
Vel quæ septenis censentur gramina nodis  
Vtiliter nectes: uel corno ex arbore sertum,  
Puleium'ue potens una super aure locabis.  
Aut illud mixto coctum clementer aceto  
Cautè nare trahes: seu uisco lintea nexo  
Induces fronti: seu trita gramina mentæ.  
Spongia cum tepidis annexa liquoribus imbris  
Profiuit: aut hedera ex oleo decocta uetusto.  
Profiuit: aut cochleis frontem tractare minutis.  
Si noxuit cerebro uiolentia solis aperto  
Sæpe chelidonia ex acido perducta liquore  
Sanauit: profunt & amica papauera somno.  
Si prius in lento madefacta terantur oliuo.  
Hemicraneo medendo.

PORTIO si capitis morbo tentetur acuto  
Allia diuersam lana contexta per aurem  
Inducta profunt: & eodem balsama pacto.  
Allia uel ternis piperis terna addita granis  
Trita lines: certam dabit hæc tibi cura salutem.  
Porrigani depellendæ.

EST insensibilis morbus, sed noxius formæ  
Cum caput immensa pexum porrigine ningit,

Q. Serenus.

11



Q. SERENI

Copia farris uti freudentibus edita saxis:  
Hanc poterit malve radix decocta levare.  
Aut tu fœniculum, nitrumq; & sulphura uiua  
Contere. deinde caput permixtis ablue cunctis:  
Furfuribus ne nouis durum miscebis acetum,  
Vt uarios crines tali des unguine puros.  
Prodest & tarda demptus testudine sanguis:  
Et prodest cedro demissus ab arbore suauis.  
Desinet interea glomerari farrea nubes:  
Cessabitq; grauis crebrae porriginis imber.

Capillo tingendo.

QV O S pudet ætatis longæ, quos sancta senectus  
Offendit: capiunt properos abscondere canos:  
Et nigrum crinem fuso simulare dolo.  
His prodest acri contrita cypressus aceto,  
Vel frons lentisci, uel tristia poma sabuci:  
Lumbrici quoq; terrestres miscentur oliuo:  
Et iuuenem præstant rediuiuo flore capillum.  
Præterea niueum poterit depellere crinem  
Rhesina ex facili cæra, uisq; coacta:  
Ad rutilam speciem nigros flauescere crines  
Vngento aneris prædixit Tullius auctor.  
Si prægnans artus captiui sororis edit,  
Dicuntur fœtus nigrantia lumina fingi.  
Phthiriasi arcendæ.

NOXIA corporibus quædam de corpore nostro  
Progeniuit natura uolens abrumperè somnos  
Sensibus: & monitis uigiles intendere curas.  
Sed quis non paueat pherecidis fata tragoedi,  
Qui nimio sudore fluens animalia tetra  
Eduxit: turpi miserum quæ morte tulerunt.  
Sylla quoq; infelix tali languore peresus  
Corruit: & fœdo se uidit ab agmine uina.  
Sæpius ergo decet mordax haurire sinapi:  
Vel nitro, ac sale permixtis, acidoq; liquore  
Laxatis, ut sint simul allia tangere corpus:  
Aut lachrymis hederæ, aut succo perducere cedri.  
Quin etiam surfur mixto medicatur aceto.  
Vnda maris lendes capiti deducit iniquas:  
Et quicquid crebri defendit silua capilli.

Prurigni,



Prurigni, papulis, & scabiei arcendis.

ILLOTVS sudor, uel copia nobilis escæ  
Sæpe graui scabie correptos asperat artus.  
Ergo lutum prodest membris adhibere frictis:  
Quod facit ex asino siccatus corporis humor.  
Nec pudeat tractare finum quem bucula fudit.  
Stercoris ex porcæ cinerem confundito lymphis:  
Sic pauidum corpus dextra parcente foueto.  
Proderit ex oleo pulvis, quem congerit alte  
Dulcibus ex latebris patiens formica laborum.  
Conuenit hinc tepido litæ tradere corpora soli.  
Feruantes papulas oleo curato liquenti:  
Aut acido baccho miscbis farra lupini:  
Atq; hinc in calido percurres membra lauacro.  
Pruritus autem saluos leuat humor aceti:  
Siue mari lauidus sudor, cochleæq; minutæ:  
Quarum contactu perimetur acerbæ libido.

Frenesi, ac capiti purgando.

EX uitio cerebri frenesis furiosa mouetur,  
Amisissaq; refert frendens amentia uires:  
Siue calens febris iactatos exedit artus:  
Siue meri gustus, seu frigoris efficit aura.  
Conuenit hic calidis pecudum pulmonibus apte  
Tempora languentis medica redimire corona.  
Illotis etiam lanus suffire memento:  
Ceritum sæpe horrendi medicantur odores:  
Atq; ideo insanos etiam curarier est par.  
Purgatur cerebrum mansa radice pyretri.  
Vngitur & suavis, dederit quos parua sabucus,  
Expressisq; hederae mandatur naribus humor.  
Aut mixtum rutæ crebro instillatur acetum.  
Non semper præsens dolor est sanabilis: ergo  
Cura magis prodest uenturis obuia morbis.

Fluori capillorum, & maculis capitis tollendis.

DEFLVIT expulsus morbo latitante capillus  
Si raro lauitur: seu uis epota ucnem est:  
Seu salamandra potens, nullusq; obnoxia flammis  
Eximium capitis tactu deiecit honorem.  
Nonnunq; uariant maculæ: paruisq; parumper  
Orbibus aspersum ducit noua uulnera tempus.

u ij



Q. SERENI

Viperea pellis cineres his addito rebus,  
Roboreasue pilas, urfino'ue ungitio senuo:  
Vel testudineo magis permulceto cruore.

Frigori sedando.

SAEPE ita peruadit uis frigoris, ac tenet artus,  
Vt uix quasito medicamine pulsa recedat.  
Si ranam ex oleo decoxeris, abijce carnem:  
Vugine membra foue: parili ratione ualebit  
Vrtica semen: percepta q; frigora uincet:  
Et ceruina potest mulcere medulla rigorem.  
Decoctum raphani semen cum melle uorabis:  
Sive fel ursinum tepesacta dilue lymphe  
Proderit hoc potu: seu cassis ostrea testis  
Vsta dabit cinerem: qui pro sale sumptus in escis,  
Decutiet gelidum tepesacto uertice uirus.  
Nonnullus liquidum summit, mulsumq; sinapiq;  
Atq; palato agitat pariter, retinensq; mouensq;  
Allia nonnulli mandunt: olei'ue liquore  
Perfundunt calido cerebrum, nasiq; latebras.  
Quidam lactuca credunt prodesse sapes.  
Curandi modus hic & suavis, & utilis idem est.

Elephantiasis propellenda.

EST Elephas morbus tristi quoq; nomine dirus,  
Non solum turpans infandis ora papillis,  
Sed atq; praecipitans funesto fata ueneno.  
Huic erit aduersus cedri de cortice succus,  
Mustellaeq; cinis: uel fusus sanguis ab illa.  
Nonnulli dixerunt serum, prodesse bibendo.  
Mentastri folium potu, apposituq; salubre est.  
Nec frustra bulbos, & sulphura iungis aceto,  
Qui cupis horribiles ad pristina reddere uultus.  
Praeterea nitrum debes cum melle iugatum  
Spargere lacte bouis: uarias sic ungere frontes.  
Cerusam, & chartam, quam gens aegyptia mittit  
Thure simul misce atq; oleo, quod flore rosarum  
Conditum est: line sic faciem, sic redde salutem.

Cutis, & faciei uitij propellendis.

INUIDA si maculet faciem lentigo decoram,  
Nec prodesse ualent naturae dona benignae,  
Eruam, atq; acidum laticem simul illine malis.

Proderit



Proderit & bulbus mellis dulcedine victus,  
Cruda ne dulcicido miscetur cepa liquori:  
Sanguine vel leporis morbus delebitur oris.  
Frons salias cum flore suo contrita medetur.  
Sapiolæ cineres ex ossibus omnia tollunt.  
Cygneos adipēs hilari misceto lyæo:  
Omne malum propere maculoso ex ore fugabis.  
Horrebit si liuor atrox, aut nigra cicatrix,  
Attrito sapone genas purgare memento.  
Rugarum sulcos lentisci mastice tendes.  
Si uero uitium est, quod ducat ab impete nomen  
Hoc matutina poteris cohibere salina:  
Seu folio platani, quod mansum mane domabis.  
Fœda fluunt curni quæ purgamenta cameli  
Vrentur, cineremq; dabunt: ungentur aceto  
Mascula thura simul: diuinaq; cura ualebit.

Aurium uitij succurrendis.

CUM scæuus teneras dolor alte sauciat aures,  
Fraxinea in flammis fundit, quem talea suauum  
Infilles: siue obscænos ex uirgine rores:  
Aut suauum ex folio dederit, quem populus alba.  
Sæpe chelidonæ rabidum sociatur acetum,  
Adiunctoq; nitro procedit cura salubris.  
Mentastri liquor expressus conducere fertur.  
Infectum uiolis oleum bene consulit auri.  
Annoſa rubros si legeris arbore uermes  
Ex oleo tere: sic tepidos infunde dolenti.  
Si uero obstrusa sensus morietur in aure,  
Lumbicos terræ, scæuumq; ex anſere rauco  
Excoque: sic ueterem poteris depellere morbum.  
Felq; bouis surdis etiam prodesse loquuntur:  
Si iungas olidæ graue quod nānxere capellæ.  
Si uero in autas animal penetrauerit aures  
Proderit admixto pauidi fel muris aceto.  
At si lymphæ nocens peruaſerit: anſeris aptus  
Immittetur adeps ceparum non sine suco.  
Qui grauis est oculis sensum tamen auribus auget.  
Vt & phœbigenæ diuinam discere curam:  
Sicq; uel annoſis confecta doloribus auris:  
Allia tum septem numero, septemq; lupinos

Q. Serenus.

¶ iij



Cretaceam dabis in testam: tum delphica frondis

Addatur: mixto totum feruescat aceto:

Doctus eris tepidos illinc immittere rores.

Oculorum dolori mitigando.

SUMMA boni est, alacres homini contingere uisus.

Quos quasi custodes, defensoresq; pericli

Prospiciens summa natura locauit in arce:

Sic tamen ut nullos paterentur desuper ictus:

Atq; supercilio pauidi tegerentur opaco.

Sed dolor immeritum lumen si forte laessit,

Lana madens oleo noctu connectitur apte,

Viuentis ue nepæ lumen gestatur amicum:

Ex folio caulis cineres, confractaq; thura,

Et laticem bacchi faetæ cum lacte capellæ

Desuper induces: atq; una nocte probabis.

Hyblei mellis suat cum felle caprino

Subueniunt oculis dira caligine pressis.

Vettonicæ mansus si cabit lumina suauis.

Si tenebras oculis obducit pigra senectus

Expressæ marathro guttæ cum melle liquenti

Detergere malum poterunt: uel uulturis atri

Fella, chelidoniæ fuerint quis gramina mixta:

Hæc etiam annosis poterunt succurrere morbis.

Fel quoq; de gallo molitum simplice lymphæ

Exacuet pueros dempta caligine uisus.

Sine columbarum finus admiscetur aceto:

Seu fel perdis parili cum pondere mellis:

Vina chelidoniæ simili ratione iugantur,

Efficiuntq; suo præclaros unguine uisus.

Aspera quinetiam mulcent, & rupta reducunt.

Si genus est morbi miserum quod lumen adurit,

Hic calor infuso miscet lacte canino:

Anguib; ereptos adipēs ærugine misce:

Hi poterunt ruptas oculorum ungere partes.

Si uero horrendum ducent glaucomata peplum:

Spiritus alterius prodest: qui grana cumini

Pallentis madens uisus exalat in ipsos.

Si tumor infestat, rufos & gliscit in orbes,

Turgent oculi nili circumline cæno.

Dentium



Dentium vitio, & oris foetori medendo.

HAUD facile est acrem dentis tolerare dolorem:  
 Quo magis est equum medicam pernoscere curam:  
 Cum baccho violas decoxeris, ore teneto.  
 Mansus item prodest succis oleaster acerbis.  
 Hinc obsecro fugit: linguae quoque vulnera cedunt.  
 Cum uino piper, & nitrum tepido inde dolenti.  
 Saepè chelidonia succo, uel lacte capellæ  
 Sanescunt dentes: aut tauri felle inuantur.  
 Aut acidi latices clauso uoluntur in ore  
 Manditur apta rubus ganguius, & bona labris  
 Lentiscus, myrtusque emendant oris odorem.  
 Quod uero assumpsit nomen de dente fricando  
 Ceruino ex cornu cinis est: aut ungula porcæ  
 Torrida: uel cinis ex ouis, sed non sine uitro:  
 Muricis aut tosti: uel bulbi extincta fauilla:  
 Ambitiosa putas: sunt ista salubria cunctis.  
 Exesos autem dentes si forte quereris,  
 Vre finum muris, patulisque, & hiantibus adde.  
 Vel anerem dentis ceruini extinguere aceto  
 Conuenit: atque canis immittere partibus apte.  
 Prodest & puluis lumbrici corpore tosto.  
 Ora ambusta cibo sanabis lacte canino.  
 Saepè etiam gelida ganguias collue lymphæ:  
 Dentibus ut firmum possis seruare uigorem.  
 Si uero insandum proserpit ad intima uulnus,  
 Permisceto salem parili cum pondere thuris:  
 Hinc tractato locum: miram experiere medellam.  
 Aut tu sume pilam, quæ caudis hæret ouinis:  
 Hæc si atata dabit molles, & fracta firinas.  
 Huius & attritu terrum mulcebitur ulcus.

Vnae faucibus, & quæ mollienda sunt medendis.

EGRESCVNT teneræ fauces, cum frigoris atri  
 Vis subijt: uel cum uentis agitatilis aer  
 Vertitur: atque ipsas flatus grauis inficit undas:  
 Vel rabidus clamor fracto cum forte sonore  
 Planum radit iter: sic est Hortensius olim  
 Absumptus: causis etenim confectus agendis  
 Obtinuit: cum uox domino uiuente periret:  
 Et nondum extincti moretur lingua disertæ.

u iiij



Ergo omni studio quæres inhibere dolorem:  
 Simplicibus lymphis confunditur aerium mel:  
 Additur ex cussus nivea simula gine fursur:  
 Decocta hæc clauso simul exercentur in ore.  
 Præterea fauces extrinsecus ungere prodest  
 Versino & tauri seu, cæruq; remissis:  
 Omnia quæ geminis æquabis lancibus ante.  
 Disce etiam miram ex humili medicamine curam:  
 Aethæo melli iungas agreste papauer,  
 Decoctumq; simul mandes, mansumq; uorabis.  
 Crinitæ porri radices quinq; coquantur:  
 Hinc aqua non feruens uoluatur fauce sonora:  
 Nec tamen in sto machum descendat gutta patentem.  
 Si uero afflictam langor deiecerit unam,  
 Tunc horas aliquot pronus recubare memento:  
 Aut illam pulvis tosti releuabit aneti,  
 Aut cinis ex cochlea: uel torrida brassica flammis.  
 Verum angina sibi mistum sale poscit acetum.  
 Quod prodest clauso uersatum agitare palato.

De rigore ceruicis.

AT SI ceruices, duratq; colla rigebunt,  
 Mira loquar: geminus mulcebitur unguine poples:  
 Hinc longos pariter nervos mediana sequetur:  
 Anseris aut pingui torpentia colla fouebis:  
 Illitur & ualido multum lens cocta in aceto  
 Aut capræ finus & bubuli, aut ceruina medulla  
 Hoc etiam immotos flectes medicamine nervos.  
 Quos autem uocitant colles attingere dextra  
 Debebis, qua Gallus erit pressante peremptus.

Tussi, & coleribus medendis.

NOXIA si penitus colerum seuire uenena  
 Perspicias, cocta lactucæ fronde leuabis.  
 Proderit & caules assumere sæpe madentes.  
 Interdum fauces tussi quatiuntur atroci:  
 Allia tum sumes & cocta, & melle peruncta:  
 Semina uel raphani permixto dulcia melle:  
 Aut si fraxinea semen de fronde reuellis:  
 Interiora uora, uetitus contingere dente.  
 Ouum melle teres, domitum feruentibus undis,  
 Marrubium uel potens: hæc faucibus optima sumes,

Frenabisq;



Frenabisq; grauem facili medicamine tussim.

Digestioni, & stomacho.

QVI stomachum regem totius corporis esse  
Contendunt, uera niti ratione uidentur.

Huius enim ualidus firmat tenor omnia membra:

At contra eiusdem franguntur cuncta dolore.

Quin etiam nisi cura innuat, uitare cerebrum

Fertur, & integros illinc auertere sensus.

Lactuce semen nigræ, quod lignea pila

Trinuerit: admixto ieiunus sumito melle.

Sed cochlear trinum gustu tibi sufficit uno:

Aut tritum semen raphani, mulsuq; innabit:

Sive due partes absinthii, ac tertia rutæ

Decoctis potantur aquis, siliquæq; madentes:

Semina uel marathri foetæ cum lacte capellæ:

Pulegium quoq; decoctum curabit amice:

Et potu, & fatus stomacho conducit anetum:

Seu cochleas undis calefactas, ac propè iunctas

Suppositis torrens prunis: uinoq; geroq;

Perfusas cape: sed prodest magis esse marinas.

At male digestis si crapula seniet escis,

Ex pipere, & calida florem de rore marino

Ebibe: seu salibus piper adde, & tenue cuminum:

Quæ coctis tanges epulis, ac raptæ uorabis:

Aut cubitum pergens suauem cape tristis aneti.

Ventriculum Mergi sale iacto contere nalde

Tosto pane super piperis quæ puluere multo

Miscantur: capies diuinum munus in istis.

Grana peregrini piperis diffundito quinq;

Niliaco melli: quæ mane inserta capeffer.

Proderit hoc stomacho, uictas & conquoquet escas:

Felli uomitu, uel phthisi arcendis.

LVTEA si cresunt, præcunctis noxia fella:

Allia parua nouem, piperis tot permole grana:

Quæ cyatho diluta gari mandesq; bibesq;

Hæc iterum septena capis post deniq; quina.

Præterea caulem, frondet si parua sabucus,

Decocto sale permisce: ac iungis oliuo:

Tunc capis, ac tali auxilio fella horrida purgas.

Profunt & pelagi latices, quos pondere iusto



Q. SERENI

Dulcibus associas lymphis, melliq; liquenti:  
Et niueus prodest ex ubere suavis asellæ:  
Si tepido uino infundas, ac mella, piperq;  
At uomitum radix narossi pota mouebit.  
Si uero phthisis annoso sedet improba morbo,  
Inuitas uino cochleas hausisse inuabit.  
Proderit & ueteris seni pila sumpta suilli:  
Quæ capulas quoq; producat medicina salubris.

Mammis sanandis, uel stringendis.

VBERA facundo multum lactantia succo  
Sæpe sibi noxæ nimium manando fuerunt.  
Fecit igitur ualida duri reprimuntur aceti.  
Post partum tumidas iniuste assurgere mammas  
Interdum aspicias: harum mala commemoratur  
Murinus finus ex pluuio sedare liquore.  
Sic autem clausas penitus dolor angit acerbus,  
Lumbricis terræ turgentes unge corymbos.  
Si castigatas studium est præstare papillas,  
Ex hederæ fertis ambas redimere memento:  
Protinus, & raptus flammis mandare coronas:  
Anseris aut seruum pariter cum lacte tepente:  
Aut ouum illinito tulerit quod garrula perdix.  
Præterea pluuio decocta papauera rore  
Hærescant multis post absoluenda diebus.  
Vis & phæbigenæ cœlestia sumere dona,  
Vbera cum tetræ laniata doloribus horrent:  
Nauis ramentum, & quæ nomine præssion herba est:  
Et quæ uulgari sermone insana uocatur:  
Græcus ἰσχυράμων propria scit dicere lingua:  
Necnon & calami radix, lapathiq; legumen  
Mixta dabunt miras experto crede uidelas.

Reiectioni cibi, aut sanguinis abstinendæ.

SI stomachus nondum concelatas expuit escas,  
Sed magis atq; magis uitium renouando ualescit:  
Allia ædemus, crebrumq; trahemus odorem.  
Sic etiam rutilus fertur de pectore sanguis,  
Sorbitum mentæ, raphanus uel ætha inuabit.  
Sæpe lapis teritur: specularem nomine dicunt:  
Et mixtis hauritur aquis: sistiq; cruorem.  
Vritur interdum raptus de subere cortex:



Et cinis ex calido prodest epota lyæo.  
 Quorum cinis, aut colearum, aut deniq; pellis.  
 Aut cinis è salicum ramis prodesse putatur:  
 Aut platani pilulas acri infundemus æto:  
 Nullus erit sanguis, quem non abus iste moretur.

Iecoris, & lateris utriusq; medendis.

SI mollis iecoris fibras dolor hauriet acer,  
 Protinus ex mulsâ potanda eleliphæos herba est:  
 Sumitur & semen: quod fraxinus alta profudit:  
 Vulturis atq; iecur: uel ius perdis apricæ.  
 Præterea simili dragma pix dura, piperq;  
 Franguntur: sic in mollito pulvere iuncta  
 Egelidis miscentur aquis: recreantq; bibentem.  
 Abscânhi quoq; decocti potabitur humor.  
 Si latus immeritum morbo tentatur acuto,  
 Accensum extingues lapidem stridentibus undis:  
 Hinc bibis: aut aceris radicem tundis, & unâ  
 Cum uino capis: hoc præsens medicamen habetur.  
 Quid referam multis composita philonia rebus:  
 Quid loquar antidotum? uanus quis ista requirat?  
 At nos pauperibus præcepta feramus amica.  
 Necnon & iecoris quæretur fibra lupini:  
 Iungunturq; simul costum, poliumq; piperq;  
 Quæ diluta mero dantur potanda lyæo.  
 Est & uis morbi, quod telum commemoratur:  
 Cum subito dolor insanus furit incitus ictu:  
 Persicus huic potum è nucleo dabit interiore:  
 Quæ mihi cura satis casu monstrante probata est.  
 spleni curando.

QUANDO lyen tumido circumligat ilia uinclo,  
 Et plenum splenis demonstrant membra rigorem,  
 Mollibus ex hederâ tornantur pocula lignis:  
 Hinc trahet assuetos æger quoscunq; liquores:  
 Aut uiridis coctorum olerum potabitur unda.  
 Proderit exucto fluminalis hirudo cruore:  
 Siue mirica potens seu ros cum pane marinus:  
 Aut hederæ succus potu, apposituq; inuabit.  
 Necnon intactam ferro, quam uideris alnum,  
 Huic liber eripitur, ferro sine decoquiturq;  
 Donec uiscerum pars tertia subsit aquarum.



Hinc medico potu pulsus dolor omnis abibit.  
 Nonnulli memorant consumi posse lienem,  
 Eruum si semper ieiuno sumpserit ore.  
 Arida ficus item feruente domatur aceto:  
 Et trita illinitur: uel splen apponitur hædi.  
 Marrubium in uino potum prodesse loquuntur.  
 Præterea piper, ac nepete cum flore, et anetum,  
 Capparis, atq; Apium, buglossaq; iungitur una:  
 Horum decoctos latices potare salubre est.  
 Puleium, abrotanum nitida cum mastice coctum,  
 Ac thymbræ speciem, quam commemorant cephaloten:  
 Prædixit spleni deus idem posse mederi.  
 Dulcia Plautus ait grandi minus apta lieni:  
 Splen tumidus nocet: et risum tamen addit ineptum:  
 Ut mihi sardois uideatur proximus herbis:  
 Irrita quæ miseris permiscet gaudia fatis.  
 Diatur exectus faciles auferre cachinos,  
 Perpetuoq; æuo frontem præstare seueram.

Præcordijs sanandis.

LANGUIDA si duro turgent præcordia morbo,  
 Misceatur mulsæ farris sextarius unus:  
 Necnon et lini tunsum, siliquæq; legumen:  
 Hæc decocta simul, nondumq; tepentia nectis:  
 Aut quæ poma cydon creteis misit ab oris  
 Cocta lines: durum ut possis mollire tumorem.  
 Ocuma præterea, bulbiue linuntur amari.  
 Proderit et lymphis corpus mersare marinis.  
 Quin etiam catulum lactantem apponere membris  
 Conuenit: atq; malum transcurrere fertur in illum:  
 Cui tamen extincto manus debetur humandi.  
 Ne iunctus uitium duat de coniuge coniunx.  
 Quod superest styraci iunges ramenta atrinæ.  
 Quodq; decem ex rebus decattartyma rite uocatur.  
 Mastice addentur cum puluere mollia farræ:  
 Talibus auxilijs præcordia tuta resident.

Lumbis, et renibus sanandis.

CV M sæuit penitus hærens iniuria lumbis,  
 Igne lapis candens datur exultantibus undis:  
 Hoc poteris potu tristem superare dolorem.  
 Aut pice cum molli nitrum, sulphurq; et acetum



Hinc medico potu pulsus dolor omnis abibit.  
 Proderit hanc ægris erebro perducere membris.  
 Aut caput asparagi cum uino sume uetusto:  
 Seu manus appone: modus conducit uterque.  
 Aut adipi mixtum lumbis inducto sulphur.  
 Sæpe chelidoniam cum succo palladis addes,  
 Farrâq; quæ tremulis prosunt sudantia flammis.  
 Fertur amygdalinæ succus nucis esse bibendus:  
 Piusitur, & tepidis sorbebitur addita lymphis.  
 Aut tres ex uino cochleas feruescere coges:  
 Cumq; suis domibus franges, piperis quoq; grana  
 Ter quinq; adijcies: potuq; innaberis illo.  
 Fursur item parca fuerit cum feruidus unda,  
 Post oleo madidus succis immittitur aptis:  
 Quæ uix passuris urentia iungito membris.  
 Prodest ceruinæ medicæ naturæ medullæ.  
 Nec nocuit ciceris cocti potasse liquorem:  
 Aut mistam teneris mandisse lilis facta maluis:  
 Contritumq; simul cum mastice confer anetum.  
 Quodq; decem rebus componi ex nomine clarum est:  
 His continge locum. deus hæc mihi certa probauit.  
 Ventris dolori mitigando.

SI DOLOR insanus tota descendit in aluo,  
 Hemini tribus in lymphæ ualidam quoque rutam,  
 Aut apium: donec pars duplex desit aquarum.  
 Potus erit medicus non detrectante palato.  
 Præterea niuei sterilis testa uritur oui,  
 Quæ postquam in tetram fuerit conuersa farinam,  
 Ex calidis potatur aquis: & pota medetur.  
 Necnon iungenda est utero noua uirga miricæ  
 Illæsa hæc ferro, terrâq; intacta geratur:  
 Aut medio uentris prodest aspergere terram:  
 Quam signauerunt uestigia pressa rotarum.  
 Proderit & puluis facili sub cardine raptus.  
 Quin etiam & lymphis coctum potare cuminum  
 Conueniet, quod iam nobis documenta probarunt.  
 Menta quoque hoc pacto medicos dabit hausta sapes.  
 Cæliacos autem recreabis pene salubri,  
 Quem madido farre efficies, ac mollibus onis:  
 Quorum testa fero prius euaneset aceto.



Q. SERENI

Refert & teretes bulbos mollire terendo:  
Cumq; his leni clarum potare fluentum.

Hydropisi depellendæ.

CORRUPTI icoris uitio, uel splenis acervo  
Crescit hydrops: aut cum siccata febre medullæ,  
Atq; auidæ fauces gelidum traxere liquorem.  
Tum lymphæ intercus uitio gliscente tumescit,  
Secernens miseram proprio de uiscere pellem.  
Conueniet teneræ radix decocta sabuci  
In geminis calidi cyathis potanda lyæi.  
Fraxineum semen cum bacchi rore bibendum est.  
Aut calido filicis radicem mollit iaccho,  
Qui subito raptos uentos, sucosq; reuellit.  
Nec non appposito curantur dropace membra:  
Vnguine quo frangit uirus langoris aquosi.  
Nec non in tepidis conuolues corpus arenis.  
Apposituq; leues Nepetæ, gustuq; innabunt.  
Sæpe & scyllino pelluntur noxia baccho.  
Helleboro bene purgatur lymphaticus error.  
Aut huius uice quod fert semen lenta genista  
Miscetur: mulsis coctusq; educitur undis.  
Est qui præualidum nitro sale miscet acetum:  
Atq; olei suco refricat turgentia membra.

Ventri molliendo.

SAEPE cibi specie, uitio uel corporis ipso  
Potibus, aut duris restricta morabitur aluus.  
Vincetur talis mora gramine mercuriali,  
Cuius aquam cocti minimo cum melle bibemus.  
Prunæq; conueniunt quæ mittit clara Damascus.  
Multos præterea medici componere sucos  
Assuerunt: preciosa tamen cum ueneris emptum  
Falleris: frustra q; immensa nomismata fundes.  
Quin age, & in tenui certam cognosce salutem.  
Aut igitur tectum lana supponis alumen:  
Aut edis in patinis teneræ decocta sabuci:  
Vel falsum mulsam capræ cum lacte capeffis.  
Crede tamen potum meliorem lactis equini:  
Dicitur & ualidos asinæ lac uincere sucos.  
Syluestris fici lachrymam prodesse loquuntur:  
Quodq; satis melius uerbis dicemus Horati.



- » Mitulus & uiles pellent obstantia conchæ:  
 » Sed chocleas prius urtica, aut fursure pasci  
 » Purior hinc gustus noxa sine mouerit alium.  
 Sæpe thalassoneli iunctum cumulauimus hymbri.  
 Hæc purgant parili fuerint si pondere mixta.

Solutioni uentris, & dysenteriae compeſcendæ.

T A M uarij casus mortalia sæcla fatigant  
 Vt sine diuersis obnoxia corpora morbis.  
 Sæpe etenim nimio cursu fuit impetus alui:  
 Frenat commixto cum feruet brassica uino:  
 Aut cerasi uictum longo iam tempore potum.  
 Suauis amineæ uitis cum pane medetur:  
 Mel bene permixtum calido potatur aceto.  
 Vile quidem facili factum, tamen utile opinor,  
 Si lentent medica data purgatoria dextra,  
 Adiecto piperis medicatur puluere calda.  
 Sin autem longo decurrent intima fluxu,  
 Atq; immane malum multo iam tempore gliscit,  
 Torridus ex uino cortex potabitur oui.  
 Ramentum niuei credunt prodesse Elephant.  
 Arbore pyramææ cortex direpta medetur  
 Axe sub atrito pix nigro mixta lyæo  
 Immensum poterit potu retinere fluorem:  
 Nummis aut iussu cedrum cum mastice misces:  
 Mollitamq; picem, & rasum de nauibus unguen  
 Languida quo fidens medicamine membra fonebis.  
 Proderit & pueris quos dentis origo fatigat  
 Castaneas coxisse nuces, & sorba uetusta,  
 Atq; apium, caulesq; rubus quos fundit acuta:  
 Potio quæ fluidam consumpta morabitur aluum.

Lumbrici, & tineis purgandis.

Q U I D non aduersum miseris mortalibus addit  
 Natura? interno cum uiscere tinea serpens,  
 Et lumbricus edax uiuane inimica creentq;  
 Quod genus assiduo laniat præcordia morsu.  
 Sæpe etiam scandens oppletis faucibus hæret:  
 Obsessaq; uias uitæ concludit hanelæ.  
 Ergo cinis cornu ceruini proderit haustus:  
 Vel nepetæ tritum ex uino, uel lacte capellæ:  
 Necnon & suauis medica potu s aceti.



Q. SERENI

Prodest prætereacum baccho persici frondis:  
Democritus memorat mentæ conducere potum.  
Sumitur abrotanum, necnon & uile melanthum:  
Allia per sese sanant: aut ius coriandri.  
Quin & marrubium decoctum, haustumq; inuabit,  
Puleium'ue potens, & agreste iugatur anetum.  
Synthesis hæc prodest unda mollita calenti.

Colo sedando.

CVM COLVS inuisum morbi genus intima carpit  
Mande galeritam uolucrem, quam nomine dicunt:  
Aut pauidi leporis madefactæ coagula pota:  
Sine apio tritas nepetas cum mastice iunges.  
Necnon & species ambas redolentis aneti,  
Quarum decoctos patiens haurito liquores.

Vesicæ, & calculo purgando: & urinae provocandæ.

SI CUI uesicæ tardus cunctabitur humor  
Hæc mora rumpetur uino peruncta uetusto.  
Prodest & paruos acidos potare sabuci.  
Aut hederæ suauis: aut lachrymosi trita synapi.  
Necnon resinas ex oricia terebintho  
In speciem erulicæ paruos glomerabis in orbes:  
Quos ternos tepida mixtos hausisse medella est.  
Quondam etiam nimio præceps urina fluente  
Irrigat exuias, obscænoq; inficit hymbri.  
Ergo cinis nepetæ suauis uel proderit haustus:  
Et uino tritus datur, aut cum lacte capellæ  
Tum leporis cerebrum ex uino potare decebit.  
Si dolor internam uesicæ concoquit aluum  
Subueniet radix & frons epota cupressi:  
Puleium'ue potens domitum feruentibus undis.  
Si uero in lapides densus conuertitur humor  
Qui retinet cursus, gemitumq; dolore frequentat,  
Saxifragam, seu sarxeiphagon: suauerrere credunt.  
Præterea semen myrti syluestris iaccho,  
Atq; oleo mixtum bibitur: nec desit acetum:  
Vinaq; sumantur fricta condita cumino.  
Sine palumborum capitur finus aëriorum  
Dulcicidis sparsus suauis, trituq; solutus.  
Necnon obscænus capræ potabitur humor:  
Obruit hic morbum, labefactæ saxa remittit.

De conceptione,



De conceptione, &amp; partu.

IRRITA coniugij sterilis si munera languent,  
Nec sobolis spes, multos iam uana per annos  
Fœmineo fiat uitio res: nec ne silebo.

Hoc poterit magni quartus monstrare Lucreti.  
Sed natura tamen medicamine uicta potenti  
Sæpe dedit foetus studio curante paratos.

Aut igitur leporis consumit fœmina uulnam:  
Aut ovis in stabulis fractas cum ruminat herbas  
Pendentem spumam molli deducit ab ore,  
Atq; illam meminit mixto potare falerno:

Mercurialis item capitur communiter herba:

Sic cubitum noctu coniunx festinat uterq;.

Ast ubi iam certum spondet prægnatio foetum,  
Ut facili uigeat seruata puerpera partu,  
Dictamnium bibit: & cochleæ manduntur edules.

At si per menses minus octo moratus in aluo  
Irrumpit thalamos: & nexus soluit inertes,  
Pulei bene purgati tunc conuenit hymber,  
Cuius opem ueram casus mihi sæpe probarunt.

Quin etiam sterco supponunt uulturis atris:  
Sentiat ut minime partus qui proximus urget.

Oua etiam ruiæ, & fragili miscentur anetho:  
Quæ diluta simul uino, atq; exhausta medentur.

Profluuium cuiusq; sanguinis, & matrici.

SI modicus pleno manat de corpore sanguis  
Subuenit: at nimius cum uita funditur ipsa.

Quapropter multo naris completa cruore  
Cum fluit, attritus cimex conducit odore:

Lana oleo madefit, sed nondum lota rosato:  
Hæc datur in nares, uel claudit densius aures.

Contritis prodest cochleis obducere frontem:

Aut galli cerebro, uel sanguine mitte columbæ.

Quod nisi supprimitur, sanguis potandus & ipse est.

Præterea pharys caput emetire papyris:

Detrahe quod superest, aliò genitalia necte.

Fœmineas prodest illinc uincire mamillas.

Menstruus immenso si profluit impete sanguis,

Suauida lana malos remoratur subdita cursus.

Mortua quin etiam producit corpora partus.

Q. Serenus.

x



Q. SERENI

Sed quæcunq; fluit uis immoderata cruoris,  
 Subernus cortex calidis potatur in undis,  
 Ante minutatim studio uincente terendus.  
 Sed si forte cruor clausa cunctabitur aluo,  
 Puleij calido purgatur fœmina potu.  
 Aut molles nepetæ, aut rutæ quæcunq; bibentur.  
 At si puniceos fundit uestica liquores,  
 Marrubium ex passo tritum persunditur undis:  
 Hi poterunt haustus rutilum purgare liquorem.  
 Reliquias partus dictam detrahit herba.  
 Quod si fœminei properabit sanguinis hymber,  
 Est qui frustra molæ percussu decutit uno:  
 Quorum aliquod lanis tectum ad præcordia neffit  
 Hæc simul incantans sibi debere cruorem,  
 Ut lapis ille uicæ solites iam destitut orbes.

Pilis qbuscunq; internecadis, quæ oculos impediunt.

NOBILIS hirsutus horret lascinia setas,  
 Et gaudet raptò nudari flore pilorum:  
 Sed bona nonnunquam uellendi causa uidetur,  
 Corpora cum releuat ratio manifesta salutis.  
 Namq; oculos infesta pilorum tela lacessunt:  
 Quodq; illis dederat uallum natura tuendis  
 Inde inimica seges proprios deseruit in orbes.  
 Ergo locum crinis uulsi continge cruore,  
 Quem dat auis tremulis simulat quæ pellibus alas:  
 Sanguine uel Ricini, quem nigro de cane uelles.  
 Præterea quasq; uoles auertere setas,  
 Atq; in perpetuum rediuiua obcludere tela,  
 Corporibus uulsi saniem perducito ranæ.  
 Sed quæ parua situ est, et rauco garrula questu,  
 Necnon quæ stagnis cessantibus hæsit Hirudo  
 Sumitur, et uiuens samia torretur in olla:  
 Hæc acidis ungit permixta liquoribus artus,  
 A uulsaq; uetat rursus percreescere syluam.

Omnibus obscænis medendis.

DICENDVM Et quæ sit membris medicina pudendis.

Languidus antiquo purgatur penis iaccho:  
 Ac super illinitur facundæ felle capellæ:  
 Mane nouo myrti frondes commandere prodest.

Qui



Qui dolet, atq; illas in vulnus despuat ipsum.  
 Fecit etiam vini genitalia lauta lenantur:  
 Et tumidos testes nereia lymphæ cohercet.  
 Vel bulbi ex mulso, uel cera immista cupresso:  
 Aut fuba cum tepidis baccho decocta fluentis  
 Ramicis immensum fertur cohibere tumorem.  
 Far madidum lymphis: medica cum fronde cupressi:  
 Vnde etiam potu frons hæc memoratur amica.  
 Sin autem existit durum tibi glandibus inguen,  
 Proderit inducta coelheas cum melle minutas.  
 Obscenos si ponet locos noua uulnera carpent,  
 Horrentum mansa curantur fronde ruborum.  
 Aut si iam ueteri succedit fistula morbo,  
 Mustellæ cinere immisso purgabitur ulcus.  
 Sanguine tum ricini, quem bos gestauerit ante  
 Herba chelidonie fertur cum melle mederi:  
 Herbaq; cum seuo folijs de mille uocata.

Scies, & articulari morbo.

SAEPIVS cautus uicta coxendice morbus,  
 Tersur, & gressus diro languore moratur:  
 Populus alba dabit medicos de cortice potus:  
 Necnon & teneræ gracili de fronde genistæ.  
 Arreptos caules, acidoq; liquore madentes  
 Sumere conueniet, rubiæ quoq; ducere potum:  
 Aut ex irino coelheas haurire lyæo.  
 Si uero articulos tabes inimica per omnes  
 Hæserit: ex figu betas ac melle ligabis  
 Vel pelagi latices, simul & baccheia dona  
 Sumere curabis: nimio sed parato uino.  
 Ennius ipse pater dum pocula siccant iniqua,  
 Hoc uitio tales fertur meruisse dolores.

Furunculo medendo.

CVM sanguis nimius puri commistus atroci  
 Aestuat: & papulas alte sustollit acutas,  
 Resinam misces, & saxus ordea fracta  
 Conspersa hæc tepidis apponere conuenit undis:  
 Vis & hyoscyami cære, seuoq; ingutum  
 Nectere: non minus hæc poterit medicina innare,  
 Prætereaq; finum ex gallo, quem legeris albo,  
 Imbribus ex acidis fidens appone dolenti.

x ij



Q. SERENI

Auribus aut pecudum molles expromito fordes:

Yngvine quo fosis dabitur mediana papillis.

Carboni medendo.

HORRENDVS magis est, perimit qui corpora carbo

Vrit hic inclusus, vitulia rumpit acerbus.

Hunc ueteres quondam varijs pepulere medelis

Tertia nanq; titi, simul et centesima liui

Charta docet ferro talem candente dolorem

Exectum: aut poto raparum semine pulsum.

Ni fieret dicens uix septem posse diebus

Vitam produci, tanta est uolentia morbi.

Dulacidum, laticemq; cumini semine iunges:

Atq; finum pariter paphiae compone columbae.

Hinc line duratas partes: et clausa uenena.

Præterea triti referant adoperta lupini.

Nonnullus calcem uiuam dissoluit aceto:

Fumantemq; niuem papulis apponit acerbis.

Est qui gallinae perducit stercore corpus:

Allia uel piperi parce commixta linuntur

Pythagoræ cognata leui condita cumino

Proderit, et madida fermentum polline turgens.

Pani, uonica, et strumæ depellendis.

SVNT alij, quos dura mouet natura tumores

Non minus horrendi, sed non ita perniciosi:

Vomica qualis erit: uel eidem proxima quædam.

Simplice resina mæscuntur hordea tinsa:

Et mulsos amnes: et purgamenta columbae:

His bene decoctis languentia membra fouentur.

Mollis odorato faba iungatur coriandro

Proderit appositum: mollitq; aperitq; tumorem.

Aut de phasgano radix decocta palustri:

Quæ salis admixto tondetur condimento.

Proderit et mansum, quod traxeris arbore uiscum.

Gramen Hyoscyami ceræ, seuq; uetusto

Conalia: mixtisq; locos perduce dolentes.

Exercere etiam corpus medicina potens est.

Onum defundis in fictile, deinde putamen

Marrubij succo implebis, post melle liquenti:

Omnia consociata tepenti prospera pota

Sumuntur, referantq; malum, purgantq; leuantq;.

Igni



Igni sacro medendo.

EST etiam morbi species, quæ dicitur ignis:  
 Languida quo multo torrentur membra calore.  
 Vel tu uicino seuum bonis igne remittis,  
 Mollitumq; lines: dederis uel fotibus oia:  
 Sed non cocta dabis: sic torrida membra fouebis.  
 Lumbricus terræ mixto inducetur aceto:  
 Aut parili noua Ruta modo: sed iungis oliuum:  
 Ouaq; cum betis profusa super illita tritis.  
 Allia dant ancrem sociandum oleoq; geroq;  
 Vngue quo gliscens deponet flamma furorem.  
 Sæpe chelidonie pars candida iungitur oui,  
 Quæ medico potu, sed uili trita capeffes:  
 Admiscere memor lymphas, amnemq; salerni.  
 Podagræ depellendæ.

QVÆDAM sunt rabidæ medicamina summa podagræ  
 Cui ter tricenæ species epidaurius ipse  
 Dixit inesse deus: requiem tamen huic dare morbo  
 Fas erit: & tristem saltem mulcere dolorem.  
 Ergo age, & arreptam salicis frondemq; librumq;  
 Cum uino tere: sic contractos perline nervos:  
 At cum prima mali sese ostentabit origo,  
 Feruida non timidus tolera cauteria plantis:  
 Semineis uel hirci reſerato pectore calces  
 Inſere: ſic diræ reprimes primordia peſtis:  
 Aut ſi corruptus perſederit altius humor:  
 Trita cupreſſus ibi baccho iungetur acerbo,  
 Panibus & teneris cohibebunt addita queſtus.  
 Parua ſabucus item eſt hircino collita ſeuo:  
 Triticeæq; acido manantes amne farine:  
 Aut nitidum ranæ decoctum uiſcus oliuo:  
 Sine chelidonie ſucus ſale mixtus aceto.  
 Sunt quibus appoſita ſciatur hirudine ſanguis:  
 Non audita mihi ſit ſas, ſed lecta referre.  
 Hoc quidam rabidus morbo per tempora meſſis  
 Vicino plantas frumenti preſſit acervo:  
 Enaſitq; grauem caſu medicante dolorem.  
 Vulneribus ferro, aut uerberibus factis.  
 NATVRÆ uitij medicas obieciſſus artes:  
 Nunc & fortune iaculis obſiſtere par eſt.  
 Q. Serenus.



Si cui forte lapis teneros violauerit artus,  
 Necte adipēs vituli, simul & tritam chamæciffon.  
 Nec pudeat luteæ sterco producere porce.  
 Sin autem feuo est laceratum uerberē corpus,  
 Tum lexiua cinis ceras dissoluit, & eua:  
 Admixtoq; oleo uibices comprimit atras.  
 Si uero infrenus manat de uulnere sanguis,  
 Purpura torretur conchili perlita succo:  
 Huius & atra cinis currentem detinet undam  
 Verrucæ quoq; defectæ frenare cruorem  
 Dicitur ambustus tyrio de uellere puluis.  
 Præterea nimios reserati uulneris amnes  
 Feniculi cinis astringit, uel fimbria porri:  
 Siue finus manni cum testis uritur oui,  
 Et reprimit flumidos miro medicamine cursus.

Vulneribus quibuscunq; casibus actis.

CVM magna humanæ sint pondera conditionis:  
 Tam multæ innumeri species mihi uulneris adsunt.  
 Ut nequeam proprijs cunctis adscribere curas.  
 Iisdem igitur monitis casus sanabimus omnes  
 Sic tamen, ut nullus medicinam eluserit error.  
 Ergo modus quicumq; obtingit uulneris atri,  
 Contritus cum melle dabit medicamina bulbus:  
 Herbaq; quæ folijs nomen de mille recepit.  
 Appositu prodest adipi permixta uetusto  
 Sucida cum tepido nectetur lana lyæo:  
 Ambustus uel cinis complebit uulneris ora.  
 Concludit uero, uel frons, uel ramus ab ulmo.  
 Ut succis hederæ pulchrescit fœda cicatrix.

Ab homine, uel simia morsis.

SIVE homo, seu similis turpissima bestia nobis  
 Vulnere dente dedit: uirus simul intulit atrum  
 Betonicam ex puro prodest assumere baccho.  
 Necnon & raphani cortex decocta medetur:  
 Si trita admorsis fuerit circumlita membris.

serpentū morsibus, & ueneris pellendis.

CVSPIDE non quisquā, longe neq; cæde larissæ  
 Fulmine non gladij, uolucris nec felle sagittæ,  
 Quam cita uipereo potis est affliger ictu.  
 Quare aptam dicamus opem, succoq; medentes.

Cui



Cui nocuit serpens, fertur caput illius apte  
 Vulneribus iungi: sanat quæ sauciat ipsa  
 Vt larissæa curatus Telephus hasta.  
 Proderit & caulem cum uino haurire sabuci:  
 Aut coctum raphani librum, tritumq; ligare:  
 Siue etiam excelsa folium de mole cupressi  
 Mandabit lactens caprifici suauis opellam:  
 Aut tithymalus atrox uulnus contrita perungit  
 Carduus est nondum doctis fullonibus aptus,  
 Ex illo radix tepido potatur in amni.  
 Ceruino ex foetu commixta coagula uino  
 Sumuntur: quæ res membris agit atra uenena.  
 Aut ferule radix potatur in hymbre lyæi  
 Betonicæ uel leues, gallinæ aut iura uetustæ.  
 Si uero horrendum uulnus fera iecerit aspis,  
 Urinam credunt propriam conducere potu.  
 Varronis fuit ista senis sententia: necnon  
 (Plinius ut memorat) sumpti iuuat hymbër aceti.  
 Dicendum & quæ sit præcorx medicina timenti:  
 Cautio namq; potest diros peruertere morsus.  
 Si iecur exectum tarso de uulture portes  
 Erucis, uel si totos perduxeris artus,  
 Quas prius attritis uehementi spargis aceto:  
 Aut tu ceruina per noctem in pelle quiescis:  
 Aut genere ex ipso dentem portabis amicum.  
 Toxica præterea qua sint pellenda medela  
 Expediam: sanguis poterit prodesse caninus:  
 Qui facili potu antidotos imitatur honestos.  
 Vis & mirificos cautus prædiscere odores:  
 Aænsis quibus arætur teterrima serpens,  
 Aut styracem torres: aut duri uulturis alam:  
 Vel nepetam: aut frondem rigida, stirpemq; miricæ.

ictibus Scorpj, & morsibus Muris cæci, uel Aranei.

SVNT minimæ species: sed diræ uulnere pestes  
 Quæ magis in tenui latitantes corpore fallant:  
 Scorpj ut grauis est, & araneus hæc mala semper  
 Captant securos multa iam nocte sopores,  
 Et documenta dedit nobis prostratus orion,  
 Magna quod exiguis perimantur membra uenenis.



At qui vulnus atrox incussit scorpius ardens  
 Continuo capitur: tunc digna caderet insus,  
 Vulneribusq; actus fertur reuocare uenenum:  
 Aut calidis pelagi lymphis loca laesa fouentur:  
 Sine meri potu dissoluitur improba pestis.  
 Ad cunctos autem morsus, ictusq; minorum:  
 Casus aptus erit pauidæ de lacte capellæ:  
 Cuiq; hoc assumi debet origanus herba:  
 Hæc duo mirificis curabunt icta medellis.  
 Necnon feniculo calidum annectatur anethum  
 Aut uinum sulphur siat cum fece lyæi:  
 Exiguo piperis cerebrum conspergito galli:  
 Quo lita sanescunt depulso membra dolore.  
 Sin autem muris nocuit uolentia cæci,  
 Quæ sola signauit uoluentis orbita plaustres,  
 Illinc: mira datur nili de puluere citra.

Subitaneo dolori, feбри, atq; ostro opo.  
 NON nunq̃ existit subiti noua causa doloris:  
 Cuius origo latet, ueris reprimenda medellis.  
 Nanq; chelidoniæ mixto sale necere prodest:  
 Velleraq; infuso recalentia sulphure sanant.  
 Ostro opo lento conduit melle perungi.  
 Sin autem calidæ depascent corpora febres,  
 Tunc apij suauis leni sociatur oliuo:  
 Membra lines: forisq; ferus mulcebitur ignis.  
 Nec spernendus adeps, dederit quem bestia Melus.  
 Semineis cerui lachrymam miscere liquori  
 Conuenit: atq; artus illinc mulcere calentes:  
 Febribus at longis galli des iura uetust.

Ad Typum quartanæ.

NEC tu crede leuem dilato tempore febrem:  
 Quæ spacium sibi dat magis, ut cessando caleseat  
 Lentato quæ crassatur quartana calore:  
 Ni medicas adhibere manus discamus & herbas,  
 Allia non pudeat terno cum amice trita,  
 Et diluta mero medijs haurire diebus.  
 Aut facilem iecoris murini ducere fibram.  
 Quatuor & duri iungantur scrupula bacchi:  
 Mira est absinthii cum simplice potio lymphæ.  
 Summe tribus digitis apprehensum semen anethi,

Tantundem



Tantumdem marathri, nulsū nec desit aceto,  
 In cuius cyatho prædicta salubriter hauris.  
 Illa quinetiam spartum suppone tumentī.  
 Aut leporis trepidi diluta coagula trade.  
 Prodest & potus sed nulsus doridis humor.  
 Quidam etiam miranda ferunt ueniente calore  
 Iurantes ludum ueneris, munusq; petendum.  
 Sed prius est oleo partus feruescere ranæ  
 In trinijs, illoq; artus perducere succo.

## Ad Typum tertianæ.

EST etiam alternis febris rediūna diebus:  
 Tempora discernens quasi iustæ pondera libræ:  
 Ut possis igitur talem prohibere furorem,  
 Tu uolues cera sine caudis grana cumini,  
 Puniceq; indes pelli, colloq; ligabis.  
 Pulei ramus lanæ uelatus amictu  
 Tempore suspecto medicos præbebit odores.  
 Præterea amex potatur tritus in ouo,  
 Horridus attractu, sed gustu commodus apte.

## Ad Typum quotidianæ.

AT qui continuus non cessat adire diebus,  
 Sed tantum certas morbus discriminat horas,  
 Triticeum metuit granum (si credere dignum est)  
 Quod latitans fracto fuerit sub pane repertum.  
 Necnon ossa iuuant septis inuenta domorum:  
 Conuenit hæc tereti pendentia subdere collo.  
 Multaq; præterea uerborum monstra silebo:  
 Nam febrem uario depelli armine posse  
 Vana superstitio credit, tremulæq; parentes.

## Hemitritæo depellendo.

MORTI ferum magis est, q̄ græcis hemitritæum  
 Vulgatur uerōis: hoc nostrā dicere lingua  
 Non potuere ulli: puto nec uoluere parentes.  
 Inscrabis chartæ quod dicitur abra ca bra  
 Sæpius, & subter repetis, sed detrahe sumam:  
 Et magis atq; magis desint elementa figuris:  
 Singula quæ semper rapies, & cætera figes,  
 Donec in angustum redigatur littera conum.  
 His lino nexis collum redimire memento.  
 Nonnulli memorant adipem prodesse leonis.



Q. SERENI

Corallum uero, si collonectere uelles:  
Ne dubites illo ueros miscere smaragdos.  
Talia languentis conducunt uincula collo:  
Letalesq; abiget miranda potentia morbos.  
Fracturis, & luxis sanandis.

INFANDVM dictu cunctis procul absit amicis:

Sed fortuna potens omen conuertat in hostes.  
Vis indigna nouo si sparserit ossa fragore,  
Conueniet cerebrum blandi canis addere fractis:  
Linthea deinde, superq; inductasnectere lanas:  
Sapius & suatos conspargere pinguis oliui:  
His septem credunt coalescere cuncta diebus:  
Aut ueteri baccho caprae finus inde petulcae:  
Hoc aperit clausum, trahit haerens, sanat apertum.  
Sin uero caput infestus colliserit ictus,  
Ex oleo neeti uestis debet arachnes:  
Nesciet haec illinc, nisi cum sanarit, abire.  
Quod si luxa suo decedent membra tenore,  
Vrere faemineos crines, ac iungere seruum  
Congruet, ac tali medicamine mota ligare.  
Aut maluam ex pingui tritam apposuisse iuuabit:  
Aut si conclusum seruauit tibia uulnus.  
Stercus ouis placidae iunges, adipisq; uetustos:  
Pandere quae poterunt ulcus, patuloq; mederi.  
Neruis inanis, & dolentibus, atq; contractis.

HAVD quisquam credet disiectos uulnere neruos  
Ad solitum rursus reuocari posse uigorem:  
Sed prodest tetræ lumbricos indere tritos:  
Quis uetus, & rancens sociari axungia debet.  
Si uero occultus neruos dolor urit inertes,  
Vulturis excisos adipēs, rutamq; remitte:  
Aut ceram, & tali recreabis languida fotu.  
Conuenit & pelagi calidis persudier undis.  
Carica cum betis lento uel melle iugatur:  
Aut baccho madefacta ceres cum fronde cupressi:  
Quo poteris potu recreare rigentia membra.  
Sin autem subito replicantur corpora morbo,  
Contractos reuocat neruos atro sumpta columbae.  
Aegris somno asciendo.

NON solum miseros teterrima febris adurit:



Sed super optato pergit uiduare sopore:  
 Ne prosit placidi cœlestia munera somni.  
 Charta igitur, uarijs quam pinxit littera uerbis  
 Vritur, inde cinis calido potatur in amni.  
 Prodest puleium capiti substernere sæpe.  
 Proderit & mixtam lymphis potare cupressum  
 Palladijs itidem succis, quos flore rosarum  
 Iungis, & immisces madidum, tritumq; papauer:  
 Quo lita frons facilem præbebit nocte quietem.  
 Necnon mandragoræ gustu sopor additur altus.  
 Dilue præterea glomeratam quam gerit intus  
 Lanam aries inter geminæ coxendicis umbras:  
 Inde soporati ducentur gutture potus.

Lethargiæ expellendæ.

DIXIMUS hanc sortem miseris mortalibus esse,  
 Ut sint sæpe mala inter se contraria morbi,  
 Deniq; nonnunq̃ somno sic membra grauantur,  
 Ut coniungantur letho sopor altus acerbo.  
 Ergo leui flamma torrentur cornua capræ:  
 Quo nidore grauem depellent lumina somnum.  
 Aut ueneris labrum, quæ dicitur herba bibetur:  
 Quæ teritur prius: & uino confusa liqueſcât.  
 Conueniunt acidis euphorbia mixta fluentis:  
 Gramina uel rutæ, gemina si nare trahuntur.  
 Quidam dira inbent septeno cimice trito  
 Ut uitentur aquæ, cyathusq; bibatur earum:  
 Hæc potiora putant, quam dulci morte perire.

Comicali morbo medendo.

EST subiti species morbi, cui nomen ab illo est,  
 Quod fieri nobis suffragia iusta recusant.  
 Sæpe etenim membris atro languore caducis:  
 Consilium populi labes horrenda diremit.  
 Ipse deus memorat dubiæ per tempora lunæ  
 Conceptum, talis quem sæpe ruina profundit.  
 Prodest cum ueteri baccho fel uulturis atri,  
 Sed cochlear plenum gustu tibi sufficit uno:  
 Aut cruor ex prognæ mixtus cum polline thuris:  
 Aut apium elixum: aut conditum melle fel agni:  
 Marrubiumue pari confusum pondere mellis:



Q. SERENI

Cui tu terna dabis gustu cochlearia in uno.  
Aptus mustela cinis est, & hirundinis una.  
Præterea pluvias hominis quas calua supina  
Excepit proiecta sinu, consumere prodest:  
Aut lapis ex nido uaga quem congeffit hirundo  
Vellitur: ex nexu fouet, attollitq; iacentem.  
Pellitur (ut fama est) gustu quoq; langor anethi.

Regio morbo pellendo.

REGIVS est uero signatus nomine morbus:  
Molliter hic quoniam celsa curatur in aula:  
Huic rubia ex mulsâ fertur conducere lymphâ.  
Allia trita dabis uino madefacta calenti.  
Vellera cum uino suffiri sulphure prodest.

Detibus, uel frigis inquietatis infantibus.

NVDVM hoïem primû mûdi natura profudit:  
Insuper excruciat, niueis cum dentibus armat.  
Collo igitur molli dentes nectentur equini,  
Qui primû fuerint pullo crescente caduci.  
Aut teneris cerebrum ginguis illine porci:  
Aut leporis niueo bibitur cum lacte caprino.  
Præterea si forte premit stryx atra puellus,  
Virosa immulgens exertis ubera labris,  
Allia præcepit Titini sententia necti:  
Qui ueteri claras expressit more togatas.  
Combusturis igne, uel frigore factis.

SVNT diuersa quidem mala frigoris, atq; caloris:  
Sed tamen amborum simili noet ulcere uirus.  
Illa quoq; uista putas, quæ sunt niue laesa rigente.  
Conuersa in cinerem platani pila curat utrumq;  
At uero ambustum flammis qui candidus oui  
Sucus inest: penna inductus sanare ualebit.  
Aut tu suatose cinerem perducto lanæ:  
Aut uiuam ex oleo ueteri composito calcem:  
Ordea uel franges, atq; oui candida iunges:  
Adsit adeps porcæ: mira est hæc forma medelæ.  
Iunge chelidonijs, ac sic line uulnera succis:  
Quodq; recens ipsis glacies, axungia simplex  
Mulat: & ex facili grata est medicamine cura.

Venenis prohibendus.

VT tutus fias infestæ fraude nouercæ,



Vel quicunq; tuo arpetur limidus auctu,  
 Non expectatis eat obuia cura uenenis.  
 Ante cibos igitur inglandis foetus edatur.  
 Profune electri uariantia pocula uirus.  
 Præterea coctæ querno cum cortice lymphæ  
 Conueniunt potu: demersa'ue ficiu oliuo.  
 Sæpe etiam raphanum prædixit numen edendum.  
 Antidotus uero multis mithridatia fertur  
 Consociata modis: sed Magnus scrinia regis  
 Cum raperet uictor, uilem deprehendit in illis  
 Synthesin, & uulgata satis medicamina risit.  
 Bis denum rutæ folium, salis & breue granum,  
 Iuglandesq; duas, terno cum corpore ficiu  
 Hæc oriente die parco conspersa lyæo  
 Sumebat, metuens, dederat quod pocula matri.

Venenis datis.

SI nequit infandum præuerrere cautio uirus,  
 Proximus ille gradus data pocula pellere cura.  
 Lac asinæ, placidæq; bouis prodesse loquuntur.  
 Betonicam ex paruo sumunt pleriq; lyæo  
 Quod si hederæ succos, quæ truncos implicat altos  
 In stilles paruis, poterunt haud ulla nocere  
 Pocula, quæ quisquam senis uitiauerit herbis.  
 Si quis Hyoscyamum gustarit lacte capellæ  
 Exhausto rabidos poterit mulcere furores.  
 Vulneribus, & rei dubiæ curandis.

VULNERA tabescunt spacio uitiata dierum:  
 Curaq; nil prodest, nec ducitur ulla cicatrix:  
 Sed tamen herbarum tam mira potentia pollet,  
 Vlcus annosi sinus ut coalescere possit:  
 Marrubium si tu recoquas, illoq; liquore  
 Vultus atrox foveas, cineres uel hirundinis alte  
 Inducas: leporis'ue aspersa coagula uino:  
 Aut hederam baccho decoctam, & semen anethi:  
 Aut cineres alni tardo cum melle ligentur.  
 Lumbrici terræ poterunt conducere vulnus:  
 Aut facilis lapathi coma latior ulcera purgat:  
 Et comixtus adeps, sed nonnullo sale tactus.  
 Pineæ præterea uino cum sulphure cortex:  
 Et picæ cum spissa iam perditâ membra reponit.



Q. SERENI

Et pice cum spissa iam perdita membra reponit.

Verrucas tollendis.

INTERDUM existit turpi verruca papilla

Hinc quondam fabio uerum cognomen adhæsit:

Qui solus patræ cunctando restituit rem.

Id poterit uitium sanguis curare lacertæ:

Aut urina canis cum terra inducta madenti:

Aut herbae succus, quæ fertur nomine lichen.

Est tithymalus item tali satis apta medellæ,

Si rupta immensos fundit uerruca cruores,

Purpureo tritici cinere de uellere prosunt,

Quod fuerit uero conchyli sanguine tinctum.

Hæmorrhoidis medendis.

EXCRV ciant turpes anum si forte papillæ,

Agrestis prodest radix super addita porri:

Ne uiolet, sana, in iuglandis fragmine clausum.

Sal niueum sumes, bethicum quem nomine dicant,

Dulcia cumq; nigra iunges fuligine mella,

Apponesq; super: pellit medicina dolorem.

Sequuntur. XXVI. uersus, qui in alijs impressis  
codicibus desiderantur.

Paralysi depellendæ. primo die ita agendum.

HVNC quicumq; cupis citius depellere murbum,

Protinus antidotum studio tu perface mirum:

Salicet ut ualeas languenti ferre medelam.

Castoreas siliquas bis sex perquirere cura:

Tristis item digitis lympham metire duobus.

Deniq; tunc capies phyalam, quæ iustior extat:

Aut equidem flammæ. sed prunas subijce sollers.

Proderit interea tepidum potantibus illud:

Ieiunis sed enim potius præbere memento.

Secunda ita medendum est.

CVNQVE secunda dies orbi peruenierit omni

Haud alijs rebus prudens adiungere cures.

Castoris, atq; nouem siliquas appendito statim:

Atq; duos semis digitos metire memento.

In calice atq; probo lympham miscere duobus

Qui patitur tepidum languens hinc sorbeat ipse.



Tertia die ita curandum est.

GRATIOR atq; dies ternus cum uenerit imo,  
Rurſus in ægroto conſtanter fer medicamen,  
Caſtoreas ſiliquas iterum quæ pondere ſint ſex:  
Hinc etenim binos digitos metire memento  
De lymphæ liquida ſed enim ſubiungere cura  
Et ſimili debes tepidum præbere modo tunc.

Ita peragendum eſt à quarta die uſq; ad ſextam,  
Et à ſeptima uſq; ad nonam, à decima uſq; ad  
duodecimam, Et mirifice prodeſt.

Quid quarta die, Et reliquis peragendum ſit.

QUARTVS Et ille dies conſentit. nec ne priori  
Quintus Et eſt ſimilis percellens nanq; ſecundo.  
Sextus itemq; ſimul concordat deniq; tertio:  
Septimus uſq; nonum percurritur ordine primo:  
Sic decimas currens conſcenditur ad duodenum.

\* a b c d e f g h i k l m n o  
p q r ſ t u x.


Omnes ſunt quaterniones, præter t. duernionem:

VENETIIS IN AEDIBVS ALDI, ET AN-  
DREAE ASVLANI SOCERI MENSE  
MARTIO. M. D. XXVIII.

005266469



MEDICINA. LIBRO II.  
Tunc de his quae sunt in corpore  
CRATOR. et de his quae sunt in  
Kupit in agere. et de his quae sunt in  
Ceterum. et de his quae sunt in  
Hic. et de his quae sunt in  
De. et de his quae sunt in  
Et. et de his quae sunt in  
Im. et de his quae sunt in  
Et. et de his quae sunt in  
Quid. et de his quae sunt in

































26. x